Phyt.
148
g
iche

Phyt
148g
Fiche
Dumortier



BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

FLORULA BELGICA,

OPERIS MAJORIS

PRODROMUS,

AUCTORE

B.-C. DUMORTIER.

STAMINACIA.

TORNACI NERVIORUM,

TYPIS J. CASTERMAN.

1827.

182. D.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

PRÆMONENDA.

Historiam Plantarum in Belgio spontè crescentium proximè editurus, haud inutile fore mihi visum est hujus operis prodromum dare, quò, evulgatis speciebus plantarum indigenis, Flora Belgica minus evadat imperfecta, magis copiosa et accurata, utque vegetationem hujusce regni à nemine huc usquè præbitam et à Botanicis diù desideratam, demùm patefaciat. Normam igitur secutus sum Florulæ Bruxellensis et recentioris Enumerationis plantarum Germaniæ auctoribus Steudel et Hochstetter, quâ, copia plantarum in Belgio hactenùs detectarum earumque distributio ac affinitas Botanicis tùm extraneis cùm indigenis facilè demonstrabitur.

Quem in lucem edo libellum, is multis videbitur haud ita magni momenti. Enumeratio enim plantarum nuda, omni ornatu orationis descriptionibus adnotationibusque destituta, nil habet in se quod valdè placere possit; sed quem hodie Botanicis offero, per duodecim annos pressum multa dies et multa litura coercuit, et qui illum sedulâ manu prevolvent, numerosa observationum novarum germina in eo reperient.

Systema ex situ tegumenti floralis desumptum et jam-

Digitized by Google

dudum, in commentationibus meis botanicis propositum, mutatis tamen nonnullis ordinibus majoris simplicitatis causâ, assumpsi. Familias plantarum multas per tribus, et genera per sectiones naturales dividere tentavi.

Quod ad plantas Belgii spectat, quidquid ex commercio litterario cùm botanophilis patriæ didicerim, intellexi vegetationem regni mihi nunquam planè perspiciendam fore, nisi varias provincias ipse perlustraverim. Quapropter, partìm comitante amico P. Michel, partìm solus, varia itinera per Belgium et Eifliam de meo suscepi, omnesque provincias (exceptis maximè septentrionalibus) plus minusve investigavi, plantes undiquè colligens ac ad vivum describens.

Nulla est sincera voluptas, cecinit Naso. Floræ Belgicæ causâ peregrinantibus, non solum flores sed et spinæ nobis frequenter occurrere. Quùm Arduennam cum amico Michel visitaremus, exploratores ab ignaris habiti, bis in carcerem missi fuimus, et post triduum cùm latronibus, eheu! à pago *Florenville* ad urbem usquè *Neufchateau* deducti, quasi per miraculum ex manibus barbarorum fuimus liberati. Sic nos servavit Dea.....

Di, meliora piis, erroremque hostibus illum!!!

Transitis tamen diebus doloris, nunc in solis Floribus versemur.

Hos inter Flores, nonnullos dubio vexatos cum speciminibus Linnæannis comparare desiderabam. Mediante ergo *D. Sabine*, obtinui à dignissimo supellectilis Linnæanæ possessore, cl. *J. E. Smith*, facultatem insi-

Digitized by Google

gnem plantas Belgii dubias speciminibus Linnæi archetypis conferendi. Nunc autem, sublatis omnibus impedimentis, et ex consiliis ipsius clarissimi Smithii, Floræ Belgicæ prospectum typis excudendum mandavi.

De stirpibus à Carolo *van Hoorebeke* in Flandriâ indicatis diù dubitavi utrùm illas inter indigenas et velut in patria jura reciperem, an potius ex Florâ Belgicâ ejicerem. Notum est societatem agriculturæ Gandavensem herbarium Flandriæ orientalis in quatuor divisiones proposuisse, atque, in singulâ concertatione, Carolum *van Hoorebeke* coronâ redimitum fuisse. Sed botanici plures meritò quidem illi vitio verterunt, quod plantas exoticæ originis spontaneis intermiscuerit et quasi indigenas Flandriæ exhibuerit. Quid ergo facerem? Si omnes admisissem, botanicos in errorem ducebam; si omnes rejicissem, Floram Belgicam divitiis unius è præcipuis provinciis denudabam. Malui igitur, exclusis speciebus manifestè exoticis, reliquas quas forsan observavit spontaneas, fide auctoris indicare; sed fateor hanc Floræ Belgicæ partem de integro reficiendam esse.

Flora Belgica, cujus germina in scriptis Dodonæi, Clusii et Lobelii reperiuntur, nostris temporibus maximè locupletata est botanicorum belgarum studio, et imprimis operibus *DD. Roucel*, *Lejeune*, *Kickx*, *Kops*, *Dekin*, *Hocquart*, *Degeer*, *Desmazieres*, *Meigen* et *van Hall*, nec non sedulis investigationibus *DD. Belval*, *Bergsma*, *Courtois*, *Cromback*, *De Beyer*, *De Cloet*, *Dijon*, *Dossin*, *Dreissen*, *Dumoulin*, *Floris*, *Girard*, *Gossart*, *Hécart*, *Heegman*,

Digitized by Google

Kuyper, *Lechartier*, *Th. Lestiboudois*, *Manderlier*, *Marchant*, *Michel*, *Mulder*, *Nève*, *Nyst*, *Olislagers*, *Reinwardt*, *Tinant*, *van den Ende*, *van Hoorebeke*, *Voisin*, *Vrolik*, *Vrydag-Zinnen*, quibus addenda est doctissima domina *Libert*. Hi ferè omnes mihi in auxilium venerunt et Floræ Belgicæ causâ, plantas à se in Patriâ detectas mecum communicaverunt. Suum cuique, in hoc opusculo, quantum potui, reddidi, eisque lubens gratias hìc persolvo publicas. Velint et amabili scientiæ adhuc studere, et novas à te lectas stirpes mecum iterum iterumque communicare.

———

Digitized by Google

INDEX

AUCTORUM QUI DE FLORA BELGICA SCRIPSERUNT.

STEPH. BLANKAART. — Nederlansche herbarius. Amst. in-8.° 1698. — 2.° 1714.

H. BOERHAAVE. — Index plantarum quæ in horto academico Lugduno-Batavo reperiuntur. 1 vol. in-8.° Lugdb. 1710!

Id. — Index alter plantarum quæ in horto academico Lugduno-Batavo aluntur. 2 vol. in-4.° Lugdb. 1720!

S. J. BRUGMANS. — Dissertatio de plantis inutilibus et venenatis. in-8.° Groningæ 1783.

H. BRUMANN. — Index plantarum circa Zuollam in Transyssalaniâ crescentium. in-8.° 1662.

BURTIN. — Mémoire sur la question : quels sont les végétaux indigènes que l'on pourrait substituer dans les Pays-Bas aux végétaux exotiques. Bruxelles, 1784. in-4.° !

T. P. CAELS. — De plantis Belgii qualitate novicâ præditis. — in-4.° Bruxelles, 1774!

C. CLUSIUS. — Rariarum plantarum historia. Antverpiæ 1601. in-8.° !

Id. — Curæ posteriores. Antverpiæ. 1611!

J. COMMELIN. — Catalogus plantarum indigenarum Hollandiæ. Amstelodami 1683. in-12. — 2a. Lugdb. 1709!

A. P. DECANDOLLE. — Flore Française. 4 vol in-8.° Paris, 1805! — Suppl. Paris, 1816. in-8° !

A. DEKIN. — Catalogue des plantes indigènes et naturalisées dans le département des Deux-Nêthes!

A. DEKIN et A. F. PASSY. — Florula Bruxellensis. in-12.° Bruxelles, 1814!

H. DEMASZIÈRES. — Agrostographie du nord de la France. in-8.° Lille 1812!

Id. — Catalogue des plantes omises dans la Botanographie Belgique. Lille, 1823. in-8.° !

Id. — Plantes cryptogames du nord de la France. 5 fasc. in-4.° Lille!

R. DODOENS. — Cruydboeck. in-folio. Antwerpen, 1454. — 2a. 1564. — 3a. London, 1578. — 4a. ibid 1586. — 5a. ibid, 1595. — 6a. ibid, 1600. — 7a. Lugdb. 1618! — 8a. Lond. 1619. — 9a. Antw. 1644.

Id. — Histoire des plantes, traduite par Charles de l'Ecluse. Anvers 1557 in-folio !

**

Digitized by Google

Id. — Stirpium historiæ pemptades VI. in-folio. Antverp. 1583, 1612, 1616!

P. E. Dossin. — Catalogue des plantes des environs de Liége, 1807 miss!

B. C. Dumortier. — Agrostographiæ Belgicæ tentamen, in-8.° Tornaci nerviorum 1823!

Id. — Notice sur le genre *Hulthemia*, précédée d'un aperçu sur la classification des roses de la Belgique. in-8.° Tournay. 1824!

Durondeau. — Mémoire sur la question : Quelles sont les plantes les plus utiles des Pays-Bas, in 4.° Bruxelles, 1772!

G. F. Edwards. — Tableau des plantes indigènes du département de la Lys, à l'exception des arbres et des champignons. in-8.° Bruges, 1810!

Frid. Ehrhart. — Iter hollandicum et spicilegium Floræ septem provinciarum Belgii foederati; in opere dicto : Beitrage zur naturkunde. vol. 2. Hannover, 1778!

J. L. G. De Geer. — Plantarum Belgii confoederati indigenarum spicilegium alterum. in-8.° Trajecti, 1814!

Steph. van Geuns. — Plantarum Belgii confoederati indigenarum spicilegium. Hardervici, 1778. in-8.°!

Van Geuns. — Plantarum indigenarum in usum sive medicum sive oeconomicum selectarum index systematicus. Trajecti, 1816.

Dav. de Gorter. — Flora Gelro-Zutphanica. in-8.° Harderovici, 1745! — Appendix 1747!

Id. — Flora Belgica. in-8.° Trajecti, 1767!

Id. — Floræ Belgicæ supplementa duo. 1, 1768; 2, 1777.

Id. — Flora VII provinciarum Belgii foederati. in-8.°. Harlemi, 1781!

Id. — Flora Zutphanica. in-8.° Zutphaniæ, 1781!

H. C. Van Hall. — Synopsis graminum indigenarum Belgii partis septentrionalis, in-8.° Trajecti, 1821!

Id. — Flora Belgii septentrionalis. in-8.° Amst. 1825!

Id. — Flora Batava. vol. 5! vide Kops.

Havart. — Recueil des plantes trouvées dans les environs de Mons. mss, 1782!

G. A. J. Hécart, — Floræ Hannoniensis Prodromus. mss. 1780!

P. Hermann. — Horti academici Lugduno-Batavi catalogus. in-12.° Lugdb. 1687!

L. Hocquart. — Flore du département de Jemmape. in-12.° Mons. 1814! — Suppl. mss!

Ch. Van Hoorebeke. — Mémoire sur les Orobanches. in-8.°. Gand, 1818!

Id. — Catalogue des plantes de la Flandre orientale. mss.

Hadr. Junius. — Phalli ex fungorum genere in Hollandiæ sabuletis passim crescentis descriptio et ad vivum expressa pictura. in-4.° Delphis, 1564 (teste Linn). — ibid. 1569 (teste Burm). — Lugdb. 1601.

Digitized by Google

J. Kickx. — Flora Bruxellensis, in-8.° Bruxellis, 1812!
J. Kickx et Quetelet. — Relation d'un voyage fait à la grotte de Han. in-4.° Bruxelles, 1823!
J. Kickx, fil. — Plantæ officinales, et venenatæ, agri Lovaniensis. in-4.° Lovanii, 1827!
G. J. Knyf. — Goylandiæ lib. 2, et erranatio plantarum. Amst., 1721.
Jan Kops. — Flora Batava. in-8.° Amst.! 1, 1800; 2, 1807; 3, 1814; 4, 1822; 5, vide Van Hall.
H. Kralix. — Index plantarum indigenarum propè Lugdunum. Lugd., 1636. in-4.°
J. A. B. Kuyper. — Eerste naamlyst van zigtbaarbloyende plaanten, welke in de omstreken van Breda gevonden. Breda, 1826. in-8.° !
A. L. S. Lejeune. — Flore de Spa. 2 vol. in-8.° Liège, 1, 1811 2, 1813!
Id. — Revue de la Flore de Spa. in-8.° Liège, 1824!
Lejeune et Courtois. — Choix de plantes de la Belgique!
Lestiboudois. — Botanographie Belgique. in-8.° Lille, ed.° 1a. 1781! — ed.° 2a. 1799!
M. A. Libert. — Notice sur un nouveau genre d'hépatiques. *Lejeunia.* in-8.° Bruxelles, 1820!
C. Linneus. — Flora Belgica. Upsal. in-4.° 1760—2a. in amoen. acad. vol. 6!
A. Loosjes. — Flora Harlemica. in-8° Harlemi, 1779.
M. De Lobel. — Plantarum seu stirpium historia. in-folio. Antverpiæ, 1576!
Id. — Kruydtboeck. Antwerpen, 1581. in-folio!
Loiseleur Deslongchamps. — Notice sur les plantes à ajouter à la Flore de France. in-8.° Paris, 1810!
Lucas. — Essai sur les eaux minerales de Borcette et Aix-la-Chapelle.
J. W. Meigen et H. L. Weniger. - Systematisches verziechniss der anden ufern der Rheins, der Roër, der Maas, der Ourte Phanerogamischen Pflanzen. in-16. Koln, 1819!
Id. — Versuck flora der ufer der Niederrheins, der Roër, der Maas, der Ourte, und der angranzendeh gegenden. 16.° Coln, 1823!
D. Meese. — Flora Frisica. in-8.° Franeker, 1760!
N. Mulder. — Elenchus plantarum quæ circa Leidam nascuntur. in-4.° Lugdb. 1818!
H. Mussche. — Hortus Gandavensis. in-12. Gand. 1817!
N. Necker. — Deliciæ Gallo-Belgicæ sylvestres. 2 vol. in-16. Argentorati. 1773!
P. Nylandt. — Nederlantse herbarius. 4.° Amst 1682!
Nyst. — Catalogue linneen des plantes du plateau de S.t-Pierre à Maestrickt. — Apud Bory, voyage souterrain. in-8.° Paris, 1821!
S. Pauli. — Catalogus plantarum sponte propè Lugdunum. in-12.° Haffn, 1652!
C. Pilleterius. — Synonymia plantarum in Valachriâ nascentium. in-12.° Middelb, 1610!

Digitized by Google

De Poederlé. — Manuel de l'arboriste et du forestier Belgique. 2 vol. in-8.° Bruxelles, 1792!

J. Ray. — Stirpium extrà britannias nascentium sylloge. in-8.° Lond, 1694!

Rosin. — Herbier portatif des plantes qui se trouvent dans les environs de Liège. in-8.° Liège, 1791

F. Roucel. — Traité des plantes les moins fréquentes des environs de Gand, Alost, Termonde et Bruxelles. in-8.° Bruxelles, 1872!

Id. — Flore du nord de la France. 2 vol. in-8.° Paris, 1803!

F. Schuil. — Index plantarum indigenarum propè Lugdunum. in-8.° Lugdb. 1688

H. Schuurmans.-Stechoven. — Kruidkundig handboeck. 2 vol. in-8.° Amst., 1, 1815; 2, 1818!

F. Van Sterbeeck. — Theatrum fungorum. Antw. 1675. in-4.°!

A. Vorstius. — Index plantarum quæ propè Lugdunum in Batavis nascuntur. Lugdb. 1633. — 2a. 1658!

Digitized by Google

CLAVIS SYSTEMATIS.

Classes.	Subclasses.	Divisiones.	Ordines.
STAMINACIA.	CORTICALIA.....	SIMPLITEGMIA..	1 JULITEGMIA.
			2 FRUCTITEGMIA.
			3 THALAMITEGMIA.
		TUBIFLORIA.....	4 THALAMITUBIA.
			5 FRUCTITUBIA.
		UNGULIFLORIA.	6 FRUCTUNGULIA.
			7 CALICUNGULIA.
			8 THALAMUNGULIA.
	DECORTICALIA..	BITEGMIA.....	9 THALAMIFLORIA.
			10 FRUCTIFLORIA.
			11 CALICIFLORIA.
		SOLITEGMIA.....	12 FRUCTAULIA.
			13 THALAMAULIA.
POLLINACIA.	CAPSELLIA.....		14 ECALYPTRIA.
			15 CALYPTRIA.
	ECAPSELLIA		16 SCUTELLINIA.
			17 FUNGINIA.
FLUIDACIA...	SOLIGRANIA.....		18 GRANULINIA.
	PLURIGRANIA.....		19 COCCULINIA.
			20 FARTINIA.

CHARACTERES ORDINUM.

1. Julitegmia — Squamæ floriferæ Julo insidentes.
2. Fructitegmia — Tegmen florale unicum Fructu insidens.
3. Thalamitegmia — Tegmen florale unicum Thalamo insidens.
4. Thalamitubia — Tubus corollæ monopetalæ Thalamo insidens s. inferus.
5. Fructitubia — Tubus corollæ monopetalæ Fructu insidens s. superus.
6. Fructungulia — Unguli corollæ polypetalæ Fructu insidentes.
7. Calicungulia — Unguli corollæ polypetalæ Calici insidentes.
8. Thalamungulia — Unguli corollæ polypetalæ Thalamo insidentes.
9. Thalamifloria — Corolla Thalamo inserta.
10. Fructifloria — Corolla Fructu inserta.
11. Calicifloria — Corolla Calici inserta.
12. Fructaulia — Tegmen florale unicum Fructu insertum.
13. Thalamaulia — Tegmen florale unicum Thalamo insertum.

Digitized by Google

Digitized by Google

FLORULA BELGICA.

Classis 1ª STAMINACIA.

Subclassis 1ª CORTICALIA s. ASTRIFIBRIA.

Divisio 1ª SIMPLITEGMIA.

Ordo 1ª JULITEGMIA.

Familia 1a EPHEDRACEÆ.

EPHEDRA. *Tourn.*

1 distachya, L. ♃. 6, 7. In marit. Flandriæ indicata, sed dub. civ.

Fam. 2. CONIFERÆ. — Coniferarum gen. *Juss.*

Trib. 1. CUPRESSINEÆ. *Rich.*

JUNIPERUS. *Lin.*

§. 1. Sabina. — Amenta terminalia.

2 Sabina, L. ♄. 3, 4. In montosis Flandriæ fide Hoor! dub. civ.

§. 2. Oxycedrus. — Amenta axillaria.

3 communis, L. ♄. 4, 5. In ericetis apricis!

β. nana.

γ. erytrocarpa.

Trib. 1. ABIETINEÆ. *Rich.*

PINUS. *Tourn.*

§. 1. Pinaster. — Folia geminata.

Digitized by Google

4 sylvestris, L, ♄. 5. In Campiniâ copiosè!
β. rubra.
5 Pinaster, Ait. ♄. 5. In pinetis Campiniæ!
6 maritima, Mill. ♄. 5. In Belgio frequens. (Lej.)
7 Laricio, Poir. ♄. 5. In Belgio orientali (Lej. Mich.) dub. civ.

§. 2. Strobus. — Folia quinata.

8 Strobus, L, ♄, 5. In sylvis Flandriæ passìm culta.

ABIES. *Juss.*

§. 1. Larix.

9 Larix, Poir. ♄. 5, 6. In sylvis mont. Arduennæ!

§. 2. Epicea, *Dec.*

10 excelsa, Poir. ♄. 5, 6. In sylvis Campin. (Vh. Kuyp), Gelr. (Gort.

§. 3. Sapinus.

11 Picea = Pinus, L. ♄. 5, 6. Luxemburgii sylv. (Tin!)

Fam. 3. TAXINEÆ. — Taxinearum gen. *Rich.*

TAXUS. *Tourn.*

12 baccata, L. ♄. 3, 4, In sylvis montosis (Lej. Russ.)

Fam. 4. AMENTACEÆ.

Trib. 1. PLATANEÆ. *Dmrt. in Bydr. 1825.*

LATANUS. *Tourn.*

13 orientalis, L. ♄. 5. Ad plateas culta!
14 acerifolia, Wild. ♄. 5. Cum priori!
15 occidentalis, L. ♄. 5. Ad plateas et vias culta!

Trib. 2. MYRICEÆ.

GALE, *Tourn.* — Myricæ sp. Lin.

16 Belgica = Myrica gale. L. ♄. 4, 5. In turf. ericet. regionis aluv.

Digitized by Google

Trib. 3. BETULEÆ — Betulaceæ. *Lois.*

ALNUS. *Gærtn.*

17 glutinosa, Gærtn. ♄. 1, 3. In sylvis humidis et ad fossas!
18 incana, Dec. ♄. 1, 3. In arenosis humidis Gelriæ (Vrol. Beyer!)

BETULA. *Tourn.*

19 pubescens, Ehrh. ♄. 4, 5, in sylvis humidis Arduennæ!
20 glabra, = B. alba Wild. et omnium ferè floristarum.
α. archetypa.
β? pendula.
γ? macrocarpa.
δ? verrucosa.
21 carpathica, Waldst et Kit. ♄. 4, 5. In sylvis Arduennæ!
α. rhomboidea.
β. cuneifolia.
22 alba, Lin! ♄. 4, 5. In sylvis ericetosis!
23 lucida, Court! ♄. 4, 5. In sylvis Leod. (Court! Mich.!)

Trib. 5. SALICEÆ. *Dmrt. l. c.*

SALIX. *Tourn.*

SERIES 1. CAPRISALIX. Dmrt. Bydr.

§. 1. VETRIX. Cæsalp.

a Capræeæ.

24 cinerascens, Willd. ♄. 5. In Arduenna Leodiensi. (Doss.)
25 Croweana, Sm! ♄. 4, 5. In palustribus!
26 acuminata, Sm! ♄. 4. In sylvis humidis frequens!
α. ovalifolia, Ser!
β. obovata, Ser.
γ. variegata, Ser.
δ. oblonga.
ε. humilis, Ser.
ζ. androgyna, Ser.
27 rufinervis, Dec. ♄. 4, 5. In sylvis et sepibus agri Leod. (Dossin.)
28 Capræa, L! ♄. 4. In umbrosis frequens!
α. tomentosa, Ser!
β. ternata, Ser!
γ. androgyna, Ser!
δ. macrophylla, Ser!
ε. rotundifolia, Ser!

Digitized by Google

ζ. tenuifolia, Ser!
η. ulmifolia, Ser!
29 cinerea, L! ♄. 4. In humidis et sylvis!
α. smithiana.
β. aquatica.
γ. ternata.
30 aurita, L! ♄. 4. In humidis sylvarum frequens!
α. vulgaris, Ser!
β. tenuifolia, Ser!
γ. ambigua.
δ. leiocarpa.
31 versifolia, Wahl. Ser! ♄. 4, 5. In turfosis Arduennæ. (Doss.)

b. Incubaceæ.

32 rosmarinifolia, L! ♄. 4, 5. In arenosis humidis Belg. litt. (Gort.)
33 arbuscula, Willd. ♄. 4. In Arduennâ Leodiensi fide Doss.
34 Incubacea, L. ♄. ♃. 4, 5. In ericetis humidis.
β. adscendens.
γ. parvifolia.
δ. fusca.
ε. prostrata.
ζ. lanceolata.
η. nitida.
θ. microphylla.
ι. repens.
35 argentea, Sm! ♄. 5. In arenâ mobili dunarum!
α. micans.
β. obscura.

c. Daphnoideæ.

36 laurina, Sm. ♄. 4, 5. In sylvis Flandriæ (Mussche.)
37 bicolor, Ehrh. ♄. 4. In sylvis Arduennæ Leod. (Lej!)
38 præcox = P. cinerea, acutifol. et pomeranica Wild. ♄. ♃. 3, 4. Ad ripas (Desm. Tin!)

d. Phylicifolieæ.

39 phylicifolia, L. ♄ 5. In sylvis Flandriæ (Mussche!)
40 nigricans, Sm! ♄. 4. In pratis turfosis Flandr. (Mussche!)

§. 2. Vimen — St. 2. monadelph. ceroma lineare.

41 riparia, Wild. ♄. 5. In paludibus turf. subalp. Ard. (Lej.!)
42 Viminalis, L! ♄. 3, 4. In viminalibus et secus fossas!
43 stipularis, Sm! ♄. 3, 4. In viminalibus et secus foss. rar!
44 Seringiana, Gaud. ♄. 4, 5. In sepibus humidis.
45 repanda : foliis longè lanceolatis repandis, supernè glabriusculis, infernè argenteo-sericeis; stipulis nullis; amentis coetaneis cylindrico-ovatis; ovariis sericeis, stylo elongato. ♄. 5. in salicetis agri Leod. secus flumen Vesdre!
46 pubera, Koch. ♄. 4, 5. Ad ripas Rheni (Boen.)

Digitized by Google

47 mollissima. Ehrh. ♄. 4, 5. Ad ripas Mosæ. (Doss.), Rheni (Boen.)
48 Smithiana, Wild. ♄. 4, 5. Ad ripas fossarum!
49 cuspidata, = Fissa, Ser. dec. nec hoffm. ♄. 4, 5. Ad ripas. (Desm.)
50 rubra, Sm! ♄. 4, 5. In salicetis!

§. 3. Helix. — Stamen 1.

51 olivacea = O. et Membracea, Th! ♄. 4, 5. In salicetis Flandriæ (Hoor!)
α. thuilleriana = olivacea, th.
β. membranacea.
52 Helix, L. ♄. 3, 4. Ad ripas!
β. floccosa.
53 purpurea, L! ♄. 3, 4. Ad ripas præcipuè in montosis!
β. sericea, Ser!
γ. angustifolia, Dec.
δ. brevifolia, Schl.
ε. atropurpurea.
ζ. subverticillata, Ser.

SERIES 2. VITISALIX. *Dmrt. l. c.*

§. 4. Amerina. — Ceroma bilabiatum.

α. Triandræ.
54 amygdalina, L. ♄. 4, 5. Ad ripas in sylvis humidis!
α. concolor.
β. subglauca, Ser.
γ. villarsiana, Willd.
δ. meyereana, Wild.
ε. lanceæfolia.
ζ. hoppeana, Willd.
55 tuberculata : ramis tuberculatis; foliis longè lanceolatis, supernè glabris, infernè puberulis; amentis coetaneis ovato-cylindricis; ovariis sericeis. L. ♄. 4, 5. Ad ripas scaldis rara!
56 undulata, Ehrh. ♄. 4, 5. Ad ripas mosæ et vesæ. (Lej. Mich.)
57 triandra, L. ♄. 4, 5. Ad ripas!
b. Diandræ.
58 vitellina, L! ♄. 5. Ad ripas in paludibus.
α. vulgaris.
β. sanguinea.
γ. sericea Ser!
59 alba, L! ♄. 5. In sylvis, secus vias et ripas.
α. micans.
β. vulgaris.
γ. cœrulea.
δ. viridis.
60 cochleata : ramis pendentibus laxis; foliis lanceolatis canalicu-

Digitized by Google

latis longè cuspidatis, cochleatis, supernè puberulis, infernè sericeis glaucis; amentis coetaneis cylindricis. ♄. 3, 4. In Flandriâ reperta (V. Hult.)

61 Babylonica, L! ♄. 5. Ex oriente, nunc ad pagos frequens!

62 decipiens, Hoffm. ♄. 5. Ad ripas fluviorum!

63 Russeliana, Sm.! ♄. 4, 5. Ad ripas!

§. 5. Salicaster. — Ceroma urceoliforme indivisum.

65 pentandra, L. ♄. 5. Ad montem sancti Petri!

§. 6. Chamætia. — Ceroma didym.

66 herbacea, L. ♃. 5. 6. In alp. Arduennæ!

POPULUS. *Tourn.*

§. 1. Popularia. — Stam. 12 et ultrà.

67 fastigiata, Th. ♄, 2, 4. Secus vias!

68 nigra, L. ♄. 2, 4. In pascuis inundatis!
- α. viminea.
- β. dunensis.
- γ. helvetica.

69 monilifera, Ait. ♄. 3, 4. Secus vias culta!

70 angulata, Ait. ♄. 3, 4. Cum priore rara!

71 Balsamifera, L. ♄. 4. In sylvis Luxemburgii. (Tin!) dub. civ.

§. 2. Tremularia. — Stamina 8.

72 tremula, L. ♄. 3, 4. In sylvis frigidioribus!
- β. glabrata.
- γ. cordifolia.
- δ. intermedia.
- ε. villosa.

73 canescens, Sm. ♄. 3, 4. In sylvis humidis et ad vias!
- β. glabrescens.

74 alba, L. ♄. 3, 5. Cum priore!

Fam. 5. CUPULIFEREÆ. *Rich.*

Trib. 1. CORYLACLEÆ.

Cupula foliacea.

CORYLUS. *Tourn,*

75 Avellana, L. ♄. 2, 3. In sylvis frequens!
- α. sylvestris.
- β. macrocarpa.

76 tubulosa, Willd. ♄. 1, 2. Ad sepes!

Digitized by Google

CARPINUS. *Lin.*

77 Betula, Lin. ♄. 4, 5. In sylvis et ad sepes!

Trib. 2. QUERCINEÆ.

Capula squamosa evalvis.

QUERCUS, *Lin.*

§ 1. ROBUR. — Cupula verrucoso-squamosa.

78 fastigiata, Lamk. ♄. 4, 5. In sylvis Ard. Leod. (Mich.)
79 robur, L, ♄. 4, 5. In sylvis frequens!
β. acutiloba.
γ. burgundica.
80 sessiliflora, Lm! ♄. 4, 5. In sylvis!
β. platyphylla.
γ.
81 lanuginosa, Thuil. ♄. in sylvis rara!
β. nigra, Thuil.

§, 2. CERRIS. — Cupula echinato-squamosa.

82 Cerris, Lin. ♄. 5. In sylvis Condrusiæ. (Olis!)
83 austriaca. Willd. ♄. 5. In sylvis Flandriæ fide Hoor!

Trib. 3. CASTANEÆ.

Cupula valvata.

FAGUS. *Lin.*

§. 1 FAGOTYPUS. — Fagus. *Gærtn.*

84 sylvatica, L. ♄. 4, 5. In sylvis frondosis!
β. atropurpurea.

§. 2. CASTANEA. — Castanea. *Gærtn.*

85 Castanea, L. ♄. 4, 5. In sylvis sabulosis!

Fam. 6. NUCULACEÆ. *Lamk. et Dec.*

JUGLANS. *Nutt.*

86 regia, Lin. ♄. 4, 5. Ex Persiâ, nunc ad pagos frequens.

Digitized by Google

Ordo 2. FRUCTITEGMIA.

Fam. 7. HIPPURIDEÆ. *Link.*

HIPPURIS. *Lin.*

87 vulgaris, Lin. ♃. 5—8. Foss. lim. reg. litt. frequens!
β. fluviatilis.

Fam. 8. LORANTHEÆ. *Juss.*

VISCUM. *Tourn.*

88 album, L. ♄. 3—5. In arboribus parasiticum!

Fam. 9. SANTALACEÆ. *R. Br.*

THESIUM. *R. Br.*

89 ramosum, Hayne. ♃. 6. 7. In pascuis aridis Flandriæ. (Hoor!)
α. racemosum.
β. paniculato-racemosum.

90 strictum; rhizomate repente; caulibus strictis; floribus paniculatis, tribracteatis, pedunculatis; drupâ ovatâ perigonium marcescentem triplò excedente. ♃. 5—7. In Eifliâ!

91 linophyllum, Lin.—th. decumbens, Gmel. ♃. 5—7. In prat. mont!
α. angustifolium.
β. latifolium.

Fam. 10. ASARINEÆ. — ASARINÆ. *Kunth.*

Trib. 1. ASAREÆ.

Perigonium polysepalum persistens. Altheræ filamento suffultæ.

ASARUM, *Lin.*

92 Europæum, L. ♃. 3—5. In coryletis. (Belv! hec! cromb!)

Trib. 2. ARISTOLOCHIEÆ.

Perigonium monosepalum deciduum. Antheræ sessiles.

ARISTOLOCHIA. *Lin.*

93 Clematitis, ♃. 6—8. In dumetis arenosis!

Digitized by Google

Ordo 3. THALAMITEGMIA.

Fam. 11. POLYGONEÆ. *Juss.*

Trib. 1. RUMICEÆ.

Sepala biserialia.

RUMEX. *Hook.*

§. 1. LAPATHUM. *Dec.*

a. Oreolapathum. — Fl. Polygami.

94 alpinus, L! ♃. 6—8. In subalpinis Arduennæ.

b. Hydrolapathum. — Fl. herm. Sepala int. lata.

95 aquaticus, L! ♃. 6—8. In aquis stagnantibus (Vh! Kx. f!)
96 hydrolapathum, Huds. ♃. 6, 7. In aquis stagnantibus!
97 patientia, L! ♃. 6, 7. In pratis Arduennæ (Lej!)
98 distans: foliis lato-lanceolatis, radicalibus basi truncatis, summis utrinquè attenuatis; verticillis foliosis distantibus; sepalis interioribus late cordatis, callo unico excrescente. ♃. 6, 7. Ad margines agrorum!
99 crispus, L! ②. 6—8. In pratis et ruderatis!
100 pratensis, M. et K. ♃. 6, 7. In dumetis et ad sepes!

c. Nemolapathum. — Fl. herm. Sepala int. angusta.

101 obtusifolius, L. 6—8. In pratis et ruderatis!
α. archetypus.
β. purpureus, Poir.
γ. sylvestris Wallr.
δ. ovalifolius.
102 sanguineus, L! ♃. 6, 7. In cultis et pratis!
β. nemorosus.
103 acutus, L! ♃. 6, 7. In pratis frequens!
β. divaricatus, Thuil.

d. Blepharolapathnm. — Sepala interiora ciliata.

104 pulcher, L! ♃. 7, 8. In pascuis glareosis!
105 palustris, Smith! ②. 7, 8. In limosis maritimis!
α. remotus.
β. limosus.
106 maritimus, L! ①. 7—9. In limosis maritimis!

§. 2. ACETOSA. *Dec.*

a. Bucephalophorus. — fl. hermaphroditi, ciliati.

107 Bucephalophorus, L. ♃. 6. In sabulosis Flandriæ fide Hoor!

Digitized by Google

b. Rumicotypus. — Fl. unisexuales.

108 amplexicaulis, Lapeyr. ♃. 6, 7. In olitoriis usitatissima!
109 acetosa, L. ♃. 6. In pascuis et pratis!
110 intermedius, Dec. ♃. 6, 7. In pascuis siccis!
111 acetosella, L. ♃. 5—9. In arvis et pascuis ubique!

c. Acetosa. — Fl. hermaphroditi, integri.

112 scutatus, L. ♃. 5—7. In rupibus et lapidosis montosis!

Trib. 2. PERSICARIEÆ.

Perigonium monosepalum petaloïdeum, segmentis uniserialibus.

FAGOPYRON. *Gærtn.*

113 sarracenicum = Polygonum fagopyrum, L. ①. 7, 8. In agris cultum!
114 tataricum, Gærtn. ①. 7, 8. In agris secalinis arenosis!
α. paniculatum.
β. racemosum.
γ. depauperatum.

BILDERDYKIA. — Fl. polygami. Perigonium inæquale.

115 convolvulus. = Polygonum, L. ①. 6—8. In agris cultis et ad sepes!
α. scabra.
β. lævis.
γ. subalata.
116 dumetorum = Polygonum, L. ①. 6—8. In frutetis!

POLYGONUM. — Fl. hermaph. Perigonium æquale.

§. 1. Polygonotypus.

117 maritimum, L. ♃. 6—8. Arenosis marit. Artesiæ (Desm!)
118 littorale, Lk. ♃. 6—8. In arenosis maritimis!
119 aviculare, L. ①. 6—9. In agris et secus vias!
α. latifolium.
β. angustifolium.
γ. aphyllum.
δ. procumbens.
ε. sabulosum.
ζ? erectum.
120 Bellardi, All. ①. 7. In segetes Arduennæ (Lej! Lib!)

§. 2 Persicaria.

α. Spicæ filiformes.

121 minus, Huds. ①. 7. 8. In sabulosis humidis!

Digitized by Google

α. humifusum.
β. erectum.

122 Braunii, B. et F. ♃. 6, 7. In fossis exsiccatis!
123 hydropiper, L. ⊙ 8—9. In aquosis et ad fossas!
124 mite, Pers. In agro Leodiensi fide Bory S.t Vincent. Dub. civ.

b. Spicæ crasssæ : fl. hexandri.

125 Persicaria, Lin. ⊙. 7—9. In fossis et limosis.
α. maculatum.
β. immaculatum.
γ. tomentosum.
126 lapathifolium, Lin. ⊙. 7—9. In humidiusculis!
α. longifolium.
β. latifolium.
γ. incanum.
127 nodosum, Pers. ⊙. 7—9. Ad ripas fluviorum!
α. lanceæfolium.
β. ovalifolium.
γ. maculatum.
δ. canescens.

c. Spicæ crassæ densæ; fl. pentandri.

128 amphibium, L. ♃. 6, 7. In stagnis et pratis lutosis!
α. terrestre.
β. aquaticum.

§. 3. Bistorta.

129 Bistorta. L. ♃. 5—7. In pratis montosis!
130 viviparum. L. ♃. 5—7. In subalpinis Arduennæ (Lej!)

Fam. 12. AMARANTHACEÆ. *R. Br.*

AMARANTHUS. *Lin.*

Sect. 1. Amarathotypus. — Fl. 6 fid. 5 adr.

131 sanguineus, Wild. ⊙. 7—9. In ruderatis quasi spontè!
132 retroflexus, L. ⊙. 7—9. In ruderatis !

Sect. 2. Blitopsis: — Fl. 3 andri.

133 sylvestris. Desf. ⊙. 8, 9. In Flandriâ (Hoor!)
134 Blitum, L. ⊙. 8, 9. In cultis et ruderatis.
135 adscendens, Lois. ⊙. 8, 9. In cultis et ruderatis.

Digitized by Google

Trib 1. ANSERINEÆ.

Caliculus nullus.

Subtrib. 1. SPINACIEÆ.

Flores feminei ab aliis diversi.

HALIMUS. *Walr.*

136 pedunculatus, Wallr. ①. 8, 7. In cænosis marit. Flandr!
137 portulacoides = Atriplex, L! ♃. 6, 8. In cœnosis marit!

ATRIPLEX, *Gærtn.*

§. 1. TEUTLIOPSIS. — Semina uniformia.

138 farinosum: leproso-argenteum; ramis diffusis; foliis rhombeo-hastatis, sinuato-dentatis, omnibus disepalis. ①. 6—8. In arenosis maritimis!
139 laciniatum, L! ①. 7—9. In aren. marit. fide auct.
β. bauhinianum, Wallr. (Desm!)
140 roseum, L. ①. 7—9. In aren. marit. Flandr. (Rouc.)
131 angustifolium, Sm! ①. 7—9. In ruderatis copiosè!
α. angustissimum, Lej.
β. heterophyllum, Lej.
γ. crassifolium, Lej.
δ. salinum, Desv.
142 patulum, L. ①. 7—9. In ruderatis frequens!
α. archetypum.
β. phyllanthum.
γ. salinum, Wallr.
δ. prostratum, Dec.
ε. oblongifolium.
ζ. polycarpon.
η. linearifolium.
θ? deflexum.
143 erectum, Huds. ①. 8. In ruderatis Flandriæ (Manderlier!)
144 microspermum, W. et K. ①. 7, 8. In ruderatis Gelriæ!
145 flavescens: caule prostrato herbaceo; foliis oppositis hastato-ovatis, obtusis, dentatis; floribus racemoso-paniculatis, perigoniis fructiferis cordatis, subdentatis, dorso nudiusculis, omnibus disepalis. ①. 7—9. In pratis hyeme inundatis!
146 oblongifolium, W. et K. ①. 7—8. In ruderatis Verv. (Lej!)
147 littorale, L! ①. 7, 9. In cœnosis maritimis!
α. integrifolium.
β. serratifolium.
148 hastatum, L! ①. 7, 8. In Bataviâ, dub. civ.

Digitized by Google

§. 2. Dichospermum. — Semina diversa.

149 nitens, Reb. ①. 7—9. Ad ripas Mosellæ.!
150 hortense, L. ①. 7, 8. In olitoriis et fimetis!
α. archetypum.
β. rubrum.
γ? viride.
δ? bicolor.

SPINACIA. *Tourn.*

151 spinosa, Moench. ②. 5, 6. In agris oleraceis!
152 inermis, Moench. ②. 5, 6. In agris oleraceis!

Subtrib. 2. Bliteæ.

Flores omnes hermaphroditi uniformes.

BLITUM. *Lin.*

153 virgatum, L. ①. 6—9. In ruderatis humidis!
154 capitatum, L. ①. 5—9. In ruderatis humidis. Leod. (Lej!)

BETA. *Tour.*

155 rapa: (B. radice rapæ. Bauh.) ②. 7—9. Colitur in agris, freq.
156 cicla, Lin. ①. 7—9. Ad vias reperitur.
157 maritima, L. ♃. 7—9. In cœnosis maritimis!

ANSERINA. — Semen reniforme erectum.

158 Bonus henricus. = Chenopod. Lin. ♃. 5—9. In ruderat. mont.

CHENOPODIUM. — Semen disciforme depressum.

§. 1. Lepropyllum. — Styli lineares.

159 fœtidum, Lamk. ①. 6—8. In ruderatis!
160 concatenatum, Thuil! ①. 7—9. In arenosis dunarum!
161 viride, L! ①. 6—9. In ruderatis frequens!
β. integrifolium.
162 album, L. ①. 7—9. Ad margines agrorum!
163 opulifolium, Schrad. ①. 7—9. Ruderat. Ehrenbreist. (Court!)
164 ficifolium, Smith! ①. 8, 9. In ruderatis et fimetis!
165 Botrys, L. ①. 7, 8. In agris oler. Leod. (Lej!)

§. 2. Chenopotypus. —Styli inconspicui.

166 polyspermum, L! ①. 7, 8. In cultis et agris!
α. laterifloruin.
β. intermedium.
γ. acutifolium, Sm! Arrectum Desm.
167 urbicum, L! ①. 6—8. Ad fossas Limb. (Mich!)

Digitized by Google

168 hybridum, L! ①. 6—8. In cultis et fimetis!
β. rubens. — Ch. rubrum. Lej! Spa.
169 murale, L. ①. 6—9. In ruderatis et versuris!
170 glaucum, L. ①. 6—8. In fimetis et sabulos humid!
171 rubrum, L! ①. 7, 8. In fossis et fimetis!
β. blitoides, Lej!
γ. glomeratum, Wallr.
δ. botryoides, Sm!
172 ambrosioides, L. ex Mexico, nunc in olerac. Flandr!

Trib. 2. SALSOLEÆ.

Flores caliculati.

Subtrib. 1. SUEDEÆ.

Perigonium monophyllum.

SUÆDA. — Suædæ paucæ, Pall. — Perigon. caliculat. immutat.

173 fruticosa. = Salsola, L. ♃. 7—9. In marit. Fl. (Hoor!), Holl. (Comm.)
174 maritima = Chenopod. L. ②? 7—9. In cœnosis marit!
α. monantha.
β. polyantha.
175 filiformis, (Chenopodium filiforme nob. in litt): caule herbaceo erecto; foliis filiformibus teretiusculis; floribus glomeratis caliculi longitudine. ①. 8, 9. In cœn. marit. Holl!

KOCHIA. *Roth.*

§. 1. WILMETIA. *R. Br.*

176 tripteris (chenop. tripteris nob. in litt.): caule herbaceo; foliis semicylindricis glabris; floribus hirsutis; perigonii fructiferi segmentis tribus excrescentibus membraniferis, duobus immutatis. — Chenop. hirsutum, Vh. — ①. 8, 9. In cœnos. marit. Amstelod.
177 hirsuta, M. et K. ①. 8, 9. In maritimis Flandriæ (Lest.)
178 prostrata, Schrad. ♃. 8. In maritimis Flandriæ fide Hoor!

§. 2. CORNULACA. *Desl.*

179 hyssopifolia, Roth. ①, 8, 9. In arenosis Fland. (Hoor!)

Subtrib. 2. POLYCNEMEÆ.

Perigonium polyphyllum.

SALSOLA. *R. Brown.*

§. 1. KALI. — Caliculi spinosi.

180 Kali, L. ①. 7—9. In arenosis maritimis frequens!

Digitized by Google

α. brevifolia.
β. longifolia.

181 turgida : herbacea, nodis fructiferis turgidis; foliis carnosis subulatis scabris, caliculisque apice spinosis; perigoniis fructiferis campanulatis explanatis, sepalis interioribus dorso aculeatis. — S. Tragus, Vh! ①. 7—9. In arenosis marit. Holl!

182 tragus, L. ①. 7—9. In arenos. marit. Flandr. (Hoor!)

Sect. 2. Soda. — Caliculi submucronati.

183 Soda, L. ①. 6—8. In arenosis marit. Flandr. (Hoor!)

POLYCNEMUM. *Lin.*

184 arvense, L. ①. 6, 7. Agr. Gelr. (Reinw! Beyer!), Namurc. (olis!) Flandr. (Hoor!) cet.

CORISPERMUM, *Lin.*

185 hyssopifolium, L. ①. 7, 8. In dunis Hollandiæ. (Kops.)

Trib. 3a. SALICORNIEÆ.

Perigonium cuculatum indivisum.

SALICORNIA. *Lin.*

186 prostrata, Pall. ①. 8, 9. In cœnosis maritimis!
α. pallasii.
β? filiformis.
γ? appressa.

187 procumbens, Sm! ①. 8, 9. In æstuariis maritimis!

188 herbacea, L! ①. 8, 9. In cœnosis maritimis!

189 fruticosa, L. ♃. 8, 9. In maritimis Flandriæ (Hoor!)

Fam. 14. SCLERANTHEÆ.

SCLERANTHUS. *Lin.*

190 perennis, L. ♃. 9—10. In campis arenosis apricis!

291 divaricatus : annuus, caule divaricato unifariàm piloso; dentibus perigonii floriferi lanceolatis margine membranaceis; fructiferi erectis, tubo brevioribus. ①.

192 annuus, L. ①. 6—9. In arvis arenosis frequens!

193 comosus : annuus, caule undiquè piloso; dentibus perigonii fructiferi subulatis patulis, tubo longioribus; bracteis multò brevioribus ①..... In agris Belgii (Olislagers!)

Digitized by Google

Fam. 15. URTICINEÆ. — Urticeæ *Juss.*

Trib. 1. URTICEÆ.

Stamina 4, filamentis arcuatis. Stigma 1.

PARIETARIA. *Tourn.*

194 officinalis, L! ♃. 6—9. In muris!
195 Judaïca, L. ♃. 6—9. In muris urb. littoral.
β. intermedia.

URTICA. *Tourn.*

§. 1. Cania. — Fl. fœm. disepali in globum digesti.

196 Dodartii, L! ①. 6, 7. In umbrosis sabulosis reg. alluv. (Hoor!)
197 pilulifera, L! ①. 6, 7. In umbrosis sylvæ Sonniæ (Dod. Hocq.)

§. 2. Eucnide. — Fl. fœm. tetrasepali vagi.

198 urens, L. ①. 6—11. In cultis et versuris!
199 dioica, L. ♃. 7—9. In ruderatis ubiquè!

Trib. 2. CANNABINEÆ.

Stamina 5, Filamentis rectis. Stigmata 2.

CANNABIS. *Tourn.*

200 sativa, L. ①. 7, 8. Colitur in agris!

HUMULUS. *Lin.*

201 lupulus, L. ♃. 6, 7. In dumetis et virgultosis freq!

Trib. 3. ARTOCARPEÆ.

Flores rachi undiquè insidentes, demùm baccati.

MORUS. *Tourn.*

202 alba, L. ♄. 5. Passìm culta!
203 nigra, L. ♄. 5. In pomariis culta!

Trib. 4. FICINEÆ.

Flores clinanthio demum pulposo insidentes.

FICUS. *Lin.*
204 Carica, L. ♄. 5—7. In hortis olitoriis culta!

Digitized by Google

Fam. 16. ULMACEÆ. *Mirb.*

Trib. 1. CELTIDEÆ.

Stigmata libera. Ovarium indivisum. Embryo curvatus albuminosus.

CELTIS. *Tourn.*

205 australis, L. ♄. 4, 5. In valle fluminis Ahr. (Dec.)

Trib. 2. ULMEÆ.

Stigmata adnata. Ovarium bifidum. Embryo rectus exalbuminosus.

ULMUS. *Tourn.*

Sect. 1. BLEPHAROCARPUS. — Fr. ciliatus.

206 pedunculata, Foug. ♄, 3, 4. In sylvis calcareis!

207 racemosa, Bechst. ♄. 3, 4. Ad pagos.

Sect. 2. MADOCARPUS. — Fr. glaber.

a. Rami foliiferi pilosi.

208 suberosa ♄. 3. In dumetis et virgultosis!

209 hollandica, Mill. ♄. 3. Ad pagos!

210 vulgaris = Campestris, Auct. nec Lin. Herb! ♄. 3. In sylvis antiquis!

211 corylacea : ramis teretibus, foliiferis pilosis; foliis subsessilibus inæqualiter latè ovatis, cuspidatis, duplicato-serratis; floribus sub sessilibus quinquefidis pentandris; fructibus ovatis glabris. ♄. 3, 4. In sylvis fert.

β. grandidentata, foliis simpliciter grandidentatis.

212 sparsa : ramis teretibus sparsis, foliiferis pilosis; foliis sessilibus, æqualiter obovatis, duplicato-serratis scaberrimis. ♄. 3, 4. In sepibus.

b. rami foliiferi glabri.

213 montana, Sm! = U. campestris Lin. Herb! ♄. 3, 4. In sylvis Condrusiæ. (Michl!)

214 reticulata : ramis foliiferis glabris; foliis inæqualiter ovatis cuspidatis, duplicato-serratis, glaberrimis lævibus infernè reticulatis. ♄. 3, 4. Ad marg. agrorum!

α. stricta : (H. H. Lond. nec dec.) ramis strictis.

β? sepearia : ramis patentibus.

115 glabra, Smith! ♄. 3, 4. Ad margines viarum!

216 acuta : ramis patentibus, foliiferis glabriusculis; foliis basi æqualibus, ovato-oblongis acuminatis, acutè inæqualiter serratis, scabris, infernè puberulis. ♄. 4. Marg. agror.

217 nemorosa, Bechst. ♄. 4: In valle Rhenana. (Bl. et Fing.)

Digitized by Google

Fam. 17. ELEAGNEÆ. *R. Br.*

HIPPOPHAE. *Lin. ed.* 1.

218 rhamnoides, L. ♄. 4, 5. In arenosis maritimis!
α. xanthorax.
β. erithrax.

Fam. 18. THYMELEÆ. *Juss.*

PASSERINA. — Passerina et Stellera. *Lin.*

219 stellera = Stellera passerina, L. ①. 7, 8. In arvis Luxemb!

DAPHNE. *Lin.*

220 Laureola, L. ♄. 3. In sylv. mont. Mosæ. (Dod. Mich!)
221 Mezereum, L. ♄. 12—3. In sylvis montosis!
β. carnea.
γ. leucantha.

Fam. 19. SANGUISORBEÆ. *Rich.*

Trib. 1. ACHEMILLEÆ.

Stylus basiliaris. Perigonium immutatum.

ALCHEMILLA. *Tourn.*

§. 1. APHANES. *Lin.*

222 Aphanes, Leers. ①. 6—9. In arvis frequens!
α. incisa : stipulis incisis.
β. latifolia : stipulis subintegris.

§. ALCHEMILLOTYPUS — Achemilla, *Lin.*

223 montana, Willd. ♃. 5—7. In pratis mont. Arduennæ!
224 vulgaris, Willd. ♃. 4—7. In pratis umbrosis!
225 alpina, Lin. ♃. 6—9. In ericet. alp. Arduennæ. Leod. (Lej!)

Trib. 2. POTERIEÆ.

Stylus subapicilaris. Perigonium mutatum.

POTERIUM. *Lin.*

226 Sanguisorba. L. ♃. 7. In montosis calcareis!

Digitized by Google

227 polygamum, W. et K. ♃. 5—8. Inmontosis calc. Verv! Tornac!

SANGUISORBA. *Lin.*

228 officinalis, L. ♃. 6—8. In pascuis!

Divisio 2.ª TUBIFLORIA.

Ordo 4. THALAMITUBIA.

Fam. 20. PLUMBAGINEÆ. *Juss.*

LIMONIUM. *Tourn.*

229 vulgare, Mill. ♃. 6—8. In æstuariis!
230 bellidifolium. = Statice, Dec. ♃. 7, 8. In Transyssalaniâ (Gort).

STATICE. *Tourn.*

231 maritima, Mill, ♃. 6—8. In æstuariis solo sabuloso!
β. caudata.
γ? exasperata.
232 armeria, L! ♃. 7, 8. In pratis siccis!
α. minor : scapo foliisque puberulis.
β. mixta : scapo glaberrimo foliis, puberulis.
γ. elongata : scapo glaberrimo elongato, foliis puberulis.
δ. arenaria : scapo glaberrimo, elongato foliis glabris.
ε. caudiculata : squamis periclinii elongatis.

Fam. 21. GLOBULARINEÆ. *Dec.*

GLOBULARIA. *Tourn.*

233 vulgaris, L. ♃. 5, 6. Glareos. Condrusiæ (Decl!) Eifliæ!

Fam. 22. PLANTAGINEÆ. *Juss.*

PLANTAGO. *Lin.*

Sect. 1. PSYLLIUM.

234 arenaria, W. et K. ①. 6—8. In aren. Leod. (Lej!)

Digitized by Google

235 Psyllium, Lin. ①. 6—8. In agr. dub. civ.

Sect. 2. Coronopodium.

236 Coronopus, L. ♃. 6—8. In sabulosis siccis!
β. brevifolia, Dec.
γ. jacquini, R. et S.
δ. triflora : scapis bi-tri-floris.
ζ. integrifola : foliis linearibus integris.

Sect. 3. Plantagotypus.

237 maritima, L. ♃. 6—8. In cænosis maritimis.
α. semicylindra.
β. angustifolia.
γ. graminea, Dec.

238 lanceolata, Lin. ♃. 4—9. In pratis siccis ubiquè!
β. sylvatica, Pers.
γ. comosa.
δ. lanuginosa, Boening.
ε. trinervis.
ζ. polystachia, Boening.

239 media, Dod. ♃. 5—7. In incultis frequens!
β. minuscula.
γ. gabriuscula.

Sect. 4. Arnoglossum, *Dioso.*

240 major, Dod. ♃. 6—9. In incultis frequens!
β. minima, Dec.
γ. rosea, Boen.
δ. paniculata.
ε. glaberrima.

LITTORELLA. *Lin.*

241 Lacustris, Lin. ♃. 5—7. In lac. Aren!

Fam. 23. PRIMULACEÆ. *Vent.*

Trib. 1. GLAUCINEÆ.

Calix petaloideus. Corolla nulla. Stamina epithalama.

GLAUX, *Tourn.*

242 maritima, Lin. ♃. 5, 6. In cænosis marit. et salsugin. copiosè!

Digitized by Google

Trib. 2. ANAGALLIDEÆ.

Calix 4—5 partitus.

CENTUNCULUS. *Dill.*

243 minimus, L. ①. 6, 7, In ericetis innundatis!
α. erectiusculus.!
β. humifusus.

ANAGALLIS. *Lin.*

§. 1. Jirasecklia.

244 tenella, L. ♃. 6—8. In paludibus spongiosis.

§. 2. Anagallotypus. — Corolla rotata. Stigm. capit.

245 arvensis, L. ①. 6—9. In cultis et agris!
α. phoenicea.
β. purpurascens.
γ. carnea, Lej.
δ. albiflora.
ε? immaculata, Lej. — An A. repens, Dec?

246 cœrulea, Schreb. ①. 6—8. Arv.

247 serpyllifolia: caule filiformi stricto; foliis ovatis sessilibus, flore terminali sollitario longè pedunculato. ①..... umbros propè freyr. var. prioris? (Decloet!)

ASTEROLINUM. *Hg. et Lk.*

248 stellatum, Hgg. et Lk. ①. 6. In collib. Vervi. (Lej!)

LYSIMACHIA *Tourn.*

§. 1. Adenema. — Stam. glandulosa.

a. Diastixis. Stamina monadelpha.

249 punctata, L. ♃. 6, 7. Rip. foss. Camp. (Dreiss!) Luxb. (tin! March!)
α. bipaginata.
β. pauciflora.
γ. canescens.

b. Nummularia: Stamina basi libera.

250 nummularia, L. ♃. 6, 7. ad scaturgines!

§. 2. Leionema. — Stam. eglandulosa.

a. Lerouxia, Mérat. — St. 5 libera fertilia.

251 nemorum, L. ♃. 5—8. In sylvis umbrosis!

Digitized by Google

b. Steironema, *Raf.* — St. 5 libera filam. steril. intermixt.

252 ciliata, Lin ♃. 7, 8. rip. riv. Leod. (Lej!)

c. Eulysimachia. St. 5, monadelph. fert.

253 vulgaris, L. ♃. 6—9. Ad ripas frequens!
α. conferta.
β. laxa.
γ. verticillata.
δ. prostrata.

d. Naumburgia. *Moench.*

254 thyrsiflora, L. ♃. 6, 7. Rip. Holl! Flandr. (Rouc!) Camp. (Dreiss!)

TRIENTALIS. *Rupp.*

255 europæa, L. ♃. 5, 6. In subalpinis Arduennæ!
β? lucida: foliis lucidis.

Trib. 3. PRIMULEÆ.

Calix 4—5 dentatus.

ANDROSACE *Tourn.*

256 septentrionalis, L. ①. 5, 6. In arvis aren. mont. trinit!
257 maxima, L. ①. 5, 6. In vineis Mosell. (Gmel.)

PRIMULA *Lin.*

258 veris, Sm. ♃. 4. In sylvis humidis!
259 elatior, jacq. ♃. 3, 4. In sylvis humidis!
β. uniflora (March!)
γ? purpurascens.
260 acaulis, Jacq ♃. 3, 4. In sylvis humidis rara:

HOTTONIA *Boerh.*

261 palustris Lin ♃. 5—7. Stagn. et foss. regionis littoral!

Trib. 4. CYCLAMINEÆ.

Corolla revoluta.

CYCLAMEN. *Lin.*

262 hederæ folium, Ait. ♃. 10, 11. Sylv. Tornac. (Mouton ex Clus.)
263 europæum Lin. ♃. 10, 11. In Arduennâ sylvâ (Dod.)

Digitized by Google

Fam. 24. LENTIBULARIEÆ. *Rich.*

Trib. 1. UTRICULARIEÆ.

Calix disepalus. Stamina epipetala. Embryo acotileus.

UTRICULARIA. *Lin.*

264 vulgaris. L. ♃. 7, 8. In fossis stagn. reg. alluv!
α. major.
β. minuscula.
265 minor L. ♃. 6, 7. In fossis minoribus turfosis!
α. unifrons.
β. bifrons.
266 intermedia, Hayne. ♃. 6—8. palustr. Camp. (Haenen.)

Trib. 2. PINGUICULEÆ.

Calix 5 fidus. Stamina epithalama. Embryo dicotyleus.

PINGUICULA. *Tourn,*

267 vulgaris L. ♃. 5, 7. Palud. spong. musc. (Reinw! Hoor! Hec!)
268 lusitanica L. ♃. 6, 7. Palud. propè Aquas Grani (Guill.)

Fam. 25. POLYGALEÆ. *Jun.*

POLYGALA. *Tourn.*

§. 1. CHAMÆBUXUS. Tourn.

269 Chamæbuxus L. ♄. 4, 5. In alpibus Arduennæ Leod. (Lej!)

§. 2. POLYGALOTYPUS.

270 amara L! ♄. Propè Eltenberg (Dreiss!)
β. uliginosa, Rchb.
γ. arduenna.
271 amarella, Crantz ♄. 5—7. In pratis montosis Luxb. (Tin!)
α. hypogæa.
β. epigæa.
272 vulgaris. L. 5—9. In pascuis apricis et ericetosis.
α communis.
β. buxifolia. Rchb.
γ. oxyptera. Rchb.
273 comosa. Schk ♄. 5—7. Prat. mont. arduennæ (Lej! march!)
274 mutabilis: ramis primariis oppositifoliis, secundariis alternifoliis floriferis ♄ 5—o. In ericitis turfosis passim!

Digitized by Google

α. paniculata.
β. tenella.
γ. luteola.

Fam. 26. RHINANTHIDEÆ.

Trib. 1. LIMOSELLEÆ.

Placentarium per dehiscentiam unicum, centrale, liberum.

LIMOSELLA *Lin.*

275. aquatica, Lin. ⓘ 6—8. In limosis hyeme inund!
β. tenuifolia.

Trib. 2. MELAMPYRACEÆ. — Melamp. Rich.

Subtrib. 1. EUPHRASIEÆ.

Stigma capitatum. Ceroma nullum.

EUPHRASIA. *Hall. Sm.*

276 nemorosa, Pers. = E. officinalis. L. ⓘ. 6—9. in pratis siccis!
α. glabrata.
β. ciliata.
γ. tenuifolia.
δ? minima. Pers.
ε? alpina, Lam.

277 viscidula, = E. officinalis Willd. — fol. glanduloso-pubescent. ⓘ. 6—9. Prat. sicc:
α. acuta.
β. obscura.
γ. minima.

ODONTITES. *Hall.*

278 serotina = Euphr. odont. L. ⓘ. 6—8. In agris humidis!
279 verna = Euph. Bell. ⓘ. 5, 6. Ad rispas fluv! Holl. (V. H!)

Subtrib. 2. MELAMPYREÆ.

Stigma truncatum. Ceroma calcariforme.

PEDICULARIS. *Lin.*

280 palustris, L. ②. 5—7. In paludibus turfosis!

Digitized by Google

281 sylvatica, L. ♃. 4—6. In pratis sylvaticis!

ALECTOROLOPHUS. *Hall. Wallr.*

282 villosus = Rhinanth. Pers. ①. 6—8. In pratis Belgii sup!
283 glaber, All. ①. 5—7. In pratis copiosè.
284 minor = rhinanth. Ehrh. ①. 5—7. In pratis Belgii sup!

MELAMPYRUM. *Lin.*

285 cristatum, L. ①. 6, 7. In sylvis Luxbg. (March! Tin!) Eifliæ!
286 arvense, L. ①. 6, 7. In arvis argillosis!
β. albiflorum.
287 nemorosum, L. ①. 7, 8. In sylvis Arduennæ (Cromb!) Hann! (Desm.)
288 vulgatum, Pers. ①. 6—9. In sylvaticis frequens!
β. obscurum = M. sylvat. Sturm.
289 sylvaticum L. ①. 6—8. In sylvis montosis. dub. civ.

Trib. 3. OROBANCHEÆ. *Vent.*

LATHRÆA. *Lin.*

§, 1. SQUAMARIA. *Riv.*

290 Squamaria, L. ♃. 4, 5. In sylvis et coryletis!

§. 2. CLANDESTINA. *Tourn.*

291 clandestina, L. ♃. 5. Umbr. humid. Belg. merid. (Hoor! desm!)

OROBANCHE.

§. 1. OSPROLEON. *Wallr.*

292 major, Sm. ♃. 6, 7. In spartio parasit. dub. civ.
293 rapum genistæ, Thuil. ♃. 6, 7. In spartio parasit!
294 elatior, Sutt. ♃. 6, 7. In trifolii rad!
295 caryophyllea. Sm! ♃. 5, 6. In galio
β? sparsiflora, Wallr.
296 mutila: bracteis solitariis; calicibus disepalis inæqualiter bifidis; floribus unisexualibus quadrifidis. — O. cernua Hoor! ♃? In Flandriâ (Hoor!)
297 labellata = O. gracilis Wallr. non Sm. ♃.? In Flandriâ (Hoor!)
298 minor, Smith! ①. 7, 8. In trifolio.
299 arvensis: bracteis solitariis; calicibus disepalis, lanceolatis integerrimis; corollis bilabiatis, laciniâ mediâ lobatâ; staminibus styloque glabris. ①. 7—9. In trifoliis.
β. rubiginosa: laciniâ mediâ indivisâ obtusâ.

Digitized by Google

§. 2. Trionychon. *Wallr.* — Kopsia Nob. non Rienw.

300 ramosa Lin. ①. 8—10. In radicibus cannabis!
301 coerulea, Vill. ♃. 7. In graminosis Luxbg. (march! tin! cromb!)

Trib. 4. ANTIRRHINEÆ.

Placentaria, 2 centr. fixa. Dissip. impart. Cor. lab.

ANTIRRHINUM *Tourn; Desf.*

302 majus, Lin ♃. 6—9. In muris et rupibus!
303 latifolium, Mill. ♃. 5—9. In muris Tornac!
304 Orontium L. ①. 7—10. In arvis.

ANARRHINUM. *Desf.*

305 bellidifolium, Desf. ②. 6—7. In Flandriâ fide Hoor!

Linaria. — Capsula dentibus dehiscens.

§. 1. Chænorrhinum. *Dec.*

306. Minor, Desf. ①. 6—8. In cultis et agris frequens!
β. reflexa.

§. 2. Leontorrhinum. — Faux clausa: Stam. plana.

307 simplex, Dec. ①. 6—8. In agris Leod. (Lej!) L.a
308 arvensis, G. M. et S. ①, 6—9. In arvis Lux bg! L.a
309 dubia = anthirrinum Vill. ①. 5—7. In aridis Walcourt (Desm!)
310 Thuillieri, Merat. ①. 6—8. In siccis Flandriæ fide Hoor!
311 elongata: caule erecto, ramis elongatis strictis; foliis oppositis sparsisque linearibus, planis, glabris; bracteis lanceolatis; pedicellis pubescentibus calice longioribus; calcare recurvo. In Luxbg. (March!)
312 vulgaris, Mill. ♃. 6—9: In incultis frequens!
α. glandulosa, Lej.
β. prostrata.
γ. peloria.

§. 3. Lycorrhinum. — Faux cl. Sem. teret. Dehisc. caps. apic.

313 genistifolia, Mill. ♃. 6, 7. In montosis Torn. (Patern.)
314 purpurea, Mill. ♃. 6, 7. In Flandr. (Hoor!) Gallob. (Fert.)
315 repens = Anthirr. Sm. ♃. 6; 9. In muris et petrosis!
α. gleoides.
β. monspessulana.
316 triphylla, Mill. ①. 5, 7. Agr. Belg. merid. (Decl! Tin! Desm!)

§. 4. Cymbalaria. — Dehiscentia capsulæ subapicilaris.

317 Cymbalaria, Mill. ♃. 4—10. In muris et rupibus!
β. albiflora.

Digitized by Google

KICKXIA. — Singulum capsulæ loculum post lapsum valvulæ circumscissæ, foramine magno edentulo dehiscens. Reliq. Linariæ.

318 Elatine. = Antirrh. L. ⊙. 7—9. In arvis argillosis!
319 spuria. = Antirrh. L. ⊙. 7—9. In arvis rarior!
β? geminiflora.

Trib. 5. SCROPHULARIEÆ.

Corolla irregularis nec labiata. Placentaria 2 simpl. dissepimentum duplicatum bipartibile.

Subtrib. 1. VERONICEÆ.

Corolla inæqualis 4 fida. Stamina 2.

VERONICA. *Tourn.*

I. Veronica. — Corolla rotata, tubo sepalis breviore.

§. 1. POCILLA. — Corollæ faux villis clausa. Sem: urceol.

320 filiformis, Sm. ⊙. 3—5. In cultis oleracis!
321 agrestis, L! = pulchella, Dec. ⊙. 4—6. Agr. et olerac
322 obscura. = v. agrestis, Auct. nec L. ⊙. 4—6. In agris et oleraceis!
323 hederifolia, L! ⊙. 4—6. In cultis et ruderatis!

§. 2. BERULA. — Corollæ faux glabra.

324 triphyllos, L! ⊙. 4, 5. In agris arenosis!
325 præcox, All. ⊙. 4, 5. In arvis argillosis. (Tint! Cromb!)
326 acinifolia, L. ⊙. 5, 6. In arvis (Decl! Desm!)
327 verna, L! ⊙. 4, 5. In arvis arenosis (Tin! March!)
328 arvensis, Lin! ⊙. 3—8. In arvis frequens!
β. polyanthos, Thuil!
329 peregrina, L! ⊙. 5, 5. In arvis Flandr! Brab. (Decl!)
β. romana, Lin!
330 serpyllifolia, L. ♃. 5—10. In pasc. et sylv. humid!
β. nummularifolia, Lej.

§. 3. BECCABUNGA. — Corollæ faux glabra.

331 Beccabunga, L. ♃. 6—9. In fossis et limosis!
β. limosa, Lej.
332 Anagallis, L! ⊙. 6—9. In fossis paludosis!
333 scutellata, L! ♃. 7, 8. In paludibus præsertim sabulosis!
β. parmularia, Poit. et Turp.

§. 4. URANOSTACHYS. — Corolla faux villis clausa. Sem: lentic.

334 montana, L! ♃. 5, 6. Sylv. mont. (Mich! March! Desm!)
335 Chamædrys, L! ♃. 5—7. In umbrosis et sepibus!

Digitized by Google

β. heterophylla.
336 officinalis, L! ♃. 5—7. In umbrosis et sepibus!
β. tournefortii, Schm.
γ. spadana, Lej.
337 satureiæfolia, Poit. et Turp? ♃. 5, 6. Pasc. sicc. Tornac!
338 prostrata, L! ♃. 5, 6. In collibus siccis Luxemb!
β. erectior.
γ. decumbens, glabrior.
339 Teucrium, L. ♃, 5, 6. In graminosis montanis!
340 latifolia, L! ♃. u, 6. In pascuis. (Lej!) Var. prioris?

II. Hedystachys. — Corolla tubulosa subæqualis.

a. sempervirentes.
341 spicata, L! ♃. 7, 8. In sylvis apricis. (Hoor! Rouc!)
342 hybrida, L! ♃. 6, 7. In sylvis montosis Leod. (Lej.)
b. hybernantes.
343 paludosa, Lej! ♃. 6, 9. In paludibus agri Leod. (Lej!)
344 media, Schrad. ♃. 6, 7. In sylvis montosis Luxemb. (Tin!)
β. alternifolia, Lej! in sylvis montosis agri Leod. (Lej!)
345 longifolia, L! ♃. 6, 7. In Transyssalaniâ (Gort)
α. Linneana. = V. Schreberi, Baugm. lips. omninò.
β. pubinervis. = V. maritima, Degeer! Brab. sept. (Beyer!)
346 maritima, L! Rchb. 70 opt. — β. nitida. = V. spuria Lej! ♃. 6, 7. Sylv. Leod. (Lej)
347 laxiflora, Lej! ♃ 6, 7. In sylvis Leod. (Lej!)

Subtrib. 2. Digitalideæ.

Corolla tubulosa inæqualis. St. didyn.

GRATIOLA. *R. Br.*

348 officinalis, L. ♃. 6—9. In pratis humidis et ad ripas!

DIGITALIS. *Lin.*

§. 1. Dactylanthos. — Corolla campanul.

249 purpurea, Lin. ②. 6—8. In dumetis et sylvis!
β. carnea.
γ. albiflora.
δ. emarginata.
350 Libertiana: foliis petiolatis ovato-oblongis, rugosis, undulatis, crenatis; sepalis ovatis; corollæ lobis obstusis, palato glabro immaculato. — D. purpurascens, Lej. excl. syn. ②. 7, 8. In sylvis lapidosis propè Malmundarium (D.a Libert!)
251 ochroleuca, Jacq: ♃. 6—8. In montibus saxosis Arduennæ.
252 grandiflora, Lamck. ♃. 6, 7. In montibus saxosis Luxemb!

Digitized by Google

α. acutiloba.
β. obtusiloba.

Sect. 2. Dactylopsis. — Corolla tubulosa.

353 purpurascens, Roth. β. longiflora. ♃. 6, 7. Sylv. mont. Verviens. (Lej.)
354 media, Roth. ♃. 6, 7. In sylvis montosis Arduennæ. (Lej.)
355 lutea, L. ♃. 6—8. In sylvis montosis Arduennæ.
α. acutifolia.
β. obtusiloba.

Sect. 3. Pogonanthus. — Labium porrectum, tubi longitudine.

356 ferruginea, L. ②. 8. In lapidosis Namurc. (Kx! et Quetl.)

SCROPHULARIA. *Tourn.*

357 vernalis, L. ②. 4, 5. In dumetis et sepibus. (Lej! Dek! Hoor!)
358 peregrina, L. ①. 5, 6. In sepibus Flandriæ. (Desmaz.)
359 nodosa, L. ♃. 6, 7. In sepibus et umbrosis!
360 umbrosa : caulibus alatis; foliis simpliciter serratis, decurrentibus, glabris, inferioribus oblongis acutis, summis lanceolatis acuminatis; paniculâ terminali. ②, 6, 8. In umbrosis Luxemburgii!
361 aquatica, L. ②. 6—9. In fossis et ad ripas!
β. foliolata.
362 canina, L. ♃. 5, 6. In sabulosis Flandriæ (Hoor!)

Fam. 27. VERBASCINEÆ. *Comm. Bot.*

VERBASCUM. *Lin.*

§. 1. Blattaria. Capsula pilis radiantibus destituta.

363 Blattaria, L. ① ②. 6—8. In glareosis!
β. glabrum, Mill.
364 Blattariodes, Lam ①, ②. 6, 7. In agris Tornac. semel! in Holl?

§. 2. Thapsus. — Capsulæ pilis radiantibus tectæ.

α. fol non decurrent. filamenta omnia barbata.
165 nigrum, L. ♃. 6—8. In glareosis et ad vias!
β. albiflorum.
γ. parisiense, Th.
δ. angulatum.
ε. hybridum, Lej.
ζ. alopecurus, Th.
366 Lychnitis, L. ②. 6—8. In sterilibus siccis!
α. citrinum.
β. mœnchii.

Digitized by Google

367 floccosum, W. et K. ②. 7, 8. Glareos. sicc. Luxemb. (Tin!)
b. fol. sub decurrentia. stamina omnia densè barbata.
368 ambiguum, Lej. ♃. 7. propè Malmundarium (D.a Libert.)
c. fol. semi decurrent. stamina longiora glabra.
369 phlomoïdes, L. ②. 6—8. In ruderatis incultis.
α. archetypum.
β. australe, Schr.
γ. nemorosum, Schr.
b. folia decurrentia. stam. longiora glabra.
370 Kickxianum = bracteatum, Kx! ②. 7, 8. In ruderat. Mechliniæ (Kx!)
371 Thapsiforme, Schard. ②. 7.—9. In ruderatis siccis!
β. cuspidatum.
372 Thapsus, Lin. ②. 6—8. In ruderatis siccis!

Fam. 28. SOLANEÆ. — Solanearum Gen. *Juss.*

Trib. 1. NICOTIANEÆ.

Fructus capsularis.

HYOSCYAMUS. *Tourn.*

373 niger, L. ②. 5—8. In ruderatis, ad vias!
374 agrestis, Schult. ①. 7, 8. In cultis et incultis!
375 pallidus, W. et K. ①. 7, 8. propè Lovanium (Kickx!)

NICOTIANA. *Tourn.*

§. 1. NICOTIA. — Corolla ecaudata. Stam. æqualia.
376 rustica, L. ①. 7, 8. In agris et sylvis Luxemb. (March!)
§. 2. TABACUM. — Corolla caudata. Stam: inæqualia.
377 Tabacum, L. ①. 8, 9. Colitur in agris.

DATURA. *Pers.*

378 Stramonium, L. ①. 7—9. In ruderatis et ad vias!
379 Tatula, L. ①. 7—9. In ruderatis et ad vias (Mich!)

Trib. 2. CAPSICEÆ.

Fructus baccatus.

PHYSALIS. *Lin.*

80 Alkekengi, L. ♃. 6—8. In sylvis humidis (Rouc! Hoor! Decl!)

Digitized by Google

ATROPA. *Gærtn.*

381 Belladona, L. ♃. 6—8. In umbrosis montosis!

SOLANUM. *Tourn.*

§. 1. PETOTA. — pedicelli articulati.

382 tuberosum, L. ♃. 7, 8. Colitur in agris.

§. 2. MORELLA. *Dun.*

383 nigrum, L. ①. 6—10. In ruderatis et cultis.
β. humile.
γ. lutescens.

384 villosum, L. ①. 6—9. In ruderatis et ad vias!
β. miniatum. prope Malmund. (D.a Libert)

§. 3. DULCAMARA. — Pori staminum rotundi. Styl. medio vill.

385 Dulcamara, L. ♄. 5—7. In sepibus humidis freq!

LYCIUM. *Lin.*

386 lanceolatum, Vieill. ♄. 7—10. In monte Petersb. (Mich!)

387 barbarum, Lin. ♄. 6—9. In ruderatis!
α. spinescens.
β. inerme.

388 chinense, Mill. ♄. 5—10. In ruderatis Tornac!

Fam. 29. BORAGINEÆ. *Juss.*

Trib. 1. HELIOTROPIEÆ.

Glandes 4 monospermæ, antè maturitatem pericarpio carnoso tectæ.

HELIOTROPIUM. *Lehm*

389 europœum, L. ①. 7, 8. In arvis sabulosos. (Hoor! Tin!)

Trib, 2. LITHOSPERMEÆ.

Glandes 4 distinctæ; corolla regularis; stamina æqualia.

Subtrib. 1. CYNOGLOSSEÆ.

Glandes columnæ centrali affixæ, pendulæ.

ASPERUGO. *Tourn.*

390 procumbens, Lin. ①. 4, S. In ruderatis.

Digitized by Google

CYNOGLOSSUM. *Tourn.*

391 officinale, L. ②. 5, 6. In ruderatis et pascuis siccis!
β. hybridum.
γ. bicolor.

MERTENSIA. *Roth.*

392 maritima = pulmonaria, Lin. ♃. 7. In maritimis Gallob. (Neck

OMPHALODES. *Tourn.*

393 verna, Mœnch. ♃. 3—5. In labib. sylvat. Peterb! Torn. (Vois!)

LAPPULA. *Riv.*

394 myosotis, Mœnch. ①. 6—9. In muris antiquis. (Hoor!)
395 squarrosa = Myosotis Retz. ①. Collib. et mur.

Subtrib. 2. ANCHUSEÆ.

Glandes fundo calicis affixæ erectæ. Corollæ faux appendiculata.

MYOSOTIS. *Scop.*

§. 1. MYOSOTIPUS. — Calices articulati, basi uncinato-pilosi.
a. Corollarum limbo concavo.

396 stricta, Lk. ①. 5—8. In arvis et agris.
397 versicolor, Sm. ①. 5—7. In arvis sabulosis!
398 hispida, Schl. ①. 5, 6. In collibus siccis et muris!
399 intermedia, Lk. ②. 5—8. In arvis argillosis!
b. corollarum limbo plano.

400 sylvatica, Lehm. ♃. 4, 5. In sylvaticis montosis!
α. archetypa.
β. petræa = alpestris Lej! nec Hook!
γ? radicans: caule basi radicante.

§. 2. SCORPIOIDES. — Calix marcescens, basi adpressè pilosus.

401 cespitosa, Schult. ①. 5—9. In pratis humidis!
402 strigulosa. = Str. et laxifl. Rchb. ②. 5—7. In pratis et sylvat!
α. racemosa.
β. laxiflora.
403 palustris, With. ♃. 6—10. Ad ripas frequens!
β. repens.
γ. gracilis.
δ? procurrens: segm. calic. inæqual.

Digitized by Google

ANCHUSA. *Lehm.*

§. 1. Anchusotypus. — Calix 5— dent.

404 officinalis, L. ♃. 6—9. In pascuis siccis et ruderatis!
α. pinguis.
β. arvalis.
γ? dunensis.

405 sempervirens, L. ♃. 5—10. In ruderatis prope Tornac!

§. 2. Buglossum. — Cal. 5— partit. Tubus cor. rectus.

406 vulgaris. = Bugloss. Tausch. In Flandriâ fide Hoor!

407 italica, Willd. ②. 7. In limin. agror. Brab. (D. et P.) dub. civ.

§. 3. Lycopsidium. — Corollæ tubus incurvus.

408 lateriflora: caule erecto ramoso; foliis oblongis decurrentibus pilosis; bracteis ovatis calice fructifero longioribus; floribus extraaxillaribus; corollæ tubo incurvo. A. verrucosa Lej. in litt. ①. agr. Leod. (Lej!)

409 arvensis, Bieb. ①. 6, 7. In agris sabulosis freq!

BORAGO. *Boerh.*

410 officinalis, L. ①. 5—9. Spontè in agris et ruderatis!

SYMPHYTUM. *Tourn.*

411 officinale, L. ♃. 5—7. In pratis humidis!
β. patens.

412 tuberosum, L. ♃. 7. In humidis Flandr. (Hoor!) gallob. Desch!)

Subtrib. 3. Pulmonarieæ.

Glandes fundo calicis affixæ; erectæ. Corollæ faux nuda.

LITHOSPERMUM. *Lin.*

§. 1. Trachyspermum. — Glandes asperæ.

413 arvense, L. ①. 5—7. In agris inter segetes!

§. 2. Lithospermotypus. — Glandes lævissimæ.

414 officinale, L. ♃ 5—7. In ruderatis calcareis!

415 pupureo-cæruleum, L. ♃. 5—7. In umbrosis Luxemb.

PULMONARIA. *Lehm.*

416 officinalis, L. ♃. 3—5. umbros. et dumet. argillosis!
β. immaculata.

417 saccharata, Mill. ♃. 4, 5. In umbrosis Leod. (Lej!)

418 augustifolia, L! ♃. 4, 5. In nemoribus.

419 mollis, Wolf. ♃. 4, 5. In sylvis mont. Arduennæ!

Digitized by Google

Trib. 3. ECHIEÆ.

Glandes 4 distinctæ. Corolla et stamina inæqualia.

ECHIUM. *Tourn.*

420 vulgare, L. ②. 6, 8. in ruderatis siccis!

Fam. 30 LABIATEÆ. *Adans.*

Series. 1. UNILABIATÆ.

Trib. 1. TEUCRIEÆ.

AJUGA. *Lin.*

421 reptans, L! ♃. 5, 6. In sylvis humidis freq!
β. pseudopyramidalis.
422 alpestris : eflagellis, caule bifariàm piloso. A. alpina, Lej! nec Lin. ♃. 7, 8. Mont subalp. Arduennæ Malmund. (D.a Libert!)
423 genevensis, L! ♃. 5—7. In pascuis sterilibus!
α. archetypa.
β. alpina, Lin!
γ. frigida = alpina, Wahl.
δ. grandidentata.
424 pyramidalis, L! ♃. 5, 6. In montosis Arduennæ!

CHAMÆPITYS. *Tourn.*

425 trifida = Teucrium chamæpitys, L. ②. 4—7. In lapid sicc!

TEUCRIUM. *Adans.*

§. 1. POLIUM. *Tourn.*

426 aureum, Cav. ♄. 7. 8. In saxosis propè Givet. (Hée!)
427 montanum, Schreb. ♄. 7, 8. In montibus lapidosis Luxemb. (March!)

§. 2. CHAMÆDRYS. *Tourn.*

428 Chamædrys, L. ♄. 6—8. In apricis calcareis!
β. major.
429 Scordium, L. ♃. 7—9. In paludibus limosis!
430 Botrys, L. ①. 6—8. In apricis calcareis!
β. albiflorum.

SCORODONIA. *Adans.*

31 heteromalla, Mœnch. ♃. 77, 8. In sylvaticis et cricetis!

Digitized by Google

Series 2. BILABIATÆ SEGREGATIFLORÆ.

Flores bilabiati, axillares, pedunculo communi haud insidentes.

Trib. 2. SALVIEÆ.

Antheræ 2 fert. loculis connectivo longo discretis.

SCLAREA. *Tourn.*

§. 1 GLUTINARIA. *Heist.*

432 glutinosa. = Salvia, L. ♃. 6—9. In sylvis montos. Flandr. (Hoor!)

§. 2. ÆTHIOPS. — Lab. sup. calicis 3 dent.

433 vulgaris; Mill. ②. 6—8. In ruderatis aridis (Mich! Lej! March!)
434 pratensis, Mill. ♃. 5—7. In pratis Belgii Orient!
β. agrestis.
γ. incisa.
435 sylvestris, Mill. ♃. 6, 7. In pratis montosis. (Lej!)

SALVIA. — S. et Horminum. *Tourn.*

§. 1. HORMINUM. *Tourn.*

436 verbenaca, L. ♃. 6—10. In pascuis glareosis!
437 verticillata, L. ♃. 6—9. In ruderatis Flandr. fide Hoor!

§. 2. SALVIOTYPUS. — Salvia, *Tourn.*

438 officinalis, L. ♄. 6, 7. In olitoriis culta!

Trib. 3. MELITTIDEÆ.

Stamina 4. didynama. Flores ebracteolati.

Subtrib. 1. SCUTELLARIEÆ.

Calix bilabiatus edentulus. Corolla personata clausa.

SCUTELLARIA. *Lin.*

439 galericulata, L. ♃. 6—9. Ad ripas fossarum!
440 minor, L. ♃. 7—9. Ad ripas in ericet. uliginosis.

Subtrib. 2. PRUNELLEÆ.

Calix dentatus. Corolla bilabiata aperta. Stigmata conformia.

PRUNELLA. *Lin.*

441 grandiflora, Poll. ♃. 6—8. In graminosis siccis.
β? pinnatifida, Lej.

Digitized by Google

442 surrecta : caule surrecto; foliis oblongis in petiolum decurrentibus patentìm hirsutis; labio calicis superiore trilobo, corollis calice vix longioribus. ♃. 6—8. In humentibus.
443 reptans : caulibus repentibus radicantibus, floriferis surrectis — P. vulgaris auct. ♃. 6—9. Pasc. sicc!
444 laciniata, L. ②. 6—8. In apricis graminosis!
445 hyssopifolia, L. ♃. 6, 7. In Flandriâ fide Hoor!

MELITTIS, *Lin.*

446 Melissophyllum, L. ♃. 5, 6. In sylvis Flandr. (Hoor.) Leod. (Doss.)

TRIXAGO. *Haller.*

447 arvensis. = Stachys, L. ①. 6—9. In arvis humidis!

Subtrib. 3. SIDERITIDEÆ.

Stigmata dissimilia.

HESIOIDA. = H. et Burgsdorfia Moench. — Cal. bilabiatus. Rel. seq.

448 montana = Sideritis, L. ①. 6—8. In apricis!

SIDERITIS. *Moench.*

449 hirsuta, L. ♄. 7, 8. Ad vias in Hollandiâ. (Comm.) Dub. civ.

Trib. 4. STACHYDEÆ.

Stamina 4 didynama. Flores bracteolati.

Subtrib. 1. BETONICEÆ.

Corollæ faux cylindrica.

BETONICA. *Tourn.*

450 incana, Mill. ♃. 7, 8. In sylvis Flandriæ. (Muss!)
451 stricta, Ait. ♃. 6—8. In sylvis montosis Arduennæ!
α. erecta.
β. adscendens.
γ. longifolia.
δ. peloria.
452 officinalis, L. ♃. 6—8. In sylvis humidis!
α. usualis.
β. montana.
453 hirsuta, L. ♃. 6—8. In agro Leodiensi. (Lej!)

STACHYS. *Hall.*

§. 1. OLISIA. — Bracteolæ subulatæ. Calicis dent. falcati.

454 maritima, L. ♃. 5—8. In maritimis Flandriæ. (Hoor!)

Digitized by Google

455 annua, L. ①. 7—9. In agris Luxemb. etc.

§. 2. Stachydotypus. — Bracteolæ subul. Calicis dent : rect.

456 Sideritis, Vill. ♃. 6—8. In ruderatis sabul. vall. Mosellæ!
457 palustris, L. ♃. 6—8. In pratis humidis!
458 sylvatica, L. ♃.. 6—8. In sylvis humidis!

§. 3. Eriostomum. *Hgg. et Lk.*

459 alpina, L. ♃. 7—9. In mont. lapidos. Arduennæ!
460 germanica, L. ♃. 6, 7. In ruderatis siccis. (Hec! Belv! Mich!)

Subtrib. 2. Galeopsideæ.

Corollæ faux inflata.

LAMIUM. *Lin.*

§. 1. Lamiopsis. — Corollæ tub. cylindr. Antheræ comosæ.

461 amplexicaule, L. ①. 3—6. In arvis frequens!
462 incisum, Willd. ①. 2—5. In arvis sabulosis!
β? obscurum.
463 purpureum, L! ①. 3—9. In ruderatis et cultis!
β. albiflorum.

§. 2. Lamiotypus. — Corollæ tubus anticè ventricosus.

464 album, L! ♃. 4—9. In ruderatis copiosè!
β. roseum.
465 mutabile : caule supra terram repente, foliis cordatis duplicato serratis petiolatis, corollæ galeâ pilis edentulis tectâ, labio edentulo. L. maculatum, Drev. et Hayne. ♃. 3 5. In dumetis!
466 maculatum, L! ♃. 4—9. In dumetis!

§. 2. Orvala. *Dec.*

467 Orvala, L. ♃. 5. In Transyssalaniâ (Gort.)

GALEOPDOLON. *Dill.*

468 luteum, Huds. ♃. 4—6. In umbrosis humidis!
β. montanum.

GALEOPSIS. *Scop.*

§. 1. Ladanum.

469 angustifolia, Hoffm. ①. 7—8. In collibus lapidos!
470 ladanum, L. ①. 7—9. In ruderatis et agris copiosè!
β. macilenta.
471 intermedia, Vill. ①. 7, 8. In lapidosis Leod. (Girard!)
β. lanceæfolia.
472 ochroleuca, Lamk. ①. 7—9. In arvis et collibus lapidos!
γ. purpurea.

Digitized by Google

§. 2. Tetrahit.

473 versicolor, Curt. ①. 7, 8. In agris secalinis!
474 Tetrahit, L. ①. 7—9. In arvis et sylvaticis!
β. sylvestris.
475 bifida, Boen. ①. 7—9. In arvis Arduennæ. (Lej. et Court.)
476 pubescens, Bess. ①. 7—9. In agris argillosis.

Series 3.ª BILABIATÆ AGGREGATIFLORÆ.

Flores corymbulosi vel axillares, pedunculo communi insidentes.

Trib. 5. LEONUREÆ.

Bracteolæ inordinatæ verticillatæ, horizontales.

Subtrib. 1. Marrubieæ.

Calix sessilis basi bracteolatus.

LEONURUS. *Lin.*

§. 1. Cardiaca, *Dec.*

477 Cardiaca, L. ♃. 6—8. In dumetis et ruderatis!
478 canescens : caule hirto, foliis calicibusque villosissimis, floriferis trilobis; dentibus calicis inferioribus recurvatis. ♃. 6—8. In ruderatis Tornac!

§. Chaiturus, *Dec.*

479 marrubiastrum, L. ♃. 7—9. In cultis siccis Flandriæ (Hoor!)

MARRUBIUM.

480 vulgare, L. ♃. 6—8. In ruderatis et aggeribus!

BALLOTA, *Lin.*

481 alba, L! ♃. 7—9. In ruderatis et ad sepes frequens!
β. purpurea.
482 nigra, L! = vulgaris, Lk. ♃. 6—9. In ruderatis rar!

PHLOMIS. *Tourn.*

483 herbaventi, L. ♃. In Flandriâ fide Hoor. (Dubia civis.)

Subtrib. 2. Clinopodeæ.

Bracteolæ ad basin pedicellorum.

Digitized by Google

CLINOPODIUM. *Tourn.*

484 vulgare, L. ♃. 6—8. In dumetis calcareis!

Trib. 6. NEPETEÆ.

Bracteoleæ oppositæ. Flores in corymbulis digesti.

Subtrib. 1. CATARIEÆ.

Bracteolæ laxæ. Calix subæqualis.

SATUREIA. *Lin.*

485 hortensis, L. ①. 7—9. In cultis olitoriis!
486 montana, L. ♄. 7—9. Collib. aridis Spad. (Lej!)

NEPETA. *L.*

487 Cataria, L. ♃. 6—8. In dumetis et ruderatis!
488 citriodora = N. cataria B. Lej. ♃. 6—8. graminos. Limb. cum D. Dumoulin!

GLECOMA. *Lin.*

489 hederaceum, L. ♃. 4—6. In dumetis et sepibus!

HYSSOPUS. *Tourn.*

490 officinalis, L. ♄. 6—9. In muris antiquis!
β. rubriflorus.

Subtrib. 2. MELISSEÆ.

Bracteolæ laxæ. Calix bilabiatus.

MELISSA. *Mœnch.*

491 officinalis, L. ♃. 7—9. In sepibus et frutetis montosis!

THYMUS. *Scop.*

§. 1. CALAMINTHA. *Lamck.*

492 Calamintha, Scop. ♃. 7—9. In collibus saxosis!
493 Nepeta, Sm. ♃. 7, 8. In glareosis Gelr. et Holl.
494 grandiflora, Scop. ♃. 7, 8. In collibus saxosis Arduennæ (Lej!)

§. 2. SERPYLLUM. *Pers.*

495 vulgaris, L. ♄. 6—8. Colitur in hortis olitoriis!
496 Serpyllum, Schreb ♄. 6—9. In incultis et aggeribus!

Digitized by Google

β. glabrum, Ehrh.

497 deflexus, Lej. ♃. 5—8. In arenosis Campiniæ!

498 sylvestris, Schreb ♃. 6—8. In graminosis siccis montanis!

499 citratus; caulibus adscendentibus; foliis ovalibus; floribus verticillatis, staminibus inclusis, corollis calici longè ciliato subæqualibus. ♃. In collib. sicc!

α. citriodorus, Schreb.

β. subcitratus, Schreb.

500 angustifolius, Schreb. ♃. 6—9. In graminosis siccis!

β. inolens = inodorus Lej. non Desf.

501 lanuginosus, Schk. ♃. 6, 7. In ericetis siccis Flandr. (Hoor!)

§. 2. ACINOS. *Pers.*

502 Acinos L! ②. 5—9. In pascuis siccis lapidosis!

β. villosus, Pers.

503 canescens: caulibus diffusis foliisque canescentibus; corollis calici gibboso æqualibus ②. 5—8. arenos Flandr.

504 alpinus, L! ♃. 7—9. graminos. flandr (Hoor!) hann. (Hocq.) dub. civ.

Subtrib. 3. ORIGANEÆ.

Bracteolæ imbricatæ calicem recondentes.

ORIGANUM. *Tourn.*

505 vulgare, L. ♃. 7—9. In ruderatis calcareis!

506 humile, Pers. ♃. 7, 8. In ruderatis Verviens. (Lej.)

Series. 4ª. SUBREGULARES.

Trib. 7. MENTHEÆ.

Corolla subregularis, segmento superiore bifido.

MENTHA. *Lin.*

α. Flores terminales spicati vel capitati.

507 rotundifolia, L. Sm! ♃. 7—9. In pratis humidis!

508 dulcissima = velutina, Lej! nec Ehrh. ♃. 7—9 In fossis humidis!

509 nepetoides, Lej! ♃. 7—9. Secùs rivul. Nessonv. (Mich!)

510 nemorosa, Willd. ♃. 7—9. In fossis humidis! seq. var?

β. velutina, Ehrh!

511 sylvestris, L. ♃. 7—9. In ruderatis humidis!

β. villosa, Huds.

γ. incana, Willd.

δ? versicolor.

512 viridis, L! ♃. 7, 8. In fossis humidis!

β. angustifolia.

Digitized by Google

513 crispata Schrad. ♃. 7—9. In humidis Leod. (Lej!)
514 cordifolia Opiz. ♃. 7, 8. In ruderatis Viand!
515 piperita, Sm! nec L! ♃. 7, 8. In humidis Leod. (Lej. Lib.)
516 citrata, Ehrh. ♃. 7, 8. Secus ripas Malmund. (D.a Lib!)
517 aquatica, L! ♃. 7—9. In aquosis!
? β. hirsuta, L! ♃. 7, 8. In aquosis freq!
b. flores axillares.
518 sativa, L! ♃. 7—9. ad ripas!
519 arvensis, L! ♃. 6—9. In agris inundatis!
β. austriaca, Jacq.
γ. procumbens Thuil!
520 pulegioïdes: foliis cordatis, floriferis sensim minoribus, summis verticillo suo brevioribus; floribus spicato-verticillatis; calicibus undiquè, pedicellis retrorsùm hirtis; staminibus inclusis ♃. 7, 8. In aquosis Leod. (Mich!)
521 acutifolia, Lej. ♃. 8. In humidis Malmund. (D.a Lib.)
522 nummularia, Lej. ♃. 8. In aquosis Leod. (Lej.)
523 elliptica, Lej. ♃. 8. In humidis Malmund. (D.a Lib.)
524 deflexa: verticilliflora, pilis caulinis ramisque deflexis; foliis ovatis utrinquè attenuatis; pedunculis gabriusculis, calicibus patentìm hirtis. ♃. 7—9. In ericetis uligin. Campiniæ et Gelriæ!
α. fruticulosa, erecta ramis deflexis.
β. simplex, erecta ramis nullis.
γ. diffusa, patula caulibus adscendentibus. An M. diffusa, Lej?
525 diversifolia: verticilliflora, foliis petiolatis puberulis, inferioribus rotundatis integerrimis, mediis ovatis obtusis, superioribus ovato-lanceolatis serratis, summis lanceolatis; calicibus undiquè, pedicellis retrorsùm hirtis; staminibus exsertis. ♃. 8. In Campiniâ. (Mich!)
526 gentilis, L! ♃. 7—9. In fossis lutosis!
β. variegata, Sole! = elegans, Lej!
527 rubra, Smith! ♃. 7—9. In fossis Leod. (Lej! Olis!)

§. 2. Pulegium.

528 pulegium, L! ♃. 7, 8. In pascuis lutosis et ad ripas!

LYCOPUS. *Tourn.*

529 europæus, L. ♃. 6—9. In sylvis humidis!
β. incanus.
530 exaltatus, L. F. ♃. 6—9. In sylvis montosis Tornaci!

Fam. 51. VERBENACEÆ. *Juss.*

VERBENA. *Juss.*

531 officinalis, L. ♃. In ruderatis et ad vias!

Digitized by Google

Trib. 1. CUSCUTEÆ.

Stylus multiplex. Embryo acotyleus.

CUSCUTA. *Lin.*

§ 1. Cuscutotypus. — Corolla 4.— fida; stamina 4.

532 europæa, L. ①. 7—9. In dumetis!

§. 2. Epithymum. — Corolla 5 fida; stamina 5.

533 epilinum, Weihe. ①. 7. In lino!

534 epithymum, Murr. ①. 7, 8. In ericetis!

Trib. 2. CONVOLVULEÆ.

Stylus simplex. Embryo dicotyleus.

CALYSTEGIA. *R. Br.*

535 sepium, R. Br. ♃. 7—9. In dumetis humidis!

536 Soldanella, R. Br. ♃. 6, 7. In arenosis maritimis!

CONVOLVULUS. *R. Br.*

537 arvensis, ♃. 5—7. In glareosis!

β. pubescens

γ. parviflorus.

Fam. 33. POLEMONACEÆ. *Juss.*

POLEMONIUM. *Lin.*

538 cœruleum, L. ♃. 5, 6. propè Bouillon (Willm)

Fam. 34. GENTIANEÆ. *Juss.*

Trib. 1. PNEUMONANTHEÆ.

Stylus ovario continuus. Æstivatio imbricata.

SWERTZIA. *Bork.*

539 perennis, L. ♃. 7, 8. In paludibus Eifliæ (Lej.)

Digitized by Google

GENTIANA. *Willd.*

§. 1. Gentianotypus — Gentiana *Schm.*

540 lutea, L. ♃. 8. In mont. alp. Arduennæ (Lucas.)

§. 2. Ciminalis, *Adans.*

541 Pneumonanthe, L! ♃. 8, 9. In ericetis humidis!

542 acaulis, L! ♃. 6 In mont. Arduennæ (Tin.)

§. 1. Ericoila. *Bork.*

a. Tetrorhiza, Adans.

543 cruciata, L! ♃. 6—9. In pascuis et sylvaticis!

b. Hippion.

544 bavarica, L. ♃. 7, 8. Versùs Stavelot. (Copenhoult.) Dub. civ.

§. 2. Eurytalia. *Bork.*

545 campestris, L! ①. 8—10. In collibus graminosis (Mich! Olis!)

546 germanica, Willd. ①. 8, 9. In pascuis siccis!

547 amarella, L! ①. 8, 9. In pascuis arenosis dunarum!

§. 2. Gentianella. *Bork.*

548 ciliata, L! ♃. 8—10. In pasc. sicc. Mosell. (Tin) Eifliæ (D.a Lib!)

Trib. 2. CHIRONIEÆ.

Stylus ab ovario discretus. Æstivatio imbricata.

ERYTHRÆA. *Bork.*

549 Centaurium, Pers. ①. 6—8. In graminosis et sylvis!

550 linarifolia, Pers. ①. 6—8. In graminosis maritimis!

551 pulchella, Fries. 6—9. In graminosis lutosis!

β. ramosissima.

EXACUM. *Lin.*

552 pusillum, Dec. ①. 7, In sabuletis exsicc. Flandr. (Hoor!)

CICENDIA. *Adans.*

553 filiformis = Gentiana, L! ①. 7, 8: In ericetis uliginosis!

CHLORA. *Adans.*

554 perfoliata, L. ①. 6—8. In graminosis siccis!

Digitized by Google

Trib. 3. MENIANTHEÆ.

Corollæ segmenta æstivatione inflexa.

MENIANTHES. *Tourn.*

555 trifoliata, L. ♃. 5, 6. In paludibus spongiosis!

LIMNANTHEMUM. *Gmel.*

556 nymphoides, Gmel. ♃. 6—8. In stagnis et fossis!

Fam. 35. APOCYNEÆ. *Adans.*

Trib. 1. VINCEÆ.

VINCA. *Lin.*

557 major, L. ♃. 3—5. Nemor. Flandriæ. (Rouc!)
558 minor, L. ♃. 5—8. In sylvis et dumetis!

Trib. 2. ASCLEPIADEÆ.

CYNANCHUM. *R. Br.*

559 vincetoxicum, Pers. ♃. 6—8. In sylvis lapidosis calcareis!

ASCLEPIAS. *R. Br.*

560 pubigera. = syriaca, L. ♃. 6—8. In rupibus Luxemb. (March!)

Fam. 36. JASMINEÆ. *Juss.*

Trib. 2. LILACINEÆ. *Vent.*

LILAC. *Tourn.*

561 vulgaris, Lam. ♄. 5. In rupibus Malmund!

Trib. 2. OLEINEÆ. *Lk.*

LIGUSTRUM. *Tonrn.*

562 vulgare, L. ♄. 6, 7. In dumetis et nemoribus

Digitized by Google

Trib. 1. RHODOREÆ.

LEDUM. *Lin.*

563 palustre, L. ♄. 5, 6. In turfosis Eifliæ (Lej.) versùs Meppen (Boen.

Trib. 2. ERICEÆ.

ANDROMEDA. *Lin.*

564 polifolia, L. ♃. 5—8. In turfosis Campiniæ! Ardennæ! etc.

CALLUNA. *Salisb.*

565 Erica, Dec. ♃. 8, 9. In ericetis ubiquè!

ERICA. *Salisb.*

566 tetralix; L. ♃. 7, 8. In ericetis humidis!
567 cinerea, L. ♃. 7, 8. Id ericetis Campiniæ!
568 scoparia, L. ♃. 5, 6. In ericetis Flandriæ (Hoor!)
569 multiflora, L. ♃. 7, 8. In ericetis Gelriæ. (Lin.)
570 vagans, L. ♃. 7, 8. In ericetis Gelriæ. (Degeer.)

Ordo. 5. FRUCTITUBIA.

Fam. 38. VACCINIEÆ. *Batsch.*

VACCINIUM. *Pers.*

§. 1. MYRTILLUS.—Calix edentulus; antheræ bicornes.

571 Myrtillus, ♄. 5, 6. In sylvaticis montosis!
β. leucocarpum.
572 uliginosum, L. ♄. 4, 6. In mont. spongiosis.

§. 2. VITIDÆA.—Calix 5 dentatus; antheræ muticæ.

573 Vitisidæa, L! ♃. 5—11. In ericetis subalpinis!

OXYCOCCUS. *Pers.*

574 palustris, Pers ♃. 5—8. In turfosis spongiosis!

Digitized by Google

Trib. 1. BRYONIEÆ.

Fructus baccatus.

BRYONIA. *Tourn.*

575 nigra, = Alba, L. ♃. 5, 6. In sepibus Belgii septr. fide Gort.
576 scarlatina, = Dioica, Jacq. ♃. 6—9. In dumetis et sepibus!

Trib. 2. CUCURBITEÆ.

Fructus pepo.

CUCUMIS, — C. Cucurbita et Pepo. *Rich.*

§. 1. Melo. — Semina marginata attenuata.

577 Melo, L. ①. 7, 8. Colitur in Belgio merid!
578 sativus, L. ①. 7, 9. Colitur in agris olitoriis!

§. 2. Cucurbita. — Semina apice præmorsa.

579 lagenarius = Cucurbita, L. ①. 8. Colitur!
580 Citrullus, = Cucurbita, L. ①. 8. Colitur!

§. 3. Pepo. — Semina margine incrassata.

581 Pepo, = Cucurbita, L. ①. 8. Colitur in olitoriis!

ECBALLIUM. *Rich.*

582 Elaterium, = Momordica, L.! ♃. 5—9. Prat. petros. Namurc.

Fam. 40. VIBURNACEÆ. *Comm. Bot.*

VIBURNUM. *Lin.*

§. 1. Opulus. *Raf.*

583 Opulus, L. ♄. 6. In sylvis et nemorosis humidis!

§. 1. Lentago. *Raf.*

584 Lantana, L. ♄. 5. In sylvis calcareis montosis!

SAMBUCUS. *Lin.*

585 Ebulus, L. ♄. 6—8. In dumetis et virgultosis!
586 nigra, L. ♄. 6, 7. In dumetis et sylvaticis!
β? laciniata.
587 racemosa, L. ♄. 5, 6. In nemorosis calcareis!

Digitized by Google

Trib. 1. CAPRIFOLIEÆ.

Corolla irregularis.

XYLOSTEON. *Tourn.*

588 dumetorum, Moench. ♄. 4—6. Dumet. et virgult. Eifliæ! Luxemb! etc.

LONICERA = Caprifolium. *Juss.*

§. 1. CAPRIFOLIUM.

589 Caprifolium, L. ♄. 7, 8. In frutetis hinc indè!

§. 2. PERICLYMENUM.

590 Periclymenum, L. ♄. 6—8. In nemorosis et dumetis!

Trib. 2. LINNEACEÆ.

Corolla regularis.

LINNEA. *Gronov.*

591 borealis. L. ♃. 5, 6. In petrosis subalpinis dub. civ. (M. W.)

Fam. 42. SAMOLINEÆ.

SAMOLUS. *Lin.*

592 valerandi, L. ②. 6—8. In paludibus lutosis et salsuginosis!

Fam. 43. RUBIACEÆ. *Comm. bot.*

RUBIA *Lin.*

593 tinctorum, L. ♃. 5—7. In agris culta!

GALIUM. *Scop.*

§. 1. CRUCIATA. Fl. polyg. Fructus druparius.

594 Cruciata, Scop. ♃. 5—7. In dumetis et virgultosis.

§. 2. KOLGYDA. Fl. polygam. Fructus glandarius.

595 tricorne, Witther. ①. 7—9. In arvis strigosis!

596 saccharatum, All. ①. 6—8. In arvis Flandriæ. (Hoor.)

Digitized by Google

§. 3. Galiotypus. — Fl. hermaphr. pedicelli fructiferi erecti.

a. Fol. uniervia. Caules retrorsum aculeati.

597 Aparine, L! ①. 6—9. In dumetis et sepibus!
598 agreste, Wallr. ①. 6—9. In arvis et agris!
α. echinospermum, Wallr.
β. leiospermnm, Wallr. = G. spurium. L!
599 gracile, Wallr. ①. 6, 7. In arvis arenosis. (Nyst. Hocq.)
α. parisiense, L!
β. anglicum, Huds.
600 uliginosum, L! ♃. 5—7. In uliginosis sterilibus!
601 palustre, ♃. 5—7. In paludibus limosis!
α. tetraphyllum.
. hexaph yllum.
b. Fol. trinervia.
602 boreale, L! ♃. 7, 8, In petrosis montosis Leod. (Dossin!)
603 rubioïdes, L! ed. 1. ♃. 7, 8. In sylvaticis Arduennæ (Lej!)
c. Folia uninervia. Caulis inermis.
604 sylvaticum, L! ♃. 6—8. Sylv. montosis!
605 Mollugo, L! ♃. 5—8. In virgultosis et dumetis!
β. elatum Thuil!
γ. flaviflorum.
δ. arenarium, Lois.
606 lucidum, All, ♃. 6—8. In sylvis lapidosis montosis!
607 pusillum, L! ♃. 6—8. In collibus lapid. calcareis apricis!
α. pygmæum.
β. bocconi.
γ. læve.
δ. supinum.
608 saxatile, L! 7, 8. In ericetis sabuloso uliginosis!
β. conglomeratum.
609 verum, L! ♃. 6—8. In pascuis siccis sabulosis!
β. ochroleucum.
γ. supinum.

ASPERULA. *Lin.*

610 tinctoria, L! ♃. 6, 7. In Flandriâ fide Hoorebecke!
611 cynanchica, L! ♃. 7, 8. In arenosis et aggeribus apricis!
612 lævigata, L. ♃. 7, 8. In frutetis Brabt. (Kickx!)
613 taurina, L. ♃. 5, 6. In Flandriâ fide Hoorebeke.
614 odorata, L. ♃. 5, 6. In sylvis et faginetis!
615 arvensis, L. ①. 5, 6. In arvis (Lej! Kx! Héc!)

CRUCIANELLA. *Lin.*

616 maritima, L. ♃. 6. In sabulosis maritimis Flandriæ fide hoor.

Digitized by Google

SHERARDIA. *Lin.*

617 arvensis L. ①. 6 9. In arvis argillosis!

Fam. 44. VALERINACEÆ. *Batsch.*

Trib. 1. FEDIEÆ.

Fructus trilocularis.

VALERIANELLA. *Tourn.*

§. 1. Olus. Calix in fructu mammosus.

618 olitoria, Moench. ①. 4, 5. In agris et rupestribus!
619 carinata, Lois. ①. 4, 5. In agris Flandriæ. (Hoor!)

§. 2. Stephanotos. Calix in fructu auriculæformis.

620 dentata, Dec. ①. 5—7. In arvis inter segetes, solo argilloso!
621 dasycarpa, Stev. ①. 5—7. In arvis, inter segtes, solo sabuloso!
622 auricula, Dec. ①. 5—7. Inter segetes.
623 eriocarpa, Lois. ①. 5—7. In cultis Leod. (Lej!)

§. 3. Stephancistrum. Dentes calicis radiantes hamati.

624 coronata, Dec. ①. 5—7. In cultis agri Leod. (Lej!)

§. 4. Stephanocystis. Calix in fructu vesiculosus.

625 vesicaria, Moench. ①. 5—7. Inter segetes agri Leod. (Lej!)

Trib. 2. VALERIANEÆ.

Fructus unilocularis.

VALERIANA. *Neck.*

§. 1. Valerianastrum. — Fl. dioici.

626 dioica, L. ♃. 5, 6. In palustribus macilentis!

§. 2. Valerianotypus. — Fl. hermaphroditi.

627 Phu, L. ♃. 6—8. In sylvis montosis agri Leod. (Lej!)
628 tripteris, L. ♃. 6, 7. In Hannoniâ (Hec.) dub. civ.
629 officinalis. L. ♃. 6, 7. In umbrosis paludosis!
630 sambucifolia, Mikan, ♃. 6—8. In paludibus turfosis. (Olis!)

CENTRANTHUS. *Neck.*

631 latifolius, Dufr. ♃. 7—9. In muris antiq. agri Namurc!

Digitized by Google

Trib. 1. CAMPANULEÆ.

Corolla quinquedentata.

ROUCELA. *Nob. comm. bot.*

632 hederacea = Campanula, L. ♃. 5—8. In umbrosis sphagnosis!

CAMPANULA.

§. Rapunculus. — Pori capsulæ subapicilares.

633 Rapunculus, L. ②. 5—8. In pascuis et graminosis!
α. glabra.
β. mixta.
γ. canescens.
634 patula, L. ②. 5—7. In rupibus dumosis Leod!
635 persicifolia, L. ♃. 6, 7. In sylvis montosis calcareis!
β. hispida, Lej.

§. 2. Campana. — Pori capsulæ basiliares. Flores distincti.

636 diversifolia = rotundifolia Auct. ♃. 5—9. In aggeribus et incultis
α. rotundifolia.
β. mixta.
γ. linarifolia.
δ. pusilla, Hænke.
637 rapunculoides, L. ♃. 6—8. In dumetis et aggeribus!
β. grandiflora.
638 plicatula: rhizomate repente; foliis radicalibus ovato-cordatis, inferioribus oblongo cordatis, reliquis sessilibus è basi subcordatâ oblongis; floribus subsecundis; corollis campanulatis basi plicatis, ovariis sepalisque villosis. ♃. 6—8. In nemorosis calcareis!
β. urticifolia, M. et K.
640 latifolia, L. ♃. 6—8. In sylvis subalpinis (Olis! Lej!)

§. 3. Cervicaria. Pori capsulæ basil. Flores aggreg.

641 cervicaria, L. ♃. 6, 7. In sylvaticis Flandriæ fide Hoor ebeke!
642 glomerata, L. ♃. 5—7. In pascuis mont. calcareis Belg. orient!
β. sparsiflora, Lej.
γ. aggregata, Willd.
δ? elliptica, Kit.

§. 4. Medium, *Lk.*

643 barbata, L. ②. 5—7. In Gelriâ (Gort)
634 Medium, L. ②. 5—7. In Gallobelgio (Neck.)

PRISMATOCARPUS. *L'her.*

645 Speculum, L'her ①. 6—8. In agris frequens!
646 hybridus, L'her ①. 7, 8. In agris Tornaci!

Digitized by Google

Trib. 2. PHYTEUMEÆ.

Corolla profundè 5 partita. Antheræ distinctæ.

PHYTEUMA. *Lin.*

647 spicatum, L. ♃. 5—7. In sylvis umbrosis!
648 nigrum, Schm. ♃. 5—7. In sylvis umbrosis!
649 orbiculare, L. ♃. 5—7. In pratis Eifliæ!
β. involucatum.
γ. minus.

Trib. 3. JASIONEÆ.

Corolla profundè 5. partita. Antheræ connatæ.

JASIONE. *Lin.*

650 montana, L. ②. 6—9. Pascuis siccis!
651 glabrata = perennis, Lej. nec Lamk. ♃. 6, 7. In Eifliâ. (D.a Lib!)

Fam. 46 LOBELIACEÆ. *Juss.*

LOBELIA. *Lin.*

562 urens, L. ②. 6—9. In turfosis sabulosis Flandriæ (Hoor!)
553 Dortmanna, L. ②. 6—8. In stagnis arenosis Campiniæ.

Fam. 47 SYNANTHEREÆ. *Cass.*

Series 1ª TRICHOSTYLEÆ.

Stylus et stigmata dorso pilosa.

Trib. 1. LACTUCEÆ. *Adans. Cass.*

Sbtrib. 1. LACTUCEÆ ARCHETYPÆ. *Cass.*

SONCHUS. *Lin. Cass.*

654 palustris, L. ②. 7, 8. In pratis humidis!

Digitized by Google

655 arvensis, L. ♃. 6, 8. In arvis argillosis!
656 maritimus, L. ♃. 6—8. In maritimis Gallobelgii. (Neck.)
657 parviflorus, Lej! ①. 7—9. Propè Verviam (Lej!)
658 oleraceus, L. ①. 6—10. In cultis agris!
α. integrifolius.
β. triangularis.
γ. laciniatus.
659 fallax, Wallr. ①. 7—9: In cultis et agris.
α. lævis.
β. asper.

LACTUCA *Lin. Cass.*

§. Apate. — Sem. 4 costata, costis lateralib. crassis.

660 perennis, L. ♃. 5—8. In saxosis apricis calcareis!

§. 2. Lactucaria. — Sem. multicostata.

661 sativa, L. ①. 7, 8. Colitur in olitoriis!
662 laciniata, Roth. ①. 7—9. Colitur in olitoriis!
663 sylvestris, Dod. ②. 7—9. In ruderatis argillaceis et saxosis!
β. integrifolia, Lej.
664 virosa, L. ②. 7—9. In aggeribus calcareis!
665 saligna, L. ①. 7, 8. In ruderatis et saxosis siccis.
α. Walrothii.
β. Ruppiana.

MYCELIS. *Cass.*

666 muralis = Prenanthes, L. ①. 6—8. In nemoros. umbr. et ruderat.

Subtrib. 2. Crepideæ. *Cass.*

LAMPSANA. *Gærtn. Cass.*

667 communis, L. ①. 6, 7. In dumetis et ruderatis!
β. crispa, Lej.

CHONDRILLA. *Lin. Cass.*

668 juncea, L. ♃. 7—9. In sabulosis siccis!

GATYONA. *Cass.*

669 Dioscoridis. = Crepis, L! ①. 7, 8. In agris et secus vias. (Héc. Dek.)

BARKHAUSIA. *Dec.*

670 foetida, Dec. ①. 7, 8. In ruderatis et incultis argillaceis!

Digitized by Google

671 prostrata : caulibus munerosis prostratis ; foliis radicalibus caulinis que inferioribus runcinato pinnatifidis, pilosis, acutis, superioribus dentatis integrisve; pericliniis glanduloso-pubescentibus ②. 6—8. In ruderatis siccis! Crepis prostrata, nob. in litt.

672 gracilis. = Crepis Lej! ①? γ. In apricis Luxemb. (Tinant!)

673 taraxacifolius, Dec ②. 5 In pratis siccis Flandriæ. (Hoor!)

674 Leontodontoides. = Crepis, All. ②. 5—7. In rupestribus Tornaci!

CREPIS. *Moench. Cass.*

§. 1. CREPIDOPSIS. — Clinanthium paleolulatum.

675 biennis, L! ②. 5—8. In pratis et ad vias!
β. scabra.

676 lævigata : caule erecto, foliisque lævissimis glabris, radicalibus runcinatis vel runcinato pinnatifidis, summis lanceolatis; pericliniis costatis muricatis. ②. 5—7. In rupestribus Tornaci!

§. 2. CREPIDOTYPUS. — Clinanthium alveolulatum.

677 polymorpha, Wallr. = C. Tectorum, L! proparte ①. 6—9.
α. stricta.
β. virens.
γ. diffusa.
δ. uniflora.

678 tectorum, L. pro parte. ①. 6—9. In ruderatis et agris!
β. segetalis.
γ. lachenalii.
δ. cinerea.

§. 1. PHÆCASIUM. *Cass.*

679 pulchra, L! ①. 5, 6. In aggeribus Moselläe!

TARAXACUM. *Juss. Dec. Cass.*

680 Leontodon. ♃. 7—9. In pratis et pascuis!
β. laciniatum.

681 arcuatum = Leont., Boen. ♃. 5—8. In pasc. sabul. (Tin!) Seq. var?

682 palustre, Dec. ♃. 6, 7. In prat. humid. Malmund. (Lib!)

683 salinum = Leontod. Poll. ♃. 5—6. In paludibus steril.!

HELMINTHIA. *Juss. Cass.*

684 echioides, Gærtn. ①. 6, 7. In dumetis argill. littoral!

PICRIS. *Juss. Cass.*

685 hieracioides, L! ♃. 7, 8. In ruderatis argill. et glareos!

Digitized by Google

Subtrib. 3. HIERACIEÆ. *Cass.*

PRENANTHES = P. et NABALUS. *Cass.*

686 purpurea. L. ♃. 7, 8 In rupibus umbrosis Luxemb. (Tin!)

HIERACIUM. *Lin. Cass.*

§. 1. HIERACIOTYPUS. — Periclinii phylla adpressa.

a. Stolones repentes. Pilosella.

687 Pilosella, L. ♃. 5—7. In pascuis siccis ubique!

β. geminiflorum.

688 dubium, L. ♃. 5—7. In graminosis humentibus!

α. uniflorum.

β. pluriflorum.

γ. auriferum.

689 cæspitosum : stoloniferum ; foliis obovato-lanceolatis, subintegris, obtusis, scapisque hirtis; corymbo multifloro, demùm elongato; pedicellis villosis glandulosis; pericliniis hirtis. ♃. 5—7. Ruderatis Tornaci!

690 aurantiacum, L. ♃. 6, 7. In pratis sylvat. Leod. (Mich.)

b. Stolones nulli; plantæ scapigeræ.

691 præaltum, Vill. ♃. 6. In valle Rhenanâ. (Tin!)

692 præmorsum, L. ♃. 5—7. Sylv. mont. Eifliæ. Luxeml. (March! Tin!)

c. Stolones nulli. Caulis paucifolius.

693 murorum, L. ♃. 5—8. In muris et sylvaticis!

694 maculatum, Sm. ♃. 5—7. In rupibus et montosis!

β. nudicaulis = H. auricula Hoor!

d. Stolones nulli. Caulis foliosus.

695 sylvaticum, Gouan. ♃. 7, 8. In sylvis calcareis!

696 paludosum, L. ♃. 6—8. In pratis sylvaticis humidis!

697 prasinum; caule folioso basi lanato; foliis prasinis infernè villosis inferioribus oblongo-lanceolatis remote dentatis, summis ovatis acuminatis semiamplexicaulibus ; pedunculis pulverulentis; pericliniis hirtis. H. glaucum, Lej! ♃. 6, 7. Mont. Verv. (Lej!) — Var. H. villosi vel cerinthoidis?

698 rubricaule : caule piloso simplici, supernè ramoso; foliis sessilibus cordato-ovatis acuminatis, basi dentatis, villosis, ramealibus integris; calathiis racemoso - corymbosis, pilosulis. — H. prenanthoïdes, Lej! nec. Vill. ♃. 8, 9. In collibus schistosis. (Lej!)

§. 2. HIERACIOIDES, *Moench.*

699 Sabaudum, L. ♃. 8, 9. In nemorosis!

Digitized by Google

700 dunense, Vh! ♃. 7, In maritimis Flandriæ! Hollandiæ! Zelandiæ!
701 umbellatum, L. ♃. 7—9. In sylvaticis!
702 lineare = H. umbellatum. β. Pers. ♃. 9, 10. In sylvis Verv. (Lej!)

DREPANIA. *Juss. Cass.*

703 barbata Desf. ①. 8. In arenosis propè Orroir (Paternost. Hoor!)

ARNOSERIS. *Gærtn. Cass.*

704 minima = Hyoseris, L. ①. 6, 7. In agris arenosis!
705 fœtida = Hyoseris, L. ♃ 6. 7. In Flandriâ fide Roucel. Dub. civ.

Subtrib. 4. SCORZONEREÆ. *Cass.*

HYPOCHÆRIS. *Lin*

§. 1. PORCELLITES. *Cass.*

706 maculata, L. ♃. 6, 7. In pratis montosis siccis!
β. uniflora.
707 radicata, L. ♃. 6—8: In pratis et agg. graminosis!

§. 2. HYPOCHÆROTYPUS. = Hypochæris *Gærtn.*, *Scop.*

708 glabra, L. ①. 6—8, In arvis arenosis!

HYOSERIS. *Juss. Cass.*

709 scabra, L. ①. 6, 7. In Hann. Gall. (Hécart!)

LEONTODON = L. et Thrincia, *Dec!*

§. 1. THRINCIA. Dec. Cass.

710 hirtum, L. ♃. 6—9. In glareosis et ageribus!
711 saxatile, Lam. ①. 7, 8. In arenosis marit!

§. 2. APARGIA. *Moench.*

712 hispidum, L. ♃. 6—9. In pascuis argillosis!
713 squamosum, Lamk. ♃. 6. In pascuis montosis Walcourt (Derm!)
714 hastile, L. ♃. 5—7. In pascuis montosis. Luxemb. (March!)
β. hirtifolium.

§. 3. SCORZONEROIDES., *Moench.*

715 autumnale, L. ♃. 7—10. In pascuis et versuris!
716 contortum: foliis runcinatis hispidis; scapis uni-bi-floris patulis squamosis glabris, pericliniis glabris demum contortis. ♃. 6—8. In arenosis marit! — Fol. L. hispidi; scapi L. autumnalis; periclinii proprii.

Digitized by Google

PODOSPERMUM. *Dec.*

717 resedæ folium, Dec. ②. 6—8. In ruderatis!
718 laciniatum, Dec. ②. 5—8. In ruderatis et aggeribus!
β. heterophyllum: fol. radical. linearibus.

SCORZONERA. *Dec.*

719 humilis, L! ♃. 5—7. In pratis Luxemburgii!
720 austriaca, Willd ♃. 5—7. In pratis humidis. var. prioris?
721 hispanica, L! ♃. 6—8. In pratis humidis passim!

TRAGOPOGON. *Juss. Cass.*

722 porrifolius, L. ②. 6—8. In pratis et agg. Belgii litt. (Vh! Hoor!)
723 major, L. ②. 5, 6. In pratis et agger. rar!
724 pratensis, L. ②. 5—7. In pascuis et ruderatis!
β. angustissimus.—In Luxemb. (March! Tin!)
725 orientalis, L. ②. 6, 7. ad ripas Rheni. (Bœn.)
β. circinalis—In agro Namurc. (De Cloet!)

CICHORIUM. *Tourn. Cass.*

726 Endivia, L. ②. 6—8. In agris passim spontanea!
β. crispum.
727 Intybus, L. ♃. 6—9. In aggeribus calcareis et glareosis.
728 Cicorea = foliis radicalibus runcinatis indivisisque dentatis, caulinis lato sagittatis; floribus axillaribus, sessilibus, glomeratis. ♃. 6—9. In agris colitur et passim spontè.

Series 2.ª ADENOSTIGMEÆ.

Stylus exannulatus glaber vel pilosus. Stigmata glandulosa.

Trib. 2. EUPATORIEÆ.

Stigmata flosculi staminei regularisque apice glandulifera.

Subtrib. 1. EUPATORIEÆ.

EUPATORIUM. *Cass.*

729 cannabinum, L. ♃. 7, 8. in aquosis et fossis!

Subtrib. 2. TUSSILAGINEÆ, *Cass.*

PETASITES. *Cass.*

730 vulgaris, Desf. ♃. 3—5. Ad ripas fluviorum!
β. hybridus.

Digitized by Google

731 albus, Gærtn ♃. 3, 4. In aquosis Brabantiæ. (Kickx!)

NARDOSMIA. *Cass.*

732 fragrans, Cass. ♃. 8, 9. Spontaneam vidi ex culturâ!

TUSSILAGO. *Tour. Cass.*

733 Farfara, L. ♃. 3, 4. In ruderatis calcareis!

Series. 3.ª TRICHOSTIGMÆ.

Stylus exannulatus glaber. Stigmata apice pilosa.

Trib. 3. JACOBACEÆ.

Corolla staminea regularis. Incrementa stigmatica marginalia.

Subtrib. 1. SENECIONEÆ. *Cass.*

CINERARIA. *Cass.*

§. 1. ERIOPAPPUS. — Pappus periclinium duplò superans.

734 palustris, L. ②. 6, 7 In paludibus turfosis!

§. 2. CINERARIOTYPUS.

735 spathulæfolia, Gmel. ②. 5—7. In nemorosis!
736 campestris, Retz. ②. 5, 6. In umbrosis; dub. civ.
737 maritima L. ♃. 6, 7. In maritimis Flandriæ. (Hoor! Rouc!)

SENECIO. *Lin.*

§. 1. SENECIOTYPUS.

738 vulgaris, L! ①. 3—11. In ruderatis et cultis ubiquè!

§. 2. OBÆJACA. *Cas.*

739 viscosus, L. ①. 7—10. In aggeribus arenosis!
740 sylvaticus, L! ①, 6—8. In dumetis glareosis!

§. 3. JACOBÆA. *Cass.*

a. Foliis divisis.

741 adonidifolius, Lois. ♃. 7, 8. In Flandriâ fide Hoor!
742 squalidus, L! ①. 7—9. In rupibus schistosis Leod. Lej!)
743 tenuifolius, Murr. ♃. 7, 8, In agro Leod. (Lej!)
744 erucæfolius, L! ♃. 7—9. In ambarvallibus!
α. acutilobus.
β. obtusilobus.

Digitized by Google

745 dunensis : caule erecto; foliis pinnatisectis, segmentis dentatis; calathiis disciformibus; radio nullo vel brevissimo. Aff. seq. ♃. 7, 8. In arenosis maritimis!

α. discoideus.

β. breviradius.

746 Jacobæa, L! ♃. 7, 8. In pascuis et ruderatis.

747 erraticus, Spreng. ♃. 6—8. In pratis humid!

748 aquaticus, Smith. ♃. 6—8. In pratis humid!

b. Foliis indivisis.

749 paludosus, L! ♃. 6—8. In paludibus et foss. turf!

750 sarraceuicus, L! ♃. 7, 8. In umbrosis humidis!

751 nemophilus = nemorensis auct. nec Lin! ♃. 7, 8. In nemor. mont!

β. ovatus, Willd.

752 diversifolius : foliis utrinquè glabris sinuatis crenatis, caulinis ovato-lanceolatis in petiolum alatum attenuatis, summis sessilibus subcordatis semiamplexicaulibus. — S. Doria Kx.! ♃. 7. In sylvis Brabantiæ (Kx!)

753 Doria, L! ♃. 6, 7. In sylvis Hannoniæ fide Patern. et Hocq

DORONICUM *Lin.*

754 Pardalianches, L! ♃. 5—7. In sylvis humidis Hann. (Vois)

755 procurrens; rhizomate repente; foliis villosis, radicalibus infe rioribusque cordatis petiolatis, mediis lato-stipulatis, summis cordatis sessilibus; pedunculis non incrassatis. ♃. 5, 6. Sylv. Leod. (Mich!)

ARNICA. *Cass.*

756 montana, L. ♃. 6—8. In palud. spong. mont!

Subtrib. 2. ASTEREÆ. *Cass.*

* BELLIDEÆ. *Cass.*

BELLIDIASTER. = Bellidiastrum. *Cass.*

757 montanus = Doronicum Bellid. L. ♃. 5, 6. In Flandr. fide Hoor! dub. civ.

BELLIS. *Lin*

758 perennis, L. ♃. 3—11 In pratis et pascuis ubiquè!

α. nitida.

β. hirsuta.

Digitized by Google

** Astereæ Archetypæ, *Cass.*

ASTER. *Lin.*

759 Tripolium, L. ♃. 8—10. In uliginosis maritimis!
β? Tripolium luteum, Lob. Hist.
760 puniceus, L! —. 8. In Gelriâ (Vb.) Ultrajecti (Vandyk, Bergsma!)
761 novi Belgii, L. ♃. 10. Copiosè propè Hasselt. (Olislagers!)
762 lanceolatus, L! ♃. 8, 9. Ad ripas fluminis Vesdre (Mich!)
763 Amellus, L! ♃. 8, 9. In Luxemburgio (Tinant!)

PHALACROLOMA. *Cass.*

764 annuum = Aster, L! ①. 8—10. In ruderatis Brabantiæ!

ERIGERON. *Cass.*

765 canadense, L. ①. 7—10. In ruderatis arenosis!
766 graveolens, L. ①. 8, 9. In Flandriâ (Hoor!)

TRIMORPHÆA. *Cass.*

767 acris = Erigeron, L. ②. 7—9. In glareosis aridis!

*** Baccharideæ. *Cass.*

CHRYSOCOMA. *Lin.*

768 Linosyris, L. ♃. 8, 9. In rupibus propè Sougnez!

**** Solidagineæ. *Cass.*

SOLIDAGO. *Lin.*

769 Virga aurea, L. ♃. 7—9. In sylvis frequens!

Subtrib. 3. Inuleæ. *Cass.*

* Inuleæ archetypæ. *Cass.*

CARPESIUM. *Lin.*

770 cernuum, L. ♃. 8, 9. In Flandriâ fide Hoor!

PULICARIA. *Cass.*

771 vulgaris, Gærtn. ①. 8, 9. In fossis hyeme inundatis!
β.

Digitized by Google

772 dysenterica, Cass. ♃. 7, 8. In fossis et ad ripas!

INULA. *Gærtn. Cass.*

§. 1. INULOTYPUS.

α. foliis sessilibus.

773 salicina, L. ♃. 7—10. Ad oras sylvarum!

774 hirta, L. ♃. 7 9. In pratis montosis Eifliæ. (Lej!)

β. foliis amplexicaulibus.

775 Britanica, L. (Conyzoides) ♃. 7, 8. Ad ripas fluviorum.

776 prælta : caule paniculato villoso sulcato; foliis amplexicaulibus cordato oblongis, sinuatis, margine remotè glandulosis, utrinquè villosis; calathiis subglobosis, radio brevi. ♃. 7. In Luxemburgio. (De Ronnai!)

777 Oculus Christi, ♃. 8, 9. In Bataviâ fide Gort. Meese et Mulder.

§. 2. CORVISARTIA. *Mérat.*

778 Helenium. L. ♃. 7, 8. In pratis humidis!

LIMBARDA. *Adans. Cass.*

779 Crithmoïdes = Inula, L. ♃. 7, 8. In maritimis Flandriæ fide Rouc.

CONYZA. *Cass.*

780 squarrosa, L. ②. 7—9. In dumetis et sepibus!

** FILAGINEÆ. *Cass.*

MICROPUS, *Lin. Cass.*

781 erectus, L. ①. 7—9. In Flandriâ. (Hoorebeke!)

β. multicaulis. In Hannoniâ. (Héc.)

OGLIFA. *Cass.*

782 arvensis. = Filago, L. ①. 7, 8. In campis arenosis (Hoor!)

LOGFIA. *Cass.*

783 gallica = Filago. L! ①. 7—9. In agris arenosis

784 montana = Filago, L. ①. 7—9. In agris arenosis et fruteti siccis!

785 minima. = Filago, L. ①. 6—8. In ericetis sabulosis siccis

GIFOLA. *Cass.*

786 germanica. = Filago, L! ①. 9, 8. In arvis argillosis!

Digitized by Google

β? diffusa.

787 pyramidata, = Filago, Pers. ①. 7, 8. In agris transmosanis (M. et W.)

FILAGO. *Wild. Cass.*

788 pygmæa, L. ①.....Marit, et exsicc. Belgii fide. Boerh.

*** GNAPHALIEÆ, *Cass*

ANTENNARIA. *R. Br. Cass.*

789 dioïca, Gærtn. ♃. 5—8. In ericetis siccis!

ELICHRYSUM *Gærtn.*

790 margaritaceum, B. et F. ♃. 7, 8. In pratis humidis Leod. Mich!)

791 Stæchas, B. et F. ♃. 7—9. In Flandriâ fide Hoorebecke!

792 arenarium, B. et F. ♃. 7—10. In campis arenosis!

GNAPHALIUM. *Cass.*

793 luteo-album, L. ①. 7, 8. In sabulosis hyeme inundatis!

794 sylvaticum, L. ♃. 8, 9. In pascuis apricis et ericetosis!

795 rectum, Sm. ♃. 7—9. In nemor. et frutetis argill! var. prioris?

796 uliginosum, L. ①. 7, 8. In agris et fossis hyeme inundatis!

β. nudum.

Subtrib. 4. ANTHEMIDEÆ. *Cass.*

* ANTHEMEÆ.

ACHILLEA. *Lin. Cass.*

a. Ptarmica, Tourn.

797 Ptarmica, L. ♃. 7—9. In pratis humidis!

798 alpina, L. ♃. 8, 9. In sylv. subalpinis Arduennæ Leod. (Lej!)

b. Millefolium, Tourn.

799 Millefolium, L. ♃. 6—8. In pascuis frequens!

800 setacea, W. et K. ♃. 6—8. In siccis apricis Leod. (Lej!)

801 nobilis, L. ♃. 7—9. In pasc. glar. apr. ad ripas Rheni (Beyer!)

ORMENIS. *Cass.*

802 mixta = Anthemis, L. ①. 6, 7. In agris Flandriæ (Hoor!)

MARUTA. *Cass.*

803 Cotula = Anthemis, L. ①. 6—8. In agris argillosis copiosè!

Digitized by Google

CHAMÆMELUM. *Cass.*

804 nobile, Moench. ♃: 8, 9. In pascuis apricis!

ANTHEMIS. *Moench. Cass.*

§. 1. ANTHEMOTYPUS. — Pappus truncatus

805 arvensis, L. ①. 6—8. In agris argillosis!

§. 2. ANTHEMARIA. — Pappus integer.

806 tinctoria, L. ♃. 7—9. In ruderatis apricis!
β. triumfetti.

** CHYSANTHEMEÆ, *Cass.*

MATRICARIA, *Gærtn.*

807 Chamomilla, L. ①. 6—8. In agris, inter segetes!
808 suaveolens, L. ①. 7, 8. In agris, inter segetes!

PYRETHRUM. *Hall. Gærtn.*

§. 1. CONOCLINIUM. — Glandes trigonæ.

809 maritimum, Sm. ①. 7—9. In maritimis!
810 inodorum, Mœnch ①. 7—9. In agris glareosis!

§. 2. PYRETHROTYPUS. — Glandes tetragonæ.

811 parthenifolium, Willd. ♃. 7—9. In ruderatis!
812 Parthenium, Sm. ♃. 7—9. In ruderatis et ad sepes!
813 corymbosum, Mœnch. ♃. 6, 7. Sylv. montosis Leod. (Lej!)

CHRYSANTHEMUM. *Gærtn.*

814 Leucanthemam, L. ♃. 5—9. In pascuis et aggeribus!
β. montanum.
815 segetum, L. ①. 6—9. In agris inter segetis!
816 coronarium, L. ①. 7—9. In agris passim. (Gir. Cromb.)

*** SANTOLINEÆ. *Cass.*

ANACYCLUS. *Lin.*

817 bicolor, Pers. ①. 7. In muris urbis Kampen (Comm. Gort.)

**** TANACETEÆ.

TANACETUM. *Desf.*

818 vulgare, L. ♃. 7, 8. In sepibus et aggeribus!
β. crispum.

Digitized by Google

BALSAMITA. *Desf.*

819 major, Desf. ♃. 7, 8. Ad margines hortorum quasi spontè!

***** COTULEÆ. *Cass.*

COTULA. *Juss. Cass.*

820 coronopifolia, L. ①. 7, 8. In inundatis Frisiæ or.

****** ARTEMISIEÆ. *Cass.*

ARTEMISIA. *Lin.*

§. 1. ABSINTHIUM.

821 Absinthium, L. ♃, 8, 9. In ruderatis arenosis!
β? poculenta.

§. 2. ARTEMISIOTYPUS. — Artemisia, *Cass.*

822 pontica, L. ♃. 8, 9. In muris urbis Bilsen (Court!)
823 campestris, L. ♃. 8, 9. In campis apricis!
β. crithmifolia.
824 Dracunculus, L. ♃. 7, 8. In Brabantiâ (Kx!)
825 cœrulescens, L. ♃. 8. In Hollandiâ (Schw.) dub. civ.
826 maritima, L. ♃. 8—10. In æstuariis!
827 gallica, Willd. ♃. 8—10. In æstuariis!
828 salina; Willd. ♃. 8—10. In æstuariis Flandriæ!
829 vulgaris, L. ♃. 7, 8. In ruderatis humidis.

Trib. 4. AMBROSIEÆ. — Ambrosiaceæ. *Adans. Cass.*

AMBROSIA. *Tourn.*

830 maritima, L. ①. . . . In Flandriâ fide Hoor!

XANTHIUM. *Tourn.*

831 Strumarium, L. ①. 7, 8. In ruderatis!
832 spinosum, L. ①. 7, 8. In ruderatis Leod. (Mich!)

Trib. 5. HELIANTHIDEÆ.

Corolla staminea regularis. Incrementa stigmatica contigua.

Subtrib. 1. HELIANTHEÆ. *Cass.*

* COREOPSIDEÆ. *Cass.*

BIDENS. *Tourn.*

833 tripartita, L. ①; 7—9. In uliginosis et fossis!

Digitized by Google

834 cernua, L. ①. 8, 9. In fossis et aquosis.
β. minima, L.
γ. coreopsidis. = Coreopsis bidens, L.

** Helianthea Archetypæ. *Cass.*

HELIANTHUS. *Lin.*

835 tuberosus, L. ♃. 9. In agro Leod. passim spontè (Lej.)

*** Heleniea. *Cass.*

GALINZOGA. *Cav.*

836 parviflora, Cav. ①. 6--8. Spontè in olitoriis Limb. (Olis!)

Subtrib. 2. Calenduleæ.

CALENDULA. *Neck. Cass.*
837 officinalis, L. ①. 7--9. In agris passìm spontè!
838 arvensis, L. ①. 6--8. In arvis!

Series 4.ª ARTHROSTYLEÆ.

Stylus infra stigma annulato - articulatus.

Trib. 6. CARDUACEÆ. *Cass.*

Clinanthium applanatum. Ovarium uniloculare.

Subtrib. 1. Carlineæ. *Cass.*

CARLINA. *Lin.*

839 vulgaris, L. ②. 7, 8. In collibus aridis!
840 acaulis, L. ♃. 6--8. Propè Konigwinter (M. et W.)

Subtrib. 2. Centaurieæ. *Cass.*

CENTAUREA.

§. 1. Cyanus. *Cass.*

841 montana, L. ♃. 6, 7. In sylvis subalpinis!
β. angustifolia.
842 Cyanus, L! ①. 6--8. In messibus!
843 Scabiosa, L! ♃. 6--9. In collibus, ad vias!
844 paniculata, L! 7, 8. In petrosis (Rouc. M. et W.)

Digitized by Google

§. 2. JACEA. *Pers.*

845 amara, L. ♃. 7, 8. In Flandriâ fide Hoor!
846 Jacea, L! ♃. 8, 9. In pascuis!
β. latifolia.

§. 3. LEPTERANTHUS. *Cass.*

847 nigrescens, Willd. ♃. 7, 8. In pascuis!
β. pratensis.
848 nigra, L! ♃. 7, 8. In pratis humidis!
β. decipiens.
849 phrygia, L! ♃: 7, 8. In pratis montosis. (Lej. Desm.)
β. austriaca.

CALCITRAPA. *Gærtn.*

§. 1. HIPPOPHÆSTUM. — Flosculi centrales papposi.

850 solstitialis, Lam. ①. 7—9. In ruderatis!

§. 2. CALCITRAPOTYPUS. Pappus nullus.

851 stellata, Lamk. ②. 8—10. In ruderatis calcareis!

CENTROPHYLLUM. *Neck.*

852 lanatum. = Carthamus, L. ①. 7, 8. In Flandriâ (Hoor!)

Subtrib. 3. CARDUINEÆ, *Cass.*

* SERRATULEÆ, *Cass.*

SERRATULA.

853 tinctoria, L. ♃. 6—9. In pratis turfosis!

LAPPA.

864 tomentosa, Lamk. ♃. 7, 8. In ruderatis!
855 minor, Dec. ♃. 7, 8. In ruderatis!
856 major, Gærtn. ②. 7, 8. In ruderatis!

** CARDUEÆ. *Cass.*

SILYBUM. *Gærtn.*

857 marianum, Gærtn. ②. 7, 8. In ruderatis!

CINARA. *Lin.*

858 Scolymus, L. ♃. 7—9. In olitoriis colitur.

ONOPORDON. *Vail.*

859 acanthium, L. ②. 6, 7. In ruderatis.
860 illyricum, L. ②. 6, 7. In Hollandiâ (Boerh).

Digitized by Google

CIRSIUM. *Tourn.*

§. 1. Eriolepis, *Cass.*

861 eriophorum, Scop. ②. 8, 9. In glareosis calcareis!
862 lanceolatum, Scop. ②. 6—9. In ruderatis et ad vias!
863 dissectum, = Carduus, L. ♃. 8. In pratis (Hocq. Edw.) d. c.
864 carminans : foliis decurrentibus lanceolatis, indivisis, sinuatis, margine spinulosis, infernè tomentosis; calathiis solitariis; periclinii aculeatis. ♃?..... In sylvis propè Geronville (Tin!) Calathis C. lanceolati, folia ferè C. anglici.

§. 2 Onotròphe. Periclinium spinulosum.

865 oleraceum, All. ♃. 7, 8. In pratis humidis!
866 tataricum, All. ♃. 7, 8 In pratis humidis (Lest.)

§. 3. Cirsiotypus. Periclinium inerme.

867 heterophyllum, All. ♃. 7, 8. In pratis depressis (Hoor!)
868 helenioides, All. ♃. 8. In pratis Gallobelgii (Neck.) d. c.
369 canum, All. ♃. 8. In Flandriâ (Hoor!)
870 tuberosum, All. ♃. 8. In Flandriâ (Hoor!)
871 anglicum, Lob. ♃. 6. In pratis paludosis (Hec!)
872 acaule, All. ♃. 6—8. In pascuis calcareis!
873 arvense, Lamk. ♃. 6—8. In arvis et ruderatis!
β. tomentosum.
874 palustre, Scop. ②. 7, 8. In pascuis et sylvis humidis!

CARDUUS. *Gærtn.*

§. 1. Tyrimnus. *Cass.*

875 leucographus, L. ①. 6, 7. In Hannoniâ (Hocq.)

§. 2. Carduotypus. — Carduus, *Cass.*

876 tenuiflorus, Sm! ②. 6—9. In aggeribus arenosis!
877 acanthoides, L! ②. 6—8. In ruderatis ad vias!
878 crispus, L! ②. 6—8. In ruderatis, dub. civ.
879 polyanthemos, L! ②. 6—8. In ruderatis!
880 nutans, L! ②. 6—9. In ruderatis et ad vias!

Trib. 7. ECHINOPSIDEÆ. *Cass.*

ECHINOPS. *Lin.*

881 sphaerocephalus, L. ♃. 7, 8. In ruderatis (Mich! March!)

Digitized by Google

ASTROCEPHALUS. *Vaill.*

882 Columbaria, Wallr. ♃, 5—9. In pascuis siccis!
883 ochroleucus, Wallr. ♃. 6—8. In siccis montanis (Kx.)
884 suaveolens, Wallr. ♃. 6—8. In siccis Flandriæ (Hoor!)
885 maritimus, Spr. ♃. 7, 8. In Flandriâ fide Hoor.

SCABIOSA. *Vaill.*

886 arvensis, L. ♃: 6, 7. In pascuis!
α. heterophylla.
β. pinnatifolia.
γ. integrifolia.
δ. flosculosa.
ε. uniflora.
887 sylvatica, L. ♃. 7, 8, In sylvis montosis!

SUCCISA. *Vaill.*

888 pratensis, Moench. ♃. 7—9. In pratis et pascuis!
β. glabrata.
γ. prolifera.

DIPSACUS. *Lin.*

889 pilosus, L. ②. 6—8. In dumetis secùs fossas!
890 sylvestris, L. ②. 7, 8. Ad sepes!
891 fullonum. L. ②. 7, 8. Passìm cultus!
892 laciniatus, L. ②. 7, 8. In agro Leodiensi (Lej.)

Divisio 3.ª UNGULIFLORIA.

Ordo 6. FRUCTUNGULIA.

Fam. 49. ERYNGIACEÆ. *Comm. bot.*

ERYNGIUM. *Lin.*

893 maritimum, L. ♃. 7, 8. In arenosis maritimis!
894 campestre, L! ♃. 7, 8. In pascuis glareosis!
β? horridum.
895 planum, L. ♃. 7, 8. In Luxemburgio (fide Tin.) Flandr. (Hoor)

Digitized by Google

Series 1.ª EXUMBELLATÆ.

Trib. 1. SANICULEÆ. *Koch.*

SANICULA. *Lin.*

896 europæa, L. ♃. 5, 6. In sylvis argillosis umbrosis!

ASTRANTIA. *Lin.*

897 major, L. ♃. 5—7. In montosis Leodiens. (Mich!)

Trib. 2. HYDROCOTYLEÆ. *Spreng.*

HYDROCOTYLE. *Lin.*

898 vulgaris, L. ♃. 5—7. In paludosis et ericetis innundatis.

Series 2ª UMBELLATÆ PLEUROSPERMÆ.

Semina costato-striata.

Trib. 3. BUPLEVREÆ. — Buplevrineæ. *Spreng.*

Umbellatæ pleurospermæ, petalis arctè involutis.

DIATROPA. — Involucrum nullum.

899 rotundifolia = Buplevrum, L. ①. 6, 7. In agris argillosis!

BUPLEVRUM. — Involucrum univ. et part.

§. 1. DIAPHYLLUM. *Hoffm.*

900 longifolium, L. ♃. 6—8. In montosis Gallob. (Neck.)

§. 2. ISOPHYLLUM. *Hoffm.*

901 falcatum, L. ♃. 6—8. In collibus asperis montosis!

902 junceum, L. ②. 7, 8. In collibus dumosis Verv. (Lej!)

§. 3. ODONTEA. — Odontites, *Spr.*

903 tenuissimum, L. ①. 7—9. In Hannoniâ (Hocq. Desm!)

Trib. 4. PIMPINELLEÆ.

Flosculosæ, pleurospermæ, lateribus contractæ.

Digitized by Google

Subtrib. 1. Smyrnieæ.

Albumen involutum.

SMYRNIUM. *Lin.*

904 Olusatrum, L. ♃. 5—7. In maritimis (Gort.) et ruderatis!

CONIUM. *Lin.*

905 maculatum, L. ②. 7, 8. In ruderatis et ad sepes!

Subtrib. 2. Cicutæ.

Albumen solidum. Calix margo dentatus.

CICUTA. *Lin.*

906 aquatica, L. ♃. 6—8. In fossis et stagnis limosis!

SIUM. — S. et Berula. *Koch.*

§. 1. Siotypus. — Sium. *Koch.*

907 latifolium, L. ♃. 7, 8. In fossis et stagnis!
908 Sisarum, L. ♃. 7, 8. Colitur; hinc indè quasi spontaneum!

§. 2. Berula. *Koch.*

909 angustifolium, L. ♃. 9, 8. In fossis et aquis!

HELODIUM. = Helosciadium. *Koch.*

910 repens = Sium, L. ♃. 7, 8. In paludibus apricis!
911 nodiflorum = Sium, L. ♃. 7, 8. In fossis et aquis!
912 innundatum = Sium, Lam. ♃. 5—7. In fossis turfosis!

PRIONITIS. *Adans.*

713 Falcaria = Sium, L. ♃. 7, 8. In agris lutosis!

Subtrib. 3. Ammineæ.

Albumen solidum. Calix margo obsoletus.

AMMI. *Lin.*

914 majus, L. ①. 6, 7. In agro Leod. (Lej!)
915 glaucifolium, L. ①. 6, 7. In Flandriâ (Hoor!)

Digitized by Google

SISON. *Spr.*

§. 1. Ægopodium. *Lin.*

916 Podagraria, Spreng. ♃. 6—8. Ad sepes frequens!

§. 2. Sisotipus.

917 Amomum, L. ♃. 7, 8. Ad sepes in Flandriâ (Hoor!)

§. 3. Bunium, *Link.*

918 flexuosum = Bunium, Sm. ♃. 5, 6. Propè Tornacum rar!

CARUM. *Koch.*

§. 1. Bulbocastanum.

919 Bulbocastanum, Koch. ♃. 6, 7. In agris argillosis!

§. 2. Carvi.

920 Carvi, L. ②. 5—7. In pascuis montanis!
921 verticillatum, Koch. ♃. 7, 8. Prat. humid. Flandriæ (Hoor!)

TRINIA. *Hoffm.*

922 glauca = Pimpinella, L. ②. 5—7. In Flandriâ (Hoor!)

PIMPINELLA. *Hoffm.*

923 Saxifraga, L. ♃. 6—8. In pascuis calcareis siccis!
β. nigra.
924 magna, L. ♃. 6—8. In pratis umbrosis succulentis!
925 dissecta, Roth. ♃. 6—8. In sylvis umbrosis!

APIUM. *Tourn.*

§. 1. Apiotipus. — Apium, *Hoffm.*

926 graveolens, L. ②. 7, 8. In uliginosis salsis!
α. maritimum.
β. olitorium.

§. 2. Petroselinum, *Hoffm.*

927 Petroselinum, L. ② 6, 7. In agris quasi spontè!
928 segetum = Sison, L. ②. 7, 8. In arvis Flandriæ!

Trib. 5. SESELINEÆ.

Flosculosæ, pleurospermæ, teretiusculæ.

Subtrib. 1. Foeniculeæ.

Calix margo obsoletus.

Digitized by Google

LIGUSTICUM. — L. et Silaus. *Koch.*

929 tripartitum : foliis inferioribus bipinnatisectis segmentis lobatis, summis trilobis, foliolis ovato-oblongis obtusis ; petiolis inferioribus elongatis supernè canaliculatis, summis alatis foliolo brevioribus ; involucro monophyllo. ♃. 6. In pratis propè Armentières (Lechartier.)

930 Silaus, Lamk. ♃. 6, 7. In pratis succulentis!

VISNAGA. *Gærtn.*

931 daucoïdes, Gærtn. ①. 7, 8. In Flandriâ fide Hoor!

CRITHMUM. *Lin.*

932 maritimum, L. ♃. 8. In clivis maritimis (Gort. Rouc. Hoor.)

MEUM. *Gærtn.*

§. 1. MEOTIPUS. — Meum, *Koch.*

933 athamanticum, Jacq. ♃. 6—8. Pratis subalpinis!

§. 2. FOENICULUM, *Gærtn.*

934 Foeniculum, Spreng. ♃. 6—8. In ruderatis Leodii!

Subtrib. 2. LIBANOTIDEÆ.

Calix margo dentatus.

SESELI. *Lin.*

935 glaucum, L. ♃. 7, 8. In collibus apricis (Lej! Hoor!)
β. prasinum = glaucum, Mérat. Lej!

937 bienne, Crantz. ②. 8, 9. In collibus Luxemb!

BUBON. — B. et Athamanthæ sp. *Lin.*

938 Libanotis = Athamantha, L. ♃. 6—8. In rupib. calcareis!

929 pyrenaicum = Athamantha, Jacq. ♃. 7, 8. In agro Verv. (Lej!)

Trib. 6. OENANTHEÆ.

Pleurospermæ radiatæ.

OENANTHE. *Lam.*

§. 1. PHELLANDRIUM.

940 Phellandrium, Lam. ②. 6—8. In fossis et stagnis paludosis!

Digitized by Google

§. 2. Oenanthotypus.

941 crocata, L. ♃. 6, 7. In paludibus propè Antverpiam (Rouc!)
942 lachenalii, Gmel. ♃. 7, 8, In paludibus Hollandiæ sept!
943 pimpinelloïdes, L. ♃. 5—7. In pratis paludosis (Beyer!)
944 peucedanifolia, Poll. ♃. 6, 7. In pratis succulentis!
945 filipendula : radicum tuberculis ovatis clavatisve; surculis repentibus; foliis bipinnatis, foliolis radicalibus oblongis, caulinis linearibus planis; involucris nullis. ♃. 6—8. In pratis propè Tornacum!
946 fistulosa, L. ♃. 6, 7. In fossis et stagnis!
β. bulbifera.

ÆTHUSA. *Lin.*

947 Cynapium, L. ①. 6—8. In cultis et agris!
β. agrestis.
γ? angustissima.

CORIANDRUM. *Hoffm.*

948 sativum, L. ①. 6—8. In messibus (Hoor! Lej!)

Series 3.a RHYNCHOSPERMÆ.

Fructus rostratus.

Trib 7. SCANDICINEÆ.

SCANDIX. *Gærtn.*

949 Pecten, L. ①. 6, 7. In agris et arvis!

MYRRHIS. *Scop.*

950 odorata, Pers. ♃. 6, 7. In sylvaticis montosis.

CHÆROPHYLLUM. *Hoffm.*

§. 1, Chaerophyllotypus. — Semina glabra.

951 bulbosum, L. ②. 6, 7. In sepibus Brabantiæ (Kx.)
952 temulentum, L. ②. 6, 7. In dumetis et ad sepes!

§. 2. Chærophyllopsis. Semina hirsuta.

953 nodosum, Lamk. ①. 5, 6. In sepibus et dumetis (Lest. Edw.)

ANTHRISCUS. *Hoffm.*

§. 1. Cerefolium.

954 sativus, Hoffm. ①. 5, 6. In cultis!

Digitized by Google

955 sylvestris, Hoffm. ♃! 5—8. Ad sepes et in umbrosis!

§. 2. ANTHRISCOTYPUS. — Anthriscus, *Pers.*

956 vulgaris, Pers. ②. 4, 5. In sepibus et dumetis solo arenoso!

Series 4. ECHINOSPERMÆ.

Fructus echinatus.

Trib. 8. CAUCALIDEÆ.

Subtrib. 1. DAUCINEÆ.

Fructus dorsibus compressus.

DAUCUS. *Tourn.*

957 Carotta, L. ②. 6—9. In pascuis siccis et glareosis!

β. sylvestris.

958 hispidus, Desf. ♃..... Propè Montem Hannoniæ (Hocq.) d. c.

ORLAYA. *Hoffm.*

959 grandiflora, Hoffm, ①. 6—8. In agris Belgii sup. inter segetes!

Subtrib. 2. TORILEÆ.

Fructus lateribus compressus.

CAUCALIS. *Hoffm.*

960 daucoides, L. ①. 6, 7. In agris et arvis!

961 leptophylla, L. ①. 6, 7. In messibus (Lej!)

TORILIS. *Adans.*

§. 1. TORILOTYPUS. — Semina omnia conformia.

962 Anthriscus, Gmel. ②. 7, 8. In dumetis ul iquè!

963 arvensis = Caucalis, Huds. ②. 7, 8. In agris solo margaceo!

§. 2. STAPHYLIUM. — Semina dissimilia.

964 nodosa, Gærtn. ①, 5, 6. In ruderatis apricis!

TURGENIA. *Hoffm.*

965 latifolia, Hoffm. ①. 6—8. In agris Luxemb!

Digitized by Google

Series 5.a HOMALOSPERMÆ.

Semina plana, alis marginalibus dorsalibusque destituta.

Trib. 9. TORDYLIEÆ.

Semina annulo turgido cincta.

TORDYLIUM. *Tourn.*

965 maximum, L. ①. 6, 7. In agris (Desm. Hoor!)

Series 6.a PTEROSPERMÆ.

Semina alata.

Trib. 10. THAPSICEÆ, *Koch.*

LASERPITIUM. *Spr.*

967 latifolium, L. ♃. 6, 7. In rupibus Luxemb!
968 Siler, L. ♃. 7, 8. In Flandriâ fide Hoorebeke.

Trib. 11. ANGELICEÆ. *Koch.*

ANGELICA. *Hoffm.*

969 sylvestris, L. ♃. 7—8. In pratis et sylvaticis humidis.

ARCHANGELICA. *Hoffm.*

970 officinalis, Hoffm. ♃. 7—9. Propè Antverpiam (Dek.)

LEVISTICUM. *Koch.*

971 officinale, Koch. ♃. 6—8. In pascuis montosis (Lej!)

SELINUM. *Gærtn.*

972 Carvifolia, L. ♃. 7—9. In sylvaticis et dumetis!

Trib. 12. PEUCEDANEÆ. — Selineæ, *Koch.*

IMPERATORIA. *Lin.*

973 Ostruthium, L. ♃. 6—8. In umbrosis subalpinis!

Digitized by Google

PEUCEDANUM. *Koch.*

§. 1. CERVARIA, *Moench.*

974 Cervaria, Lap. ♃. 7, 8. In collibus agri Luxemb. (Tiu.)
975 Oreoselinum, Mœnch. ♃. 7, 8. In sylvis Namurc. (Rouc.)

§ 2. THYSSELINUM. *Hoffm.*

976 palustre, Mœnch. ♃. 6—8. In sylvis paludosis!
β. sylvestre auct. nec L.

§ 3. PEUCEDANOTYPUS.

977 Carvifolia, Vill ♃. 7, 8. In pratis propè Freyr (Decl!)
978 officinale, L. ♃. 6, 7. In pratis Frisiæ (Meese)
979 gallicum, Pers. ♃. 6, 7. In Flandriâ (Hoor!)

ANETHUM. *Dill.*

980 graveolens, L. ①. 6, 7. In messibus. (Lej!)

PASTINACA. *Lin.*

981 sativa, L. ②. 7, 8. Colitur. β. in pascuis!
β. arvensis, Pers.

HERACLEUM. *Lin.*

982 Sphondylium, L. 6—9. In dumetis et umbrosis!
β? angustifolium, Dec.

Fam. 51 HEDERACEÆ. *Rafin.*

Trib. 1. HEDEREÆ.

Fructus baccatus 5 locularis.

HEDERA. *Lin.*

983 Helix, ♄. 9. 10. In sylvaticis et muris antiquis!

Trib. 2. CORNEÆ.

Fructus drupaceus monospermus.

CORNUS. *Lin.*

§. 1. CORNOTYPUS. — Umbellæ involucratæ.

984 nudiflora = Mas, L. ♄. 3, 4. In dumetis et sylvis!

§. 2. THELYCRANIA. — Umbellæ nudæ.

985 sanguinea, L. ♄. 6, 7. In sylvis et dumetis!
986 alba, L. ♄. 6, In sepibus reperitur.

Digitized by Google

Ordo 7. CALICUNGULIA.

Fam. 52 SAXIFRAGINEÆ. — Saxifrageæ. *Juss.*

Trib. 1. ADOXINEÆ.

Corolla monopetala.

ADOXA. *Lin.*

987 Moschatellina, L. ♃. 4; 5. In dumetis et sepibus humid!
β. leodicea.

Trib. 2. CHRYSOSPLENIEÆ.

Corolla nulla.

CHRYSOSPLENIUM. *Tourn.*

988 oppositifolium, L. ♃. 5, 5. In umbrosis humidis!
989 alternifolium, L. ♃. 4, 5. In umbrosis humidis!

Trib, 3. SAXIFRAGEÆ.

Corolla polypetala.

SAXIFRAGA. *Lin.*

§. 1. HIRCULUS. *Tausch.*

990 Hirculus, L. ♃. 7, 8. In palud. turfosis Drentiæ (Dortm.)

§. 2. DACTYLITES. *Tausch.*

991 granulata, L. ♃. 5. 6. In pascuis montosis!
992 tridactylites, L. ①. 4, 5. In muris et arenosis!
993 hypnoides, L. ♃. 5, 6. In Gelriâ fide Gorter.
994 leptophylla, Pers. ♃. 4, 6. In saxosis Arduennæ (Lej.)
995 cæspitosa, L. ♃. 4, 5. In Arduennâ fide Dec.
996 condensata, Gmel. ♃. 5, ,6. In saxosis Arduennæ!
997 sponhemica, Gmel. ♃. 4, 5. In saxosis Arduennæ!

§. 3. SAXIFRAGOTYPUS. = Aizonia. *Tausch.*

998 Aizoon, L. ♃. 6, 7. In rupibus Sponhemiæ (Gmel)!

Digitized by Google

Trib. 1. SEMPERVIVEÆ.

Stamina numero petalorum dupla. Corolla polypetala.

SEMPERVIVUM. *Lin.*

999 tectorum, L. ♃. 7, 8. In muris et tectis!
1000 montanum, L. ♃. 6, 7. In rupibus Arduennæ Leod. (Lib!)

SEDUM. *Dec.*

§. 1. CEPÆA. — Ovaria libera; sepala dorso non sulcata.

1001 maximum, Pers. ♃. 8. Rupibus Arduennæ Leod. (Lej!)
1002 Telephium, L. ♃. 8. Sylvis et rupibus humidis!
β? purpureum.
1003 Anacampseros, L. ♃. 7. Rupibus et muris antiquis Arduennæ!
1004 Cepæa, L. ②. 9, 10. In collibus lapidosis!
1005 rubens, L. ①. 6, 7. In collibus lapidosis!
1006 villosum, L. ①. 6, 7. Turfosis Eifliæ!
1007 dasyphyllum, L. ♃. 6, 7. Muris et lapidosis Leod. (Lej.)
1008 album, L. ♃. 6, 7. In rupibus et muris!

§. 2 VERMICULARIA. — Ovaria basi connexa; folliculi connati.

1009 saxatile, L. ♃. 9. Sabulosis Gelriæ fide Vh.
1010 acre, L. ♃. 6, 7. Muris et arenosis!
1011 schistosum Lej. ♃. 6, 7. Rupibus schistosis Arduennæ!
1012 sexangulare, L. ♃. 6, 7. Muris et rupibus!

§ 3. SEDOTYPUS. — Ovaria libera; sepala dorso sulcata.

1013 recurvatum, Willd. ♃. 6, 7. In rupibus et muris.
1014 anopetalum, Dec. ♃, 7. In rupibus Arduennæ!
1015 rupestre, L. ♃. 5, 6. In rupibus Arduennæ!
1016 fragile: repens, foliis basi solutis inordinatis glaucis, ramorum sterilium subulatis laxis, fertilium ovato-lanceolatis planiusculis ad pressis. ♃. 7. In rupibus Tornaci! Mosell!
1017 reflexum, L. ♃. In rupibus Arduennæ!
β. cristatum.

Trib. 2. TILLÆEÆ.

Stamina numero petalorum æqualia.

BULLIARDA. *Dec.*

1018 vaillantii, Dec. ①. 7. Umbrosis humidis. (Desm! Hoor!)

TILLÆA. *Mich.*

1019 muscosa, L. ①. 5. In Flandriâ (Hoor), Gelriâ (Boers.)

Digitized by Google

Trib. 1. MONTIACEÆ.

Corolla basi monopetala.

MONTIA. *Mich.*

1020 fontana, L. ①? 5—8. In rivulis Arduennæ!
1021 terrestris = minor auct. ①. 3, 4. In agris arenosis humidis!

Trib. 2. PORTULEÆ.

Corolla polypetala.

PORTULACA. *Juss.*

1022 oleracea, L. ①. 7, 8. In rupibus et cultis arenosis!
1023 sativa, Haw. ①. 7, 8. In oleraceis culta!

Fam. 55. ILLECEBREÆ. *R. Br.*

Trib. 1. CORRIGIOLEÆ.

Folia alterna.

CORRIGIOLA. *Lin.*

1024 littoralis, L. ①. 6—8. In viis arenosis!

Trib. 2. PARONYCHIEÆ.

Folia opposita.

HONKENYA. *Ehrh.*

1025 peploides, Ehrh. ♃. 6—8. In arenosis maritimis

POLYCARPON. *Lin.*

1026 tetraphyllum, L. ①. 6—8. In apricis (Lej! Hoor!)

HERNIARIA. *Tourn.*

1027 glabra, L. ♃. 7, 8. In pascuis siccis!
1028 hirsuta, L. ♃. 7, 8. In pascuis siccis Flandr. (Hoor!)

ILLECEBRUM. *Lin.*

1029 verticillatum, L. ♃. 6—8. In ericetis sabulosis!

Digitized by Google

EUPHORBIA. *Lin.*

§. 1. Helioscopia. — Petala rotundata.

a. fructus lævis.

1030 gerardiana, Jacq! ♃. 5—7. Ad ripas fluviorum (De Geer!)
1031 niceensis, All. ♃. 6, 7. In sylvis Hannoniæ (Desm.)
1032 pithyusa, L! ♃. 7. In arenosis Hannoniæ (Desm!)
1033 Helioscopia, L. ①. 6—8. In agris et cultis!

b. fructus verrucosus.

1034 platyphylla, L. ①. 6—8. In agris argillosis!

β. stricta.

1035 litterata, Jacq. ①. 6—8. In agris!
1036 ruderalis: caulibus strictis; foliis omnibus involucrisque lanceolatis, serratis, glabris, basi undulatis; involucellis cordato ovatis; umbellis quadrifidis, ovariis verrucosis glabris ②. 6—8. In ruderatis, montanis!
1037 verrucora, L! ②. 5, 6. In sylvaticis, dub. civ.
1038 purpurata, Th. ♃. 5, 6. In umbrosis!
1039 dulcis, L! ♃. 5, 6. In sylvaticis dub. civ.
1040 palustris, L! ♃. 5—7. In aquosis uliginosis (Dreiss!)

§. 2. Lathyris. — Petala appendiculata.

1041 Lathyris, L! ②. 7, 8. In cultis et hortis!

§. 3. Paralias. — Petala fimbriata.

1042 Paralias, L! ♃. 6—8. In maritimis!

§, 4. Esula. — Petala lunata, bicornia.

1043 amygdaloides, L! ♄ 3, 4. In nemorosis!

β. herbacea.

1044 Cyparissias, L! 5—7. In pascuis sterelibus!
1045 Esula, L! ♃ 5—8. Ad ripas fluviorum!
1046 exigua, L! ① 7—9. In agris argillosis!

β. simplex.

γ. dichotoma.

1047 segetalis, L! ② 7, 8. In messibus. (Hocq. Edw.) Dub. civ.
1048 Peplus, L! ①. 7—9 In cultis frequens!

β? rotundifolia.

§. 5. Anisophyllum. *Haw.*

1049 Peplis, L. ①. 7, 8. In arenosis Hannoniæ (Desm!)
1050 Chamæsyce L. ①. 7, 8. In arenosis (Boerh. M. et W.)

MERCURIALIS. *Tourn.*

1051 perennis, L. ♃. 4, 5. In umbrosis et dumetis!
1052 annua, L. ①. 7, 10. In rederatis et cultis!
1053 ambigua L. ①. 7, 9. In ruderatis Tornaci!

Digitized by Google

BUXUS. *Tourn.*

1054 sempervirens, L. ♄. 3, 4. In rupestribus!

Fam. 57 GROSSULACEÆ. *Mirb.*

RIBES. *Lin.*

§. 1. GROSSULARIA, *Rich.*

1055 Grossularia, L. ♄. 4, 5. In dumetis et sepibus!
β. uvacrispa.

§. 2. BOTRYCARPUM. *A. Rich.*

1056 nigrum, L. ♄. 5, 6. Ad fossas in umbrosis!

§. 3. RIBOTIPUS. — Calix rotatus.

1057 rubrum, L. ♄. 4, 5. In umbrosis humidis!
1058 alpinum, L. ♄. 4, 5. In Arduennâ et Eifliâ!

Fam. 58 MYRTACEÆ. *Adans.*

PHILADELPHUS. *Lin.*

1059 coronarius, L. ♄. 5, 6. In rupestribus humid. Leod!

Fam. 59 ONAGRIDEÆ.

Trib. 1. CIRCÆEÆ.

10

Calix deciduus. Stamina numero petalorum æqualia aut minora.

CIRCÆA. *Tourn.*

1060 lutetiana, L. ♃. 6—8. In umbrosis humidis!
1061 intermedia, Ehrh. ♃. 7, 8. In alnetis turfosis!
1062 alpina, L. ♃. 7, 8. In Alpinis Arduennæ (Dr Lib!)

Digitized by Google

Trib. 2. ONAGREÆ.

Calix deciduus. Stamina petalorum numero dupla.

EPILOBIUM. *Lin.*

§. 1. Chamænerion. *Tourn.*

1063 spicatum, Lam. ♃. 7, 8. In sylvis montosis!
β. albiflorum.

§. 2. Epilobiotypus. — Flores regulares.

a. Stigma quadripartitum.

1064 hirsutum, Lin ♃. 7, 8. In aquosis!
1065 parviflorum, Sm. ♃. 7, 8. In aquosis!
α. ramosum.
β. simplex.
1066 sparsifolium : caule adpressè piloso; foliis sparsis petiolatis oblongo-lanceolatis, obtusis, basi attenuatis, inæqualiter crenatis; stigmate quadripartito. ♃. 6, 7. In umbrosis propè Tornacum!
1067 umbrosum : caule tereti foliisque villosis, sessilibus, ovatis, dentatis; sepalis mucronatis; siliquis glanduloso pilosis; stigmate quadripartito. ♃. 6—8. In umbrosis humidis!
1068 montanum, L. ♃. 6—9. In umbrosis!
1069 nutans, Rchb. ♃. 7, 8. In Arduennâ (Lej! Tin!)

b. Stigma simplex.

1070 origanifolium, Lam. ♃. 7, 8. In montosis Luxemb. (Tin!)
1071 roseum, Schreb. ♃. 7, 8. In umbrosis humidis!
β. puberulum.
1072 obscurum, Schreb? ♃. 7, 8. In pratis humidis!
β. divaricatum.
γ? stoloniferum.
1073 tetragonum, L. ♃. 7, 8. In paludosis!
1074 palustre, L. ♃. 7, 8. In paludibus!
1075 decumbens. caule decumbente; foliis sessilibus, oppositis, oblongis, crenatis, obtusis; stigmate clavato. ♃. 7, 8. In paludibus spongiosis muscosis Luxemburgii (Tin!)

OENOTHERA. *Lin.*

§. 1. Onagra. *Gærtn.* — Capsula teretiuscula.

1076 Biennis, L. ②. 6—8. In ruderatis sabulosis!
1077 parviflora, L. ②. 6, 7. In dunis Hollandiæ frequens!

§. 2. Œnotherotypus. Capsula tetragona.

1078 rosea, Ait. ①. ♃. 6—9. In ruderatis arenosis ex culturâ!

Digitized by Google

Trib. 3. JUSSIDIEÆ.

Calix persistens.

ISNARDIA. *Lin.*

1079 palustris, L. ♃ ! 7—9. In turfosis !
α. rivularis.
β. riparia.

Fam. 60 HALORAGEÆ. *R. Br.*

Trib. 1. TRAPACEÆ.

TRAPA. *Lin.*

1080 natans, L. ①. 6, 7. In stagnis limosis.

Trib. 2. CERCODIEÆ. *Juss.*

MYRIOPHYLLUM. *Lin.*

1081 verticillatum, L. ♃. 7, 8. Stagnis piscinis frequens!
β. limosum.
1082 alternifolium, Dec. ♃. 6, 7. In fossis subturfosis Gelriæ. (Boen.)
1083 spicatum, L. ♃. 6—8. In stagnis et piscinis!

Trib. 3. CALLITRICHEÆ. — Callitrichineæ. *Lk.*

CALLITRICHE. *Lin.*

1084 verna, L. ①. 4—9. In aquosis!
α. vulgaris, Boen.
β. intermedia, Pers.
γ. fissa, Lej.
δ. stellata, Hoppe.
ε. minima, Hoppe.
1085 autumnalis, L. ①. 8—10. In fossis et stagnis!

Fam. 61 LYTHRARIEÆ. *Juss.*

PEPLIS *Lin.*

1086 Portula, L. ①. 6—8. In inundatis!

Digitized by Google

LYTRUM. *Juss.*

§. 1. Lythrotypus. — Stamina petalorum numero æqualia.

1087 Hyssopifolia L. ⊙. 7—9. In arvis lutosis!

§. 2. Salicaria. — Stamina petalorum numero dupla.

1088 virgatum, L. ♃. 6, 7. In pratis Leod. (Lej!)
1089 Salicaria, L. ♃. 6, 7. In aquosis!
β. cinereum.

Fam. 62 TAMARISCINEÆ. *Desv.*

TAMARIX. *Lin.*

1090 germanica, L. ♄. 7. In sabuletis Campiniæ. (Rouc.)

Fam. 63 ROSACEÆ. *Juss. excl. Gen.*

Trib. 1. AMYGDALEÆ. *Juss.*

PRUNUS. — Calix involucro destitutus.

§. 1. Padus, *Moench.*

1091 Padus, L. ♄. 5, 6. In sylvis subturfosis!
1092 Mahaleb, L. ♄. 5, 6. In sylv. montosis saxosis!

§. 2. Cerasotypus. — Cerasus.

1093 avium, L. ♄. 5. In sylvis!
1094 Bigarella = Cerasus Juliana et Duracina Dec. ♄. 5. In hortis colitur!
α. Juliana.
β. duracina.
1295 acida, Ehrh. ♄. 5. In rupestribus!
β. capronia.
1096 semperflorens, Ehrh. ♄. 5—8. In pomariis culta!

§. 3. Prunotypus. — Prunus.

1097 spinosa, ♄. 3, 4. In dumetis et frutetis frequens!
1098 Insititia, L. ♄. 5. In dumetis solo argillaceo!
1099 domestica, L. ♄. 5. In dumetis!

AMYGDALUS. — Calix involucratus.

§. 1. Armeniaca. *Tourn.*

1100 Armeniaca = Prunus, L. ♄. 3, 4. In hortis colitur.

Digitized by Google

§. 2. Persica. *Tourn.*

1101 Persica, L. ♄. 4. Colitur!
1102 lævis, Lej. ♄. 4. Colitur!

§. 3. Amygdalotypus. — Amygdalus. *Dec.*

1103 communis, L. ♄. 3, 4. Colitur!

Trib. 2. POMACEÆ. *Juss.*

Subtrib. 1. Mespileæ.

Putamen osseum.

CRATÆGUS. *Lindl.*

1104 Oxyacantha, L! ♄. 5. In sylvaticis et dumetis!
1105 oxyacanthoïdes, Thuil. ♄. 5. In sylvis et dumetis!
1106 Azarolus, L. ♄. 5. In Hannoniâ (Hocq.)

MESPILUS. *Lindl.*

1107 germanica, L. ♄. 5. In sylvaticis!

COTONEASTER. *Medic.*

1108 vulgaris, Lindl! ♄. 4, 5. in rupestribus apricis!

Subtrib. 2. Pyreæ.

Putamen cartilagineum.

ARONIA = Amelanchier. *Dec.*

1109 Amelanchier = Mespilus, L. ♄. 5. rup. montosis!

PYRUS. — Stamina subulata. Styli 5.

§. 1. Pyrotypus. — Pyrus. *Tourn.*

1110 communis, L. ♄. 4, 5. In sylvaticis!
1111 Bollweria, L. ♄. 4, 5. In Sylvis agri Leod. (Lej.)

§. 2. Malus. — *Tourn.*

1112 Malus, L. ♄. 5. In sylvaticis!
1113 acerba, Merat ♄. 5. In sylvaticis!

CYDONIA. *Tourn.*

1114 vulgaris, Pers. ♄. 5, 6. Ad sepes humidas!

Digitized by Google

SORBUS. — Stamina dilatata. Styli 2, 3.

§. 1. TORMINARIA. *Dec.*

1115 torminalis, Crantz. ♄. 5, 6. In sylvaticis!

§. 2. ARIA. *Dec.*

1116 Aria, Crantz. ♄. 5, 6. In sylvis montosis!

1117 intermedia = Pyrus, Ehrh. ♄. 5, 6. Sylv. Luxemb. (Poed)

§. 3. SORBARIA.

1118 hybrida, L. ♄. 5, 6. In nemorosis Campiniæ (Dreiss!)

1119 Aucuparia, L. ♄. 5, 6. In sylvis!

1120 domestica, L. ♄. 5, 6. In sylvis montosis indicata.

Trib. 3. ROSEÆ.

ROSA. *Lin.*

§. 1. CHAMÆRHODON. — Ceroma nullum.

1121 pimpinellifolia, Ser. ♄. 6. In montosis maritimisque!

β. spinosissima.

γ. mariæburgensis, Red.

1122 alpina, L. ♄. 6, 7. In Arduenna (Olis!)

§. 2. CASSIORHODON. — Ceroma tenue.

1123 fraxinifolia, Bork. ♄. 5, 6. In dumetis propè Huy (Dijon!)

1124 cinnamomea, L. ♄. 5, 6. In sepibus!

§. 3. CYNORHODON. — Ceroma incrassatum. Styli liberi

a. centifoliæ. Lindl.

1125 gallica, L. ♄. 6. Ad margines agrorum in Hollandiâ (Reinw.)

b. rubiginosæ. Lindl.

1126 Eglanteria, L. ♄. 6. In dumetis et sepibus!

1127 campestris: aculeis rectiusculis; petiolis aculeatis foliisque glaberrimis; foliolis ovatis duplicato serratis, margine costâque glandulosis; urceolis basi, pedunculis sepalisque hispido-glandulosis; stylis villosis. ♄. 6. In Luxemburgio!

1124 rubiginosa, L. ♄. 6. In dumetis!

β. umbellata, Leers.

γ. nemorosa, Lib!

δ. resinosa, Wallr.

ε. sepium, Thuil.

c. villosæ, Lindl.

1129 villosa, L. ♄. 6. Ad sepes (Lej! Dª Libert!)

β. pseudo-rubiginosa, Lej.

1130 tomentosa, Sm. ♄. 6. In dumetis humidis!

β. mollissima, Willd.

1131 cinerascens: aculeis rectiusculis; foliolis simpliciter dentatis,

Digitized by Google

ovatis, acutis, petiolisque eglandulosis undiquè villoso-cinerascentibus; floribus paucissimis; urceolis globosis, pedunculisque hispido-glandulosis; sepalis fructus divergentibus. ♄. 6. In sylvis Arduennæ. (Tinant!)

1132 alba, L. ♄. 6. In montosis (Lej.)

d. canineæ, Lindl.

1133 collina, Jacq. Thory. ♄. 6. In sepibus et dumetis!

β. Libertiæ = umbellata Lib! nec Leers.

γ. platyphylla, Rau.

δ. leucantha, Lois.

ε. fastigiata, Bast.

ζ. dumetorum, Thuil.

1134 rubrifolia, Vill. ♄. 6 In sylvis montosis elatis!

β. glauca, Vill

1135 canina, L. ♄. 6. In dumetis et sepibus!

β. globosa, Desv.

γ. Lejeunii = ambigua, Lej. nec Desv.

δ. glaucescens, Desv.

ε. nitens, Desv.

ζ? malmundariensis, Lej!

1236 glaberrima: aculeis aduncis raris; petiolis glandulosis foliisque glabris; foliolis argutè duplicato-serratis eglandulosis; urceolis ovatis pedunculisque nudis; sepalis externè glabris, stylis glaberrimis. ♄. 6. In dumetis propè Tornacum!

§. 4. Systylorhodon. — Ceroma incrassatum. Styli coadunati.

1137 arvensis, L. ♄. 6, 7. In sylvis et dumetis!

β. ovata, Lej.

γ. stylosa Desv.

Trib. 4. RUBEÆ.

RUBUS. *Lin.*

§. 1. Batidea. — Fructus villosus.

1138 Idæus, L. ♄. 5, 6. In nemoribus!

§. 2. Batotypus. — Fructus glaber.

A. virgæ glabræ, nec pruinosæ.

† corylifolii.

1139 plicatus, W. et N. ♄. 5, 6. In nemoribus!

1140 fastigiatus, W. et N. ♄. 5. In nemoribus!

1141 affinis, W. et N. ♄. 6. In nemoribus!

1142 nitidus, W. et N. ♄. 6. In nemoribus!

†† candicantes.

1143 rhamnifolius, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis (Lej!)

Digitized by Google

1144 fruticosus, L. ♄. 6, 7. In dumetis!
1145 tomentosus; W. et N. ♄ 6, 7. In Luxemburgio!

B. virgæ pilosæ, nec pruinosæ nec glandulosæ.

† corylifolii.

1146 saxatilis, L. ♃. 5, 6. In rupibus montosis calcareis!
1147 sprengelii, W. et N. ♄. 6, 7. In agro leodiensi (Lej!)
1148 macropyllus W. et N. ♄. 6, 7. In agro leodiensi (Lej!)
1149 carpinifolius, W. et N. ♄. 6, 7. In agro leodiensi (Lej!)
1150 vulgaris, W. et N. ♄. 6, 7. In agro leodiensi (Lej!)

†† candicantes.

1151 sylvaticus, W. et N. ♄. 7. In dumetis!
1152 pubescens, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis!
1153 argenteus, W. et N. ♄. 7. In ruderatis!
1154 discolor, W. et N. ♄. 7. In sepibus (Lej.)

C. virgæ glandulosæ.

D. sepalis fructiferis deflexis.

† corylifolii.

a. foliis ternatis.

1155 guntheri, W. et N. ♄. 6, 7. In nemorosis!
1156 menkei, W. et N. ♄. 6, 7. In frutetis!
1157 schleicheiri, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis (Lej.
1158 apiculatus, W. et N. ♄. In frutetis!

b. foliis quinato-digitatis.

1159 kohleri, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis!
1160 infestus, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis!

†† candicantes.

a. foliis ternatis.

1161 lejeunii, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis (Lej.)
1162 vestitus, W. et N. ♄. 6, 7. In Arduennâ (D.ᵃ Libert!)
1163 rosaceus, W. et N. ♄. 6, 7. In agro Leodiensi (Lej.)

b. foliis quinato-digitatis.

1164 Radula, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis (Lej!)
1165 rudis, W. et N. ♄. 6, 7. In dumetis (Lej!)
1166 Histrix, W. et N. ♄. 6, 7. In agro Leodiensi (Lej!)

2. sepalis fructiferis erectis.

1167 bellardi, W. et N. 6, 7. In sylvis (Lej!)
1168 dumetorum, W. et N. 6, 7. In dumetis!

β. nemorosus.

γ. tomentosus.

δ. pilosus.

Digitized by Google

1169 cæsius, L. ♄. 5—7. In dumetis!
β. pseudo-cæsius.
γ. pseudidæus.

Trib. 1. DRYADEÆ. *Vent.*

FRAGARIA. *Tourn.*

§. 1. Fragariotypus. Foliola plicatula.

1170 vesca, L. ♃. 5, 6. In sylvaticis!
β. semperflorens.
γ. efflagellis.
1171 collina, Ehrh. ♃. 5, 6. In sylvis elatis calcareis!
1172 elatior, Ehrh. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!

§. 2. Fragula. Folia simpliciter plicata (Sp. Americ.)

1173 chilensis, Molin. ♃. 5, 6. In pomariis culta!
1174 ananassa, Duch. ♃. 5, 6. In pomariis culta!
1175 virginiana, Ehrh. ♃. 4, 5. In pomariis culta.

POTENTILLA. *Neck.*

§. 1. Fragariastrum. Ceroma annulare nudum.

1176 fragariastrum, Ehrh ♃. 6, 6. In pascuis sylvaticis!
1177 alba, L. ♃. 4, 5. 9, 10. In Flandriâ fide Hoor!
β. splendens.

§. 2. Potentillotypus. Ceroma staminifer.

a. fragariopsis — floribus albis.
1178 rupestris, L. ♃. 6, 7. In umbrosis saxosis (Tin!)
b. potentillastrum — foliis pinnatipartitis.
1179 fruticosa, L. ♄. 6, 7. In Bataviâ (Dec. Bergsma.)
1180 supina, L. ①. 6—9 In ruderatis humidis!
1181 Anserina, L. ♃. 5—7. In pratis et ad fossas!
c. potentillaria — foliis palmatipartitis.
1182 reptans, L. ♃. 6—8. Ad vias et fossas!
1183 verna, L. ♃. 4—6. In apricis rupestribus!
β. filiformis.
1184 argentea L. ♃. 5—8. In colibus siccis.
1185 guntheri, Spr. ♃. 5—9. In montibus siccis Eifliæ!
1186 canescens, Besser. ♃. 6, 7. In agro Leodiensi (Lej!)
1187 hirta, L. ♃. 6—8. In agro Leodiensi (Lej!)
1188 recta, L. ♃. 6, 7. In agro Leodiensi (Lej! Mich!)

§. 3. Tormentilla

1189 Tormentilla, Schrank. ♃. 6, 7. In pascuis et sylvaticis!
1190 nemoralis, Nestl. ♃. 6, 7. In sylvaticis (D.ᵃ Libert!)

Digitized by Google

COMARUM. *Lin.*

1191 palustre, L. ♃. 6, 7. In fossis turfoso-uliginosis!

GEUM. *Lin.*

§. 1. Geotipus = Caryophyllastrum, Ser.

1192 urbanum, Lin. ♃. 5—7. In sylvaticis et dumetis!

1193 rubifolium Lej! ♃. 6—7, In umbrosis Malmund. (Lej!)

1194 umbrosum: foliis inferioribus simplicibus trilobis rotundatis, superioribus ternatis cuneatis acutis; sepalis petala excedentibus, lanceolatis acutis apice villosis; aristis hamatis erectis; stylis hirtis ♃. 6. in umbrosis propè Malmundarium (D.ª Libert!)

1195 incisum: foliis radicalibus inferioribusque pinnatisectis, segmentis lobatis incisis acutis, summis ternatis lanceolatis acuminatis grandidentatis; petalis calice longioribus; achæniis numerosis hirtis, aristis glabris, stylis hirtis ♃. In montosis humidis propè Neattern (Dreissen!)

§. 2. Caryophyllata. *Ser.*

1196 rivale, Gesn. ♃. 5—7. In pratis montosis!

Trib. 6. AGRIMONIDEÆ.

Achænia calice indurato inclusa.

AGRIMONIA. *Tourn.*

a. Foliolum impare petiolatum.

1197 sessiliflora, foliolis ovatis obtusis impari petiolato, bracteis lanceolatis; floribus sessilibus; hamis fructus erectis. ♃. 6, 7. In pratis apricis!

1198 Eupatorium, L! ♃. 6, 7. In apricis argillosis.

1199 acutifolia: foliolis ovato-oblongis acutis, impari petiolato, summis lanceolatis; bracteis linearibus; floribus pedunculatis, hamis fructus deflexis. ♃. 6, 7. In dumetis. *β.* Dreissen! *γ.* Tin!

α. discolor.

β. lævigata.

γ? pallida.

b. Foliolum impare sessile.

1200 canescens: foliolis obtusè dentatis, ovatis, obtusis, impari in inferioribus sessili, in summis petiolato; bracteis linearibus. ♃. 7, 8. In dumetis et sepibus (Mich! Tin!)

1201 stipularis: foliolis argutè dentatis, ovato-oblongis, acutis impari sessili; bracteis lanceolatis. ♃. 7, 8. In dumetis.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Trib. 7. SPIRÆACEÆ, *Dec.*

SPIRÆA. *Gærtn.*

§. 1. Spiræotypus. — Spiræa. *Camb.*

1202 belgica : fruticosa; foliis oblongo-ovatis, obtusis, glabris, inæqualiter serratis, basi integris; corymbis terminalibus simplicibus multifloris. ♄. 6. In sylvis propè Habay (Tinant!)

1203 salicifolia, L. ♄. 6—8. In uliginosis Campiniæ!

§. 2. Ulmaria, *Camb.*

Filipendula, L. ♃. 6. 7. In pascuis elatis!

1205 [illegible] L. ♃. 6. graminosis humidis!

α. discolor.

β. mixta.

γ. concolor.

Fam. 64. LEGUMINOSÆ. *Adans.*

Trib. 1. GENISTEÆ. *Bronn.*

ULEX. *Lin.*

1206 europæus, L. ♄. 5—10. In sabuletis!

1207 nanus, Sm! ♃. 8—10. In ericetis Flandriæ (Hoor!)

GENISTA. *Lam.*

§. 2. Scorpius. *Moench.*

1208 anglica, L. ♃. 5, 6. In pascuis sterilibus!

1209 germanica, L. ♃. 5—7. In pascuis sterilibus (Héc! Tin!)

§. 2. Corniola. *Adans.*

1210 tinctoria, L. ♃. 6—8. In pasc. argilloso-calcareis!

§. 3. Genistella. *Tourn.*

1211 sagittalis, L. ♃. 5—7. In collibus sterilibus!

§. 4. Genistotypus.

1212 pilosa, L. ♃. 5—9. In ericetis aridis!

β. erecta.

CITYSUS. *Dec.*

§. 1. Laburnum. *Dec.*

1213 Laburnum, L. ♄. 5, 6. In montosis sylvat. Leod. (Lej. Mich!)

Digitized by Google

§. 2. Spartopsis. Stylus volubilis.

1214 scoparius, Lk. ♄. 7—8. In apricis!

§. 2. Cytisotypus. Viborgia. *Moench.*

1215 supinus, Jacq. ♃. 5—7. Collib. apricis herbos. (Dec. Hoor!)

ONONIS. *Lin.*

§. 1. Natrix. *Riv.*

1216 Natrix L. ♃ 7, 8. In apricis Flandriæ. (Hoor!)

§ 2. Bugrana, *Dec.*

1217 altissima, Lam. ♃. 7—9. In apricis montosis!
1218 procurrens, Wallr. ♃. 7—10. In pascuis arenosis!
β. repens.
1219 spinosa, L. ♃. 6—8. In ambarvalibus!
β. angustifolia.

§. 3. Bugranoïdes. *Dec.*

1220 columnæ, All. ♃. 6, 7. In apricis Flandriæ (Hoor.)

ANTHYLLIS. *Lin.*

1221 vulneraria. L. ♃. 5—8. In pascuis siccis!

Trib. 9. TRIFOLIEÆ.

MEDICAGO. *Lin.*

§. 1. Medica.

1222 lupulina, L. ①. 6—9. In arvis!
β. willdenovii.
γ. unguiculata.
1223 falcata, L. ♃. 6—8. In aggeribus glareosis!
β. cœrulea.
1224 sativa, L. ♃. 6—8. In pratis spontè!
1225 glomerata, Balb. ♃. 6. In dunis Dunkerke (Alav.)

§. 2. Spirocarpos. *Ser.*

a. Legumen inerme.

1226 orbicularis, All. ①. 7—9. In Flandriâ fide Hoor.

b. Legumen armatum glabrum.

1227 apiculata, Willd. ①. 5—7. In cultis Malmundarii (Lej.)
1228 denticulata, Willd. ①. 5—7. In incultis Verv. (Lej.)
1229 muricata, All. ①. 6, 7. In cultis (Lej.)
1230 intertexta, Willd. ①. 5—7. In Luxemburgio (Tin!)
1231 maculata, Willd. ①. 5—7. In cultis!
β. riparia.

Digitized by Google

c. — Legumen armatum pubescens.

1232 rigidula, Willd. ①. 6—8. In sabulosis (Dek.)
1233 gerardi, Kit. ①. 6. Ad ripas Vesæ (Mich!)
2234 minima, Lam. ①. 5, 6. In collibus siccis!
β. hirsuta.

TRIGONELLA. *Lin.*

§. 1. Grammocarpus. *Ser.*

1235 coerulea, Ser. ①. 7, 8. Spontanea fide M. et W.

§. 2. Fœnumgræcum. *Ser.*

1236 fœnum græcum, L. ①. 7. In arvis Mosellæ (March)

§. 3. Buceras. *Ser.*

1237 monspeliaca, L. ①. 6, 7. In sabulosis Flandriæ fide Hoor!

§. 4. Falcatula. *Ser.*

1238 corniculata, L. ①. 6, 7. In Gelriâ fide Gort.

MELILOTUS. *Tourn.*

§. 1. Coelorutis. *Ser.*

1239 officinalis, Hayne. ②. 6—9. In aggeribus!
1240 altissima, Thuil! 6—9. Ad ripas (Hoor!)
1241 alba, Thuil! 6—9. In glareosis!

§. 2. Plagiorutis. *Ser.*

1242 arvensis, Wallr. ①. 6—9. In arvis (Lej!)

TRIFOLIUM. *Tourn.*

§. 1. Lagopus. *Ser.*

1243 angustifolium, L! ①. 6—8. Ad semitas sylvarum (Lej!)
1244 rubens, L! ♃. 6, 7. In collibus Luxemb. (Tin! March!)
1245 incarnatum, L! ①. 5, 6. In arvis!
1246 arvense, L! ①. 7—9. In arvis!
β. gracile.

§. 2. Phleastrum. *Ser.*

1247 striatum, L. ①. 6—8. In pascuis siccis!
1248 scabrum, L! ①. 6—8. In pascuis siccis Flandriæ (Hoor!)

§. 3. Triphyllotypus — Eutriphyllum, *Ser.*

1249 alpestre, L! ♃. 5—7. In rupestribus Luxemburgii!
1250 medium, L! ♃. 5—7. In pascuis montosis!
1251 sativum, Boen. ♃. 7—10. Colitur in agris!
1252 pratense, L. ♃. 5—7. In pratis et pascuis!
β? gracilescens, Ser!
1253 glareosum = Heterophyllum, Lej! nec Tratt. ♃. 5—7. In glareosis Leod. (Mich!)

Digitized by Google

1254 capillatum : diffusum, villosum, foliolis ovatis; stipulis latis, nervosis, glabriusculis, caudatis; segmentis calicinis corollâ longioribus. ♃. 5, 6. In pratis Juslenville!
1255 diffusum, Ehrh. ①. 7. In arenosis Flandriæ fide Hoor!
1256 ochroleucum, L! ♃. 6—8. In montosis siccis!

§. 4. Trifoliastrum. *Ser.*

1257 repens, L! ♃. 5—8. In pratis et pascuis!
1258 hybridum, L. ♃. 6—8. In sylvis (Lej!)
1259 montanum, L! ♃. 5—7. In pratis montosis!

§. 5. Vesicastrum. *Ser.*

1260 subterraneum, L! ①. 5—7. In agris sabulosis!
1261 resupinatum, L! ①. 7. In Gelriâ. (Gort.)
1262 fragiferum, L! ①. 6—8. In pratis humidis!

§. 6. Lupulina.

1263 spadiceum, L. ①. 6—8. Propè Malmundarium (D.ᵒ Libert!)
1264 agrarium, L! ①. 6—8. In agris et pasc. sicc!
1265 campestre, Schreb. ①. 7—9. In agris!
β? agrariiforme : foliolis rhombeo-ovatis.
1266 procumbens, L! ①. 5—8. In pratis!
1267 parisiense, Dec. ①. 6, 7. In pratis Flandriæ (Hoor!)
2268 minus, Sm. ①. 6, 7. In pratis!
β. ovalifolium.
1269 filiforme, L! ①. 6, 7. In pratis!

LOTUS. *Spr.*

1270 corniculatus, L. ♃. 5—8. In graminosis!
β. major.
271 aristatus, Dec. ①. 6, 7. In agro Verviensi (Lej.)

TETRAGONOLOBUS. *Scop.*

1272 siliquosus, Roth. ♃. 6—8. In pratis humidis (Hoor! Zinn.)

Trib. 3. GALEGEÆ. *Bronn.*

GLYCYRRHIZA. *Tourn.*

1273 glabra, L. ♃. 7—9. Ad sepes quasi spontè!

GALEGA. *Tourn.*

1274 officinalis, L. ♃. 7-9. In pratis glareos. (Lej!)

ROBINIA. *Dec.*

1275 pseudacacia, L. ♄. 6. Hinc indè in sylvis ex culturâ!

Digitized by Google

COLUTEA. *R. Br.*

1276 arborescens, L. ♄. 6—8. In fissuris rupium Petersberg!

Trib. 4. ASTRAGALEÆ. *Adans.*

OXYTROPIS. *Dec.*

1277 campestris, Dec. ♃. 6—8. In Flandriâ fide Hoor!

ASTRAGALUS. *Dec.*

1278 glyciphyllos, L. ♃. 6, 7. In frutetis montosis!
1279 Cicer, L. ♃. 7, 8. In pratis montosis!
1280 monspessulanus, L. 6, 7. In Flandriâ fide Hoor!
1281 hypoglottis, L. ♃. 6—8. In arenosis Flandriæ fide Hoor!

Trib. 5. HEDYSAREÆ. *Dec.*

Subtrib. 1. CORONILLEÆ.

CORONILLA. *Lam.*

1282 varia, L. ♃. 6—8. In pascuis!
1283 minima, L. ♃. 6—8. In collibus siccis (Hoor! Desm.)

ORNITHOPUS. *Desv.*

1284 perpusillus, L. ①. 5—8. In pascuis arenosis!
β. tuberosus.

HIPPOCREPIS. *Lin.*

1285 comosa, L. ♃. 5—7. In collibus calcareis!

Subtrib. 2. ONOBRYCHEÆ.

ONOBRYCHIS. *Tourn.*

1286 sativa, Lam. ♃. 5—8. In collibus calcareis!

Trib. 6. VICIEÆ. *Bronn.*

FABA. *Tourn.*

1287 vulgaris, Moench. ①. 6—8. In agris colitur!
β. equina.

Digitized by Google

VICIA. *Tourn.*

§. 1. Cracca. Stylus infra stigma villosus.

1288 pisiformis, L! ♃. 6—8. In nemorosis Luxemb. (March! Tin!)
1289 dumetorum, L! ♃. 6—8. In dumetis. (Rouc. Dek.)
1290 sylvatica, L! ♃. 6, 7. In sylvis montosis (Héc. Olis!)
1291 villosa, Roth. ①. 6, 7. In Bataviâ (Favr.)
1292 cassubica, L! ♃. 6, 7. In graminosis (Favr.)
β. orobus, Ser.
1293 Cracca, L. ♃. 7, 8, In pratis et dumetis!
1294 tenuifolia, Roth. ♃. 6—8. In sepibus et dumetis (Lej!)
1295 onobrychoïdes, L. ♃. 6. In Luxemburgio (Phil. Tin.)

§. 2. Viciotypus. — Stylus infrà stigma externè barbatus.

1296 sepium, L! ♃. 5—7. In pratis et dumetis!
1297 sativa, L! ①. 6—8. In agris!
β. nemoralis.
1298 segetalis, Thuil. ①. 6—8. In agris!
1299 angustifolia, Roth. ①. 5—8. In cultis et incultis!
1300 peregrina, L! ①. 6—8. In graminosis umbrosis (B. et P.)
1301 lutea, L! ①. 6—8. Ad margines agrorum (Lej. Hoor!)
1302 hybrida, L! ①. 6, 7. In pratis siccis (Lej! Desm!)
1303 lathyroïdes, L! ①. 4, 5. In pascuis siccis!
β. tuberosa.

ERVILIA. *Link.*

1304 sativa, Link. ①. 7, 8. In messibus (Mich!)

ERVUM. — Stylus glaber. Stigma clavatum villosum.

1305 monanthos, L. ①. 6, 7. In arvis (M. et W. Héc.)
1306 hirsutum, L. ①. 6, 7. In agris et dumetis!
1307 tetraspermum, L. ①. 5—7. In arvis et dumetis!
β. gracile.

PISUM. *Tourn.*

1308 arvense, L. ①. 5, 6. Inter segetes!
1309 sativum, L. ①. 5, 6, Colitur!
1310 maritimum, L. ♃. 6, 7. In maritimis (Lin. Dec.)

LATHYRUS. *Lin.*

§. 1. Aphaca. — Calix 5 fidus æqualis.

1311 Aphaca, L. ①. 5—8. In agris!

§. 2. Nissolia. *Moench.*

1312 Nissolia, L. ②. 5—7. In graminosis umbrosis!

Digitized by Google

§. 3. Lathyrotypus.

1313 angulatus, L. ①. 5—7. In sylvis Luxemb. (Tin.)
1314 sativus, L. ①. 6, 7. In agris Luxemburgii!
1315 Lens = Ervum, L. ②. 6, 7. In agris colitur!
1316 hirsutus, L. ①. 6—8. In agris Luxemburgii!
1317 palustris, L. ♃. 6—8. In pratis turfosis!
α. angustifolius.
β. latifolius.
1318 tuberosus, L. ♃. 5, 7. In agris inter segetes!
1319 pratensis, L. ♃. 6—8. In pratis frequens!
1320 sylvestris, L. ♃. 7, 8. In dumetis calcareis!
1321 latifolius, L. ♃. 6—9. In sepibus (Goss. Beyer.)

OROBUS. *Tourn.*

1322 tuberosus, L. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!
α. latifolius.
β. heterophyllus.
γ. tenuifolius.
δ. aphyllus.
1223 vernus, L. ♃. 4, 5. In nemorosis (Nyst. Hoor!)
1324 niger, L. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!
1325 sylvaticus, L. ♃. 5, 6. In sylvis (Neck. Hec.)

Taib. 7. PHASEOLEÆ.

PHASEOLUS. *Lin.*

1326 vulgaris, Savi. ♃. 6, 7. Colitur!
1327 compressus, Dec. ①. 6, 7. Colitur!
1328 tumidus, Savi. ①. 6, 7. Colitur!

Fam. 65. RHAMNACEÆ. *R. Br.*

RHAMNUS. *Gærtn.*

§. 1. Rhamnotypus.

1329 catharticus, L. ♄. 5, 6. In dumetis!

§. 2. Frangula. *Tourn.*

1330 Frangula, L. ♄. 5—8. In sylvaticis!

Fam. 66. ILICEÆ. *Comm. Bot.*

ILEX. *Lin.*

1331 Aquifolium, L. ♄. 5, 6. In sylvaticis!

Digitized by Google

Trib. 1. EVONYMEÆ. *Dec.*

EVONYMUS. *Tourn.*

1332 europæus, L. ♄. 5, 6. In sylvis et dumetis!
β. angustifolius.
1333 verrucosus, L. ♄. 5, 6. In Flandriâ fide Hoor!
1334 latifolius, Scop. ♄. 5, 6. In Flandriâ fide Hoor!

Trib. 2. STAPHYLEACEÆ. *Dec.*

STAPHYLEA. *Lin.*

1335 pinnata, L. ♄. 5, 6. In sylvis Eifliæ (M. et W.)

Ordo 8. THALAMUNGULIA.

Fam. 68. RUTACEÆ. *Juss.*

RUTA. *Lin.*

1336 montana, Clus. ♄. 7, 8. In Flandriâ fide Hoor!

Fam. 69. MONOTROPEÆ.

MONOTROPA. *Lin.*

1337 Hypopitys, L. ♃. 6, 7. In pinetis. (Beyer! March!)
1338 Hypophæga, Wallr. ♃. 7, 8. In faginetis. (Olis!)

Fam. 70. PYROLACEÆ.

PYROLA. *Tourn.*

§ 1. Pyrolotypus. — Stylus declinatus. Antheræ muticæ.

1339 rotundifolia, L. ♃. 5—7. In umbrosis et vallibus dunarum!
1340 media, Sw. ♃. 8. In pinetis Gelriæ!

Digitized by Google

§ 2. Pyrolopsis. — Stylus erectus. Antheræ muticæ.

1341 minor, L. ♃. 5—7. In sylvaticis umbrosis!
1342 secunda, L. ♃. 5, 6. In sylvis montosis dub. civ. (M. et W.)

§ 3. Pirolastrum. — Stylus rectus. Antheræ bicornes.

1343 uniflora, L. ♃. 7. In vallibus dunarum. (Boerh. Lest. Rouc.)

Fam. 71. EMPETRACEÆ.

EMPETRUM. *Tourn.*

1344 nigrum, L. ♄. 3. In ericetis et pinetis!
α. dicline.
β? hermaphroditum.

Fam. 72. STELLARIACEÆ. — Caryophylleæ. *Juss.*

Trib. 1. SILENEÆ. *Dec.*

DIANTHUS. *Lin.*

§ 1. Armeriastrum. *Ser.*

1345 prolifer, L. ①. 6—8. In collibus lapidosis!
β. diminutus.
1346 Carthusianorum, L. ♃. 6—8. In collibus siccis!
β. atrorubens.
γ. anisopodus.
1347 Armeria, L. ①. 7—8. In arenosis et ad margines sylv!

§ 2. Dianthotypus.

1348 collinus, W. et K. ♃. 7—10. In rupibus Condrusiæ (Lej.) dub. civ.
1349 glacialis, Haenke ♃. 8, 9. In montibus Eifliæ (D.a Libert!)
1350 cæsius, Smith. ♃. 6, 7. In rupibus Arduennæ!
1351 deltoides, L. ♃. 6—9. In pascuis siccis arenosis!
β. glaucus.
1352 Caryophyllus, L. ♃. In muris (Hoor! Hocq.)
1353 arrectus: caule paucifloro stricto; foliis strictis margine scabris; caliculis ovatis cuspidatis, calici quadruplò brevioribus; calicis dentibus obtusis ciliatis; petalis fimbriatis fauce barbatis. ♃. 5, 6. In muris Arduennæ!
1354 plumarius, L. ♃. 6—8. In muris Arduennæ!
1355 arenarius, L. ♃. 5, 6. In arenosis Bataviæ. (Gort. Kops.) d. c.
1356 superbus, L. ♃. 6—8. In umbrosis Condrusiæ. (Mich!)

Digitized by Google

SAPONARIA. *Smith.*

1357 officinalis, L. ♃. 6—8. In ruderatis et ad ripas!

GYPSOPHILA. *Lin.*

§ 1. VACCARIA. *Dod.*

1358 vaccaria, Sm. ①. 6—9. In agris argillosis!
β. albiflora.

§ 2. PETRORHAGIA. *Ser.*

1359 saxifraga, L. ♃. 6—8. In sabulosis et lapidosis!
β. rigida.

§ 3. STRUTHIUM. *Ser.*

1360 muralis, L. ①. 7—9. In arvis!
α. fastigiata.
β. divaricata.

CUCUBALUS. *Gærtn.*

1361 bacciferus, L. ♃. 6—8. In sylvaticis (Duc!)

SILENE. *Lin.*

§ 1. BEHEN. *Mœnch.*

1362 inflata, Smith. ♃. 6—8. In campis argilloso-calcareis!
β. pubescens.
γ. enervis.
1363 maritima, Sm. ♃. 8, 9. In maritimis Flandriæ (Hoor!)

§. 2. OTITES. *Adans.*

1364 Otites, L. ♃. 7, 8. In arenosis maritimis Hollandiæ!

§. 3. CONOMORPHA. *Otth.*

1365 conica, L. ①. 6, 7. In agris arenosis!
1366 conoidea, L. ①. 6, 7. In Flandriâ (Hoor!)

§. 4. SILENOTYPUS.

1367 anglica, L. ①. 6—8. In agris arenosis!
1368 gallica, L. ①. 6—8. In agris Leod. (Lej!)
1369 cerastoides, L. ①. 7. In agris transmosanis (M. et W.)
1370 quinquevulnera, L. ①. 6, 7. In arvis arenosis!
1371 pendula, L. ①. 6—8. In dunis Hollandiæ (Meerb. Muld.)
1372 nutans, L. ♃. 6, 7. In pascuis montosis calcareis!
β. amblevana.
γ. dunensis.
1373 noctiflora, L. ①. 6—8. In agris et sepibus!
1374 Armeria, L. ①. 6—8. In rupibus (Decl! March!)

Digitized by Google

LYCHNIS.

§. 1. Viscaria. *Dec.*

1375 Viscaria, L. ♃. 5—7. In rupibus Arduennæ!

§. 2. Coccyganthos.

1376 flos cuculi, L. ♃. 5—7. In pratis humidis!

AGROSTEMMA. *Lin.*

§. 1. Agrostemmotypus

1377 coronaria, L. ②. 6, 7. In agro Namurcensi (Decl!)

§. 2. Githago. *Desf.*

1378 Githago, L. ①. 6, 7. Inter segetes!

MELANDRIUM. *Rœhling.*

1379 diurnum, M. et W. ♃. 5—9. In umbrosis humidis!
1380 vespertinum, M. et W. ♃. 5—7. In agris et sepibus!

Trib. 2. ALSINEÆ. *Dec.*

Subtrib. 1. Cerastieæ.

Capsula denticulata.

CERASTIUM. *Lin.*

§. 1, Orthocerastium. — Capsula recta.

1381 tomentosum, L! ♃. 5, 6. In muris antiquis et rupibus!
1382 arvense, L! ♃. 4—6. In aggeribus arenosis!
β. hirtifolium.
γ. uniflorum.

§. 2. Cerastiotypus. — Caps. obliqua.

a. Stamina 10.

1383 viscosum, L. ♃. 5—9. In pascuis et ruderatis!
1384 vulgatum, L! ①. 5—10. In arvis arenosis!
β. glomeratum.
1385 brachypetalum, Pers. ①. 4—6. In arenosis Luxemb!

b. Stamina 5.

1386 apetalum, Dmrtr. ①. 3, 4. In arenosis!
1387 pellucidum, Chaub. ①. 4—6. In arenosis Flandriæ!
1389 semidecandrum, L! ①. 4—6. In aggeribus et muris!

HOLOSTEUM. *Lin.*

1390 umbellatum, L. ①. 3—5. In arvis!

Digitized by Google

OENCHIA. *Ehrh.*

1391 erecta, Sm. ①. 5. In pascuis arenosis.

Subtrib. 2. ARENARIÆ.

Capsula fissilis.

LARBRÆA. *S.t-Hill.*

1392 aquatica, S.t Hill. ①. 5, 6. Ad scaturgines!
1393 crassifolia = Stellaria, Ehrh. ①. 6. In humidis (Lej!)

ALSINE. — Fructus cum calice articulato-deciduus.

1394 pallida : caulibus filiformibus humifusis, foliis ovatis acutis; floribus apetalis; pedunculis fructiferis rectis. ①. 3—5. In cultis humidis solo arenoso!
1395 media, L. ①. 3—11. In agris et cultis ubiquè!
β. leiosepala.
1396 neglecta, Lej! ①. 5—7. Ad margines rivulorum!
1397 latifolia = Stellaria, Pers. ①. 7, 8. In Hannoniâ (Nyst. Hocq.)
1398 nemorum = Stellaria, L. ♃. 5—8. In umbrosis subhumidis!

MYOSANTHUS. *Desv.*

1399 aquaticus, Desv. ♃. 6—8. Ad margines fossarum!
β? scandens, Hocq.

STELLARIA. *Lin.*

1400 graminea, L. ♃. 6—8. In umbrosis et sepibus!
1401 glauca, With. ♃. 6, 7. In paludosis secus fossas!
1402 holostea, L. ♃. 4—6. In sylvis frondosis!
β. pubescens.

ARENARIA. *Lin.*

§. 1. ALSINANTHUS. — Caps. sexvalvis.

a. folia plana.

1403 serpillifolia, L. ①. 5—7. In agris, muris et aggeribus!
1404 trinervia, L. ②. 4—6. In umbrosis!
1405 ciliata, L. ♃. 5, 6. Locis siccis Hannoniæ (Desm.) dub. civ.

b. folia subulata.

1406 verna, L. ♃. 5—8. In Arduennâ!
β. cæspitosa Ehrh.
1407 triflora, Lin. ♃. . In Flandriâ fide Hoor!

Digitized by Google

§. 2. Arenarium. — Caps. 3 valvis.

1408 tenuifolia, L. ①. 6—8. In agris arvis!
β? viscidula.
1409 setacea, Thuil. ♃. 6—8. In Flandriâ fide Hoor!

SAGINA. *Lin.*

1410 procumbens, L. ♃. 5—10. In agris et pascuis!
1411 saxatilis, Lej! ①? 6. In Luxemburgio (Tin! March!)
1412 maritima, Sm. ①. 5—8. In arenosis maritimis Flandriæ!
1413 apetala, L. ①. 5—7. In agris, inter segetes!
β? depressa.

PHALOE. — Calix 5 sepalus. Petala 5 integra. Stamina 10 subulata. Styli 5 plumosi. Capsula 5 valvis. Semina reniformia. Folia opposita estipulata.

1414 subulata = Spergula, Sw. ♃. 7, 8. In arenosis Flandriæ (Hoor!)
1415 saginoides = Spergula, L. ♃. 6. In Hannoniâ (Desm.) d. c.
1416 nodosa = Spergula, L. ♃. 6—9. In turfosis uliginosis!
β. maritima.

Subtrib. 3. Spergulæ. — Folia stipulata.

SPERGULA. — Styli ligulati simplices. Semina lenticularia.

1417 pentandra, L. ①. 4—6. In agris arenosis!
1418 sativa, Boen. ①. 6—9. In agris sabulosis!
1419 vulgaris, Boen. ①. 6—9. In agris et arvis!
β. sphærocarpa.
1420 maxima, Weihe. ①. 6—8. In agris inter Linum!

DELIA. — Calix 5 sepalus. Petala 5 integra. Stamina 5 dilatata. Styli 3. Capsula 3 valvis.

1421 segetalis = Alsine, L, ①. 5, 6. In messibus (Vois! Olis!)

BUDA. — B. et Tissa. *Adans.*

1422 rubra = Arenaria, L. ①. 6—8. In pascuis sabulosis!
1423 marina = Arenaria, L. ①. 6—8. In humidis salsis!
1424 media = Arenaria, L. ①. 6—8. In humidis salsis!

Digitized by Google

ELATINE. *Lin.*

§. 1. Birolia. *Bell.*

1425 triandra, Schk. ①. 7, 8. In fossis (M. et W.)
1426 hexandra, Dec. ①. 8—10. In fossis limosis (Rouc.)

§. 2. Elatinotypus. — Petala 4.

1427 siphosperma : foliis oppositis, floribus alternis subsessilibus quadripartitis, seminibus recurvato-hamosis. ①. 8, 9. In fossis!
1428 majuscula : foliis oppositis, floribus alternis pedunculatis quadripartis, seminibus rectiusculis ①. 8, 9. In fossis. an E. major Br?

§. 3. Potamopitys.

1429 alsinastrum, L. ♃. 7—9. In fossis (Hoor! Lej!)

Fam. 74. LINIDEÆ — Lineæ, *Dec.*

LINUM. *Bauh.*

1430 usitatissimum, L. ①. 5—7. Colitur in agris!
1431 crepitans : capsulis per maturitatem elasticè dehiscentibus — L. usit. β. Boen. ①. 5—7. Interdum colitur, et inter segetes occurrit!
1432 perenne, L. ♃. 6, 7. In Flandriâ fide Hoor!
1433 tenuifolium, L. ♃. 6—8. In montosis aridis (Tin!)
1434 maritimum, L. ♃. 6, 7. In Flandriâ fide Hoor!
1435 catharticum, L. ①. 6—8. In graminosis siccis!

RADIOLA. *Dill.*

1436 millegrana, Smith, ①. 7, 8. In arenosis humidis!

Fam. 75. OXALIDEÆ. *Rich.*

OXALIS. *Lin.*

§. 1. Oxalidotypus. Stamina capillaria,

1437 Acetosella, L. ♃. 4. In nemorosis et coyletis!
β. rubriflora.
1438 parviflora, Lej. ♃. 4. In sep. umbros. Malmund. (D.a Libert!)

§. 2. Ceratoxalis. Stamina monadelpha,

1439 stricta, L. ♃. 5—9. In cultis et agris arenosis!
β. diffusa.
1440 corniculata, L. ①. 6—8. In arvis et cultis (Lej!)

Digitized by Google

IMPATIENS. *Riv.*

1441 noli tangere, L. ①. 7, 8. In umbrosis humidis!

Fam. 77. GERANIDEÆ. *Juss.*

ERODIUM. *L'her.*

1442 malachoides, Willd. ①. 7, 8. In dunis Hollandiæ (Vh!)
1443 maritimum, Sm. ♃. 5—9. In maritimis Gallobelgii (Neck. Lk.)
1444 ciconium, Willd. ①. 5—7. In Brabantiâ (Kx!)
1445 moschatum, L'Her. ①. 5—9. Ad vias!
1446 pimpinellifolium, Cav. ①. 4—8. Propè Aquisgranum (Lej.)
1447 cicutarium, L'Her. 4—10. In agris et ruderatis!
β. præcox.
γ. pilosum.
δ. chœrophyllum.
ε. cicutæfolium.

GERANIUM. *L'Her.*

§. 1. RUBERTA. — Semina filo pendentia.

1448 Robertianum, L. ①. 5—10 In ruderatis et ad sepes!
β. leucanthon.
1449 lucidum, L. ①. 5, 6. In rupibus umbrosis!

§. 2. TRIGONIUM. — Cocca adnata. Petala erosa

1450 columbinum, L. ①. 6—8. In dumetis et arvis calcareis!
1451 dissectum, L. ①. 5—8. In ruderatis et arvis!
1452 rotundifolium, L. ①. 6, 7. In ruderatis et ad sepes!
1453 pusillum, L. ①. 6—9. In ruderatis!
1454 molle, L. ①. 4—9. Cum priori!
1455 pyrenaicum, L. ♃. 5—7. In ruderatis!

§. 5. GERANOTYPUS. — Petala integra. Cocca adnata.

1456 palustre, L. ♃. 6—8. In paludosis Arduennæ (Lej.)
1457 pratense, L. ♃. 6, 7. In pratis!
1458 sylvaticum, L. ♃. 6, 7. In umbrosis!
β. batrachioides.
1459 phæum, L. ♃. 5—7. In dumetis (Lej! Decl!)
β? fuscum.
1460 macrorhizon, L. ♃: 5—7. In montibus et muris!
1461 sanguineum, L. ♃. 5—7. In rupibus!

Digitized by Google

VITIS. *Lin.*

1462 vinifera, L. ♄. 6. Colitur!
β. sylvestris.
1463 laciniosa, L. ♄. 6. Colitur!

Fam. 79. ACERINEÆ. *Juss.*

Trib. 1. ACEREÆ. — Acerineæ. *Dec.*

ACER. *Moench.*

1464 pseudo-platanus, L. ♄. 4, 5. In sylvis!
β. obtusangulum.
1465 Platanoides, L. ♄: 5. In sylvis montosis!
1466 monspessulanum, L. ♄. 5, 6. In valle Mosellanâ (Dec.)
1467 campestre, L. ♄. 5. In sylvis et dumetis calcareis!
β. pubescens.
1468 suberosum : cortice suberoso; foliis lobatis, grandidentatis; racemis erectis. ♄. 5. In sylvis montosis!

Trib. 2. FRAXINEÆ.

FRAXINUS. *Tourn.*

1469 excelsior, L. ♄. 4, 5. In nemoribus frequens!

ORNUS. *Tourn.*

1470 europæa, Pers. ♄. 5. In monte Petersberg (Mich!)

Trib. 3. HIPPOCASTANEÆ. *Dec.*

ÆSCULUS. *Dec.*

1471 Hippocastanum, L. ♄. 4, 5. Ad vias culta!

Fam. 80. HYPERICINEÆ. *Juss.*

ANDROSÆMUM. *All.*

1472 bacciferum, All. ♃. 6, 7. In montosis agri Leod. (Doss!)

Digitized by Google

HYPERICUM.

2473 quadrangulum, L. ♃. 7, 8. In pascuis humidis!
1474 dubium, Leers. ♃. 7, 8. In dumetis et ad margines agrorum!
1475 perforatum, L. ♃. 6—9. In sylvaticis et dumetis!
β. microphyllum.
1476 hirsutum, L. ♃. 6—8. In nemorosis!
1477 montanum, L. ♃. 7—9. In sylvis montosis calcareis!
1478 pulchrum, L. ♃. 7—9. In ericetis!
1479 liottardi, Vill. ②. 7—9. In Arduennâ (D.ª Libert.)
1480 humifusum, L. ♃. 6—9. In agris et arvis!
1481 Elodes, L. ♃. 7, 9. In fossis turfosis!

Fam. 81. MALVACEÆ. *Adans.*

MALVA. *Lin.*

§. 1. Bismalva. — Calix fructiferus vesiculosus.

1482 Alcea, L. ♃. 6—9. In collibus et sepibus!
1483 bismalva, Bernh. ♃. 6—9. In agro Leodiensi (Lej!)
1484 moschata, L. ♃. 6—9. In montosis sylvaticis!
β. integrifolia Lej.
γ. laciniata, Desv.
δ. heterophylla, Lej.

§. 2. Malvotypus. — Calix fructiferus rotatus.

1485 mauritiana, L. ①. 6—9. propè Heusden (Olis!)
1486 sylvestris, L. ②. In ruderatis et ad vias!
1487 rotundifolia, L. ♃. 6—10. Cum priori.
1488 pusilla, With. ♃. 6—8. In Brabantiâ (Kx. F.)
1489 crispa, L. ①. 7, 8. passim spontè!

ALTHÆA. *Cav.*

1490 officinalis, L. ♃. 7, 8. In paludibus!
β. obtusiuscula.
1491 cannabina, L. ♃. 6—9. In sepibus!
1492 hirsuta, L. ①. 6—9. In saxosis apricis (March! Tin!)

Fam. 82. TILIACEÆ. *Juss.*

TILIA. *Lin.*

1493 parvifolia, Hoffm. ♄. 7. In sylvis

Digitized by Google

1494 vulgaris, Hayne. ♄. 6, 7. In sylvis et ad vias!
1495 pauciflora, Hayne. ♄. 5—6. In sylvis et ad vias!

Fam. 83. CISTINEÆ. *Dun.*

HELIANTHEMUM. *Tourn.*

§. 1. HALIMIUM. *Dun.*

1496 umbellatum, Mill. ♃. 5, 6. In ericetis (Mich. Hoor!)

§. 2. TUBERARIA. *Dun.*

1497 guttatum, Mill. ①. 6, 7. In arenosis (Breyne. Hoor!)

§. 3. FUMANA. *Dun.*

1498 Fumana, Mill. ♃. 5, 6. In apricis Flandriæ (Desm! Hoor!)
1499 levipes, Willd. ♃. 5, 6. In Flandriâ fide Hoor.

§. 4. HELIANTHEMOTYPUS.

1500 serpyllifolium, Mill. ♃. 6—8. In Arduennâ (Mich!)
1501 vulgare, Gærtn. ♃. 6—8. In saxosis calcareis!
1502 obscurum, Pers. ♃. 6—8. In saxosis calcareis!
1503 hirtum, Pers. ♃, 6, 7. In monte Herfault (Desm.)
1504 apeninum, Dec. ♃. 5, 6. In Flandriâ fide Hoor.
1505 pilosum, Pers. ♃. 5, 6. In propè Namurcum (Rouc.)
1506 lineare, Pers. ♃. 5, 6. propè Chokier (Couri,)
1507 pulverulentum, Dec. ♃. 6. In valle Mosanâ!

Fam. 84. DROSERACEÆ. *Batsch.*

Trib. 1. PARNASSIDEÆ.

Squamæ 5 petalis oppositæ, apice setoso-glandulosæ.

PARNASSIA. *Tourn.*

1508 palustris, L. ♃. 7—9. In turfosis uliginosis!

Trib. 2. DROSEREÆ.

Squamæ petalis oppositæ nullæ.

DROSERA. *Lin.*

§. 1. ROREL LA. — Semina arillata.

1509 rotundifolia, L. ♃. 6—8. In turfosis et ericetis uliginosis!

Digitized by Google

1510 anglica, Huds. ①. 7, 8. In turfosis uliginosis!

§. 2. Droserotypus. — Semina exarillata.

1511 longifolia, L. ♃ ? 7, 8. In ericetis uliginosis!
β? caulescens.

Fam. 85. RESEDACEÆ. *Dec.*

RESEDA. *Neck.*

§. 1. Luteola bauh. — Sepala 4. Capsula depressa.

1512 luteola, L. ②. 6—8. In ruderatis calcareis!

§. 2. Resedotypus. — Sepala 3. Capsula oblonga.

1513 lutea, L. ②. 6—9. In collibus et ruderatis cretaceis!
β. crispa.
1514 Phyteuma, L. ①. 6, 7. In agris Flandriæ (Hoor!)
1515 odorata, L. ①. 7, 8. In agris ex culturâ!

Fam. 86. VIOLACEÆ. *Vent.*

VIOLA. *Tourn.*

§. 1. Violotypus.

1516 palustris, L. ♃. 4—6. In paludibus muscosis!
1517 hirta, Sm. ♃. 4, 5. In dumetis calcareis!
1518 odorata, L. ♃. 3, 4. In nemorosis et pascuis!
β. rubicunda.
γ. alba, Bess.
1519 mirabilis, L. ♃. 5. In nemoribus Gelriæ (Vh.)
1520 canina, Rchb. ♃. 4, 5. In pascuis et ericetis!
β. ericetorum.
1521 sylvestris, Lam. ♃. 4, 5. In sylvis et ad sepes!
1522 lactea, Sm. ♃. 5. In sabuletis Hollandiæ (Dec. Vh!)
β. lancifolia.
1523 montana L 5, 6. In sylvis montosis!

§. 2. Melanium. *Dec.*

1524 rothomagensis, Desf. ♃. 5—9. In collibus!
1525 tricolor, L. ①. 4—10. In cultis et dumetis!
β. parviflora.
γ. sabulosa.

Digitized by Google

1526 arvensis, Murr. ①. 4—8. In arvis arenosis!
1527 intermedia Lej! ♃. 4—8. In pratis siccis Arduennæ!
1528 lutea, Sm. ♃. 5—7. In calaminariis Arduennæ!
α. unicolor.
β. calaminaria.
γ. cærulescens.

Fam. 87. FUMARIACEÆ. *Dec.*

FUMARIA. *Tourn.*

§. 1. Sphærocapnos. *Dec.*

1529 parviflora, Lamk. ①. 6, 7. In agris arenosis!
1530 vaillantii, Lois. ①. 6, 7. cum priori!
1531 officinalis, L. ①. 5—8. In arvis!
1532 media, Lois. ①. 6, 7. In dumetis!
1533 capreolata, L. ①. 6, 7. In cultis Brabantiæ!

§. 2. Platycapnos. *Dec.*

1534 spicata L. ①. 5, 6. In Flandriâ (Hoor!)

CORYDALIS. — Calix per florescentiam persistens. Siliqua bivalvis polysperma. Embryo dicotyleus.

1535 claviculata, Dec. ①. 6—8. In dumetis et sylvis arenosis!
1536 capnoides, Pers. ♃. 4—10. In fissuris murorum!

CAPNITES. — Calix antè florescentiam deciduus. Siliqua bivalvis polysperma. Embryo monocotyleus.

1537 cava = Corydalis, Wahlenb. ♃. 4, 5. In umbr. (Doss!)
β? incisa.
1538 digitata = Corydalis, Pers. ♃. 4, 5. In umbrosis!
β? aquilegifolia.
1539 fabacea = Corydalis, Pers. ♃. 4, 5. In umbrosis dubia civis.

Digitized by Google

Series 1.ª SILICULOSÆ.

Trib. 1. BISCUTELLEÆ.

Silicula valvis carinatis.

BISCUTELLA. *Lin.*

§. 1. JONDRABA, *Dec.*

1540 auriculata, L. ①. 6, 7. In agris Hannoniæ (Detrez. Desm!)

§. 2. BISCUTELLOTYPUS. — Thlaspidium. *Dec.*

1541 varia: caule piloso; foliis velutinis plerumque radicalibus oblongis grandidentatis integris ve; siliculæ glaberrimæ loculis divergentibus. ♃. 5, 6. In rupibus calcareis Ardennæ! — B. lævigata Lej! nec Lin!

α. foliosa.

β. scaposa.

CENEBIERA. *Poir.*

§. 1. CARARA. *Dec.*

1542 Coronopus, Poir. ①. 6—8. In ruderatis!

β. glaucescens.

§. 2. NASTURTIOLUM. *Dec.*

1543 didyma, Pers. ①. 7, 8. In ruderatis (Beyer!)

HUTCHINSIA. *R. Br.*

1544 petræa, R. Br. ①. 3—5. In arenosis apricis (Hoor!)

1545 procumbens, R. Br. ①. 5—6. In ruderatis salsis (Hoor!)

TEESDALIA. *R. Br.*

1546 Iberis, Dec. ①. In arenosis nudis!

γ. integrifolia.

1547 Lepidium, Dec. 2—5. In arenosis apricis (Desm. Hoor!)

IBERIS. *Gærtn.*

1548 pinnata, Gouan. ①. 6, 7. In messibus (Hocq. Hoor!)

1549 amara, L. ①. 6—8. In messibus!

δ. ruficaulis, Lej.

1550 umbellata, L. ①. 6—8. In Hannoniâ (Hocq.)

LEPIDIUM. *R. Br.*

§. 1. CARDARIA, *Dec.*

1551 Draba, L. ♃. 5—8. In liminibus agrorum!

Digitized by Google

§. 2. Lepidiotypus.

1552 latifolium, L! ♃. 6, 7. In pratis succulentis!
1553 graminifolium L! ♃. 6, 10. In ruderatis!

§. Deleptium. *Dec.*

1554 glaucescens: caule erecto; foliis glaucescentibus, inferioribus pinnatifidis, summis integris; siliculis emarginatis pedicello brevioribus. ①. 6—8. Ad vias secus Mosellam!
1555 ruderale, L! ①. 6—8. In ruderatis!

§. 4. Cardamon. *Dec.*

1556 sativum L! ①. 5—8. In ruderatis ex culturâ!

§. 5. Lepia. *Dec.*

1557 campestre, R. Br. ①. 5—8. In agris apricis argillosis!
1558 hirtum, Sm. ②. 5. In agris aridis Bataviæ (Dub.)

CEPSALLA. *Vent.*

1559 Bursa pastoris, Moench. ①. 4—9. In ruderatis!

THLASPI. *Dill.*

§. 1. Pterotropis. *Dec.*

1560 alpestre, L! ♃. In petrosis apricis Arduennæ!
β. glareosum.
γ. calaminare.
1561 montanum, L. ♃. 4, 5. In petrosis montosis Arduennæ (Mich!)
1562 perfoliatum, L! ①. 4, 5. In agris apricis!
1563 alliaceum, L. 5—7. In agris Mosætrajecti (Nyst.)

§. 2. Nomisma. *Dec.*

1564 arvense, L! ①. 4—9. In agris et arvis!

Trib. 2. LUNARIEÆ.

Silicula valvis ecarinatis.

LUNARIA. *Lin.*

1565 biennis, Moench. ②. 5—7. In sylvis montosis (Lej.)
1566 rediviva, L. ♃. 4—7. In sylvis montosis!

BERTEROA. *Dec.*

1567 incana, Dec. ②. 5—10. In apricis arenosis!

ALYSSUM. *Dec.*

§. 1. Lobularia. *Dec.*

1568 maritimum, Lam. ♃. 6—8. In Flandriâ fide Hoor!

Digitized by Google

§. 2. Adyseton. *Dec.*

1569 murale, W. et K. ♃. 6, 7. In apricis Verviæ!
1570 montanum, L. ♃. 4—8. In apricis Flandriæ (Hoor.)
1571 campestre, L. ①. 6. In arenosis (Hoor!)
1572 calicinum, L. ②. 4--6. In apricis lapidosis!
β. simplex.

SUBULARIA. *Lin.*

1573 aquatica, L. ①. 6, 7. In ericetis innundatis Campiniæ (Doss!)

EROPHILA. *Dec.*

1574 verna, Dec. ①. 3--5. In agris et apricis!
1575 boerhaavii = Draba vh! ①. 4. propè Delft (Verm.)

DRABA. *Dec.*

1576 muralis, L. ①. 4, 5. In umbrosis!

COCHLEARIA. *Tourn.*

§. 1. Kernera. *Dec.*

1577 saxatilis, L. ♃. 5--7. In saxosis propè Tornacum (Hocq.)

§. 2. Armoracia. *Dec.*

1578 armoracia, L. ♃. 5--7. Ad fossas in paludibus!

§. 3. Cochleariotypus. — Cochlear. *Dec.*

1579 anglica, L. ①. 5--8. In maritimis Hollandiæ (Gort. Zin.)
1580 batava : caulibus recte assurgentibus, dodrantalibus, aliquandò cubitalibus; foliis oblongis. --Herm. cat. Lugdb p. 165. in udosis propè Katwick. (Herm.) species inquirenda.
1581 officinalis, L! ②. 5, 6. In maritimis cœnosis!
1582 danica, Ll ②. 5--8. In arenosis maritimis!
β. integrifolia.

CAMELINA. *Crantz.*

§. 1. Camelinotypus. — Chamælinum. *Dec.*

1583 sativa, Crantz. ①. 5—7. Inter segetes!
1584 dentata, Pers. ①. 5—7. In agris inter Linum!

§. 2. Pseodulinum.

1585 austriaca, R. Br. ①. 5—7. In fossis (M. et W.)

Digitized by Google

Series. 2.ª SILIQUASTREÆ.

Fructus suturâ longitudinali vel dissepimento centrali destitutus.

Trib. 3. ISATIDEÆ.

Siliquaster valvis carinatis.

MYAGRUM. *Tourn.*

1586 perfoliatum, L. ①. 5.--7. In messibus Arduennæ (Mich!)

ISATIS. *Tourn.*

1587 tinctoria, L. ②. 5, 6. In apricis lapidosis!
β. sativa.
γ. hirsuta.

Trib. 4. BUNIADEÆ.

Siliquaster siliculiformis globosus.

CALEPINA. *Adans.*

1588 cochlearioïdes = Bunias, L. ①. 5--7. In agris (Hoor! Tin!)

NESLIA. *Desv.*

1589 paniculata, Desv. ①. 6--8. In messibus (Beyer!)

BUNIAS.

1590 Erucago, L. ①. 5--7. In agris Flandriæ fide Hoor!
1591 orientalis, L. ♃. 5--7. In graminosis montosis Verviæ!

CRAMBE.

1592 maritima, L. ♃. 5, 6. In maritimis (Rouc. Hoor!)

Trib. 5. RAPHANISTREÆ.

Siliquaster siliquiformis, vel lomentaceus.

RAPISTRUM. *Boerh.*

1593 perenne, Berg. ♃. 7. In maritimis Gelriæ (Gort.)

CAKILE. *Boerh.*

1594 maritima, Scop. ①. 5--9. In arenosis maritimis!

Digitized by Google

RAPHANUS. *Lin.*

§. 1. RAPHANISTRUM. *Tourn.*

1595 Raphanistrum, ①. L. 6, 7. In arvis arenosis!
β. purpurascens.
γ. flavidus.

1596 maritimus, Sm. ①. 5--7. In arenosis maritimis!

§. 2. RAPHANOTYPUS, — Raphanis, *Dec.*

1597 sativus, L. ①. 5, 6. Colitur!

Series. 3.ª SILIQUOSÆ.

Trib. 6. BRASSICEÆ.

Cotyledones conduplicatæ.

BRASSICA. *Moench.*

§. 1. BRASSICOTYPUS. — Brassica. *Dec.*

1598 oleracea, L. ①, ②. 5, 6. In maritimis!
α. capitata.
β. Botrytis.
γ. caulescens.
ο. campestris.
ε. caulo rapa.
ζ. Napo-brassica.

1599 Napus = N. et Rapa L. ①, ②. 5, 6. In agris culta!
α. post solstitium laxè sata! Rapa, Lin.
β. post solstitium densè sata! — Rapum oblongius Dod.
γ. autumno sata! — Napus, Dod.

§. 1. ERUCASTRUM. *Dec.*

1600 Erucastrum, L. ①. 6--8. In ruderatis arenosis (Hoor. Vh.)

1601 ensifera: radice perenni; caule basi fruticuloso foliisque hispidis lyrato-pinnatilobis, segmentis in inferioribus dentatis, in summis linearibus; siliquis rostro ensiformi dispermo vix duplò longioribus. ♃. 5--7. In Arduennâ et Eifliâ!
α. simplex.
β. ramosa.
γ. scaposa.

SINAPIS. *Tourn.*

§. 1. LEUCOSINAPIS. *Dec.*

1602 alba, L. ①. 6--8. In agris et ruderatis!

Digitized by Google

§. 2. Hirschfeldia. *Dec.*

1603 incana, L. ②. 6--8. In rupestribus Verviæ!

§. 3. Cerato sinapis. *Dec.*

1604 arvensis, L. ①. 6--10. In agris et arvis!
1605 orientalis, L. ①. 6--8. In agris et arvis!

§. 4. Melanosinapis. *Dec.*

1606 nigra, L. ①. 5, 6. In æstuariis!
β. prasina.

DIPLOTAXIS. *Dec.*

1607 tenuifolia, Dec. ♃. 6--10. In muris et ruderatis!
1608 muralis, Dec. ② 6--9. In ruderatis et muris!
1609 viminea, Dec. ①. 5, 6. In muris (Lest. Olis.)
1610 erucoïdes, Dec. 6. In Flandriâ fide Hoor. dub. civ.

MORICANDIA. *Dec.*

1611 arvensis, Dec. ②. 6. In arvis (Kx. Dek.)

Trib. 7. Erysimeæ.

Cotyledones planæ. Siliqua valvis carinatis vel angulatis.

CONRINGIA. *Link.*

1612 orientalis = Brassica L. ①. 5, 6. In agris Luxemburgii.
1613 alpina, Link. ♃. 6--8. In agro Numurcensi.

CHEIRANTHUS. *R. Br.*

1614 Cheiri, L. ♄. 5, In muris et rupibus!
β. fruticulosus.

CHEIRINIA. *Link.*

1615 Cheiranthoïdes, Lk. ①. 6--9. In agris argilla ceis!
1616 suffruticosa, Lk. ♄. 4--7. In agro Verviensi (Lej!)
1617 altissima, Lk. ②. 6, 7. In agro Verviensi (Lej!)
1618 hieracifolia, Lk. ②. 5, 6. In collibus lapidosis!
1619 erysimoïdes = Cheiranthus L. ①. 6--9. In agris (Hec!)

BARBAREA. *R. Br.*

1620 præcox, R. Br. ②. 4--10. In pascuis argillosis humidis!
1621 acuata, Rchb. ♃. 5--7. In pratis humidis!
1622 vulgaris, Rchb. ♃. 5--8. In pascuis humidis!

Digitized by Google

ERYSIMUM. *Link.*

§. 1. VELARUM. *Dec.*

1623 officinale, L. ①. 5—10. In ruderatis!

§. 2. KIBERA. *Dec.*

1624 supinum, Lk. ①. 6, 7. In arenosis humidis (Dumoul! Mich!)

ALLIARIA. *Adans.*

1625 officinalis, Andrz. ②. 5--7. Ad sepes!

HESPERIS. *Lin.*

1626 matronalis, L. ♃. 5, 6. In dumetis humidis!
β. inodora.

Trib. 7. CARDAMINEÆ.

Cotyledones planæ. Siliqua valvis ecarinatis.

MATHIOLA. *R. Br.*

1627 fenestralis, R. Br. ②. In Flandriâ fide Edw. dub. civ.

MALCOMIA. *R. Br.*

1628 maritima, R. Br. ①. 5, 6. In arenosis spontè (Hoor! Tin!)

NASTURTIUM. *R. Br.*

§. 1. CARDAMINDUM. *Dec.*

1629 officinale, R. Br. ♃. 5--8. In fontibus et aquis vivis!
α. platyphylluu.
β. microphyllum.

§. 2. BRACHYLOBOS. *Dec.*

1630 amphibium, R. Br. ♃. 6--8. In paludosis!
α. indivisum.
β. varii folium.
1631 anceps, Rchb. ♃. 6—9. Ad ripas Rheni (Boen.)
1632 palustre, Dec. ①. 6--9 In paludibus et fossis!
1633 sylvestre, R. Br. ♃. 6—9. In ruderatis humidis!

SISYMBRIUM. *Link.*

§. 1. IRIO. *Dec.*

1634 Sophia, L. ①. 6--8. In ruderatis et agris arenosis!
1635 obtus angulum, Schl. ②. 5—8. In ruderatis arenosis!
β? nasturtiifolium.

Digitized by Google

1636 columnæ, Jacq. ①. 5—9. In arce Franchimont (Lej!)
1637 Irio, L. ①. 7, 8. In ruderatis (Lej!)
1638 austriacum, Jacq. ②. 5, 6. In ruderatis circà Spa (Lej.)
1639 multisiliquosum, Hoffm. ②. 5, 6. In ruderatis agri Namurcensis!
1640 acutangulum, Dec. ②. 6—8. In ruderatis (Lej!)

§. 2. NORTHA. *Dec.*

1641 strictissimum. L. ♃. 5—8. In montosis propè Aquisgranum (Lej!)

TURRITIS. *Dill.*

1642 glabra, L. ②. 5, 6. In apricis arenosis!

ARABIS. *Lin.*

§. 1. LOMASPORA. *Dec.*

1643 turrita, L. ②. 5, 6. In agro Verviensi (Lej!)

§. 2. ALOMATIUM. *Dec.*

1644 hirta, Scop. ♃. 5—7. In apricis et muris!
1645 sagittata, Dec. ♃. 5—7. In apricis et muris!
1646 auriculata, Lam. ①. 5, 6. In rupibus Verviæ (Lej!)
1647 thaliana, L. ①. 4—9. In agris præcipuè arenosis!
1648 arenosa, Scop. ②. 5—7. In rupibus transmosanis!
β. lanceæfolia.

CARDAMINE. *Dec.*

1649 impatiens, L. ①. 5, 6. In umbrosis sylvaticis!
1650 parviflora, L. ①. 4, 5. In herbosis humidis (Gort. Hocq.) d. c.
1651 sylvatica, Link. ①. 4, 5. In sylvis (Lej!)
1652 hirsuta, L. ①. 4, 5. Ad margines fossarum!
1653 pratensis, L. ♃. 4, 5. In pratis et pascuis!
β. latifolia.
γ. nemorosa.
1654 Libertiana, Lej. ♃. 4, 5. In umbrosis propè Malmedy (D. a Lib!)
1655 amara, L. ♃. 4, 5. In umbrosis, ad rivulos!

DENTARIA. *Tourn.*

1656 bulbifera, L. ♃. 5. In sylvis montosis (Lej!)

Fam. 89. BERBERIDEÆ.

Trib. 1. EPIMEDIEÆ.

Semina parietalia ascendentia.

EPIMEDIUM. *Lin.*

1657 alpinum, L. ♃. 4, 5. In subalpinis Luxemburgii (March!)

Digitized by Google

Trib. 2. BERBEREÆ.

Semina centralia erecta.

BERBERIS. *Lin.*

1658 vulgaris, L. ♄. 5, 6. In frutetis calcareis!

Fam. 90. RANUNCULACEÆ. *Juss.*

Trib. 1. PÆONIEÆ.

ACTÆA. *Lin.*

1659 spicata, L. ♃. In sylvis Arduennæ!

Trib. 2. CLEMATIDEÆ. *Dec.*

CLEMATIS. *Mill.*

§. 1. FLAMMULA. *Dec.*

1660 erecta, L. ♃. 6—8. In apricis propè Habay. (Tin!)
1661 vitalba, L. ♄. 7—9. In dumetis calcareis!

§. 2. VITICELLA. *Dill.*

1662 viticella, L. ♄. 6—8. In dumetis circà Maaseyck. (Dreiss!)

Trib. 3. ANEMONEÆ. *Dec.*

THALICTRUM. *Lin.*

§. 1. TRIPTERIUM. *Dec.*

1663 aquilegifolium, L! ♃. 7, 8. In sylvis montosis (Kx!)

§. 2. THALICTROTYPUS. — Thalictrum, *Dec.*

a. Achænia erecta tetragona.

1664 nigricans, Jacq. ♃. 6, 7. In pratis humidis!
1665 flavum, L. ♃. 6, 7. In pratis humidis.
β. pauperculum.
γ. vaginatum.
1666 lucidum, L. ♃. 8. In Flandriâ occ. fide Edw.
1667 galioïdes, Nestl. ♃. 7, 8. In agris Leod. (Doss. teste Court.)

b. achænia divergentia compressa.

1668 elatum, Murr. ♃. 6, 7. In pratis secus Mosellam.
1669 dunense : caule flexuoso ramis divaricatis; foliis pubescenti-glandulosis; foliolis rotundatis dentatis infernè cinereis; achæniis compressis divergentibus. ♃. 6, 7. In arenosis maritimis!
1670 foetidum, L. ♃. 6, 7. In arenosis Hollandiæ (Gort. Schull.) d. c.

Digitized by Google

ANEMONE. *Hall.*

§. 1. PULSATILLA. *Dec.*

1671 pulsatilla, L! ♃. 4, 5. In collibus apricis!
1672 pratensis, L! ♃. 4, 5. In Eifliâ (Lej!)

§. 2. ANEMONOTYPUS = Anemonanthea, *Dec.*

1673 apennina, L! ♃. 4. In humidis Brab. (Olis!) Ultraj. (Bergsm!)
1674 nemorosa, L! ♃. 3--5. In umbrosis!
β. cærulea.
1675 trifolia, L! ♃. 4, 5. In nemorosis fide Rouc.
1676 ranunculoides, L! ♃. 4, 5. In umbrosis calcareis!
1677 sylvestris, L! ♃. 5, 6. In sylvis montosis. (Kx! Decl! etc.)

HEPATICA. *Dill.*

1678 triloba, Chaix ♃. 2--4. In sylvaticis calcareis (Lej!)

ADONIS. *Dill.*

§. 1. CONSOLIGO. *Dec.*

1679 vernalis, L. ♃. 4, 5. propè Namurcum (Héc!)

§. 2. ADONIDOTYPUS. = Adonia. *Dec.*

1680 flava, Dec. ①. 6--8. In agris Luxemburgii!
β. cinnabrina.
1681 æstivalis, L. ①. 6, 7. In agris (Gort. Rouc.) d. c.
1682 autumnalis, L. ①. 6--8. In agris (Lej. Hocq. Nyst.)

Trib. 4. RANUNCULEÆ. *Dec.*

MYOSURUS. *Lin.*

1683 minimus, L. ①. 4--6. In agris humidiusculis!

BATRACHIUM. — Ranunculi sect. 1. *Dec. Syst.*

1684 hederaceum. ♃. 4--8. In innundatis!
1685 tripartitum, ♃. 5--7. In Campiniâ (Lej. et Court.)
α. micranthon.
β. obtusiflorum.
1686 aquatile, ♃. 5--7. In fossis et stagnis!
β. peltatum.
γ. capillaceum.
1687 rigidum. ♃. 6--8. In piscinis et fossis!
1688 peucedanifolium, ♃. 5--7. In fluviis!

Digitized by Google

RANUNCULUS. — Ranuncul. sect. 2. *Dec Syst.*

§. 1. Hecatonia. *Dec.*

a. floribus albis.

1689 aconitifolius, L. ♃. 5, 6. In montibus Arduennæ!

β. intermedius.

γ. platanifolius.

b. floribus flavis; foliis indivisis.

1690 gramineus, L. ♃. 5. In Hannoniâ (Desm!)

1691 Lingua, L. ♃. 6--8. In fossis turfosis!

1692 Flammula, L. ♃. 6--8. In paludosis!

β. serrata.

γ. reptans.

1693 nodiflorus, L. ①. 5, 6. In humidis Flandriæ teste Hoor!

c. floribus flavis; foliis divisis.

1694 auricomus, L! ♃. 3--5. In pratis humidiusculis!

1695 sceleratus, L! ♃. ①. 5--7. In fossis!

1696 acris, L! ♃. 5--7. In pratis frequens!

β. sylvaticus.

1697 major: hirsutus; caule paniculato multifloro; foliis caulinis trifoliolatis, foliolis incisis grandidentatis, summis lanceolato-linearibus; pedunculis teretibus; archæniis uncinatis. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!

1698 polyanthemos, L! ♃. 6, 7. In pratis montosis!

1699 nemorosus, Dec. ♃. 5--7. In sylvis montosis!

β. saniculæfolius.

1700 lanuginosus, L. ♃. 6--8. In sylvis montosis!

β. geraniifolius.

1701 repens, L. ♃. 5--8. In pratis, sylvaticis et agris!

β. erectus.

γ. lucidus.

1702 bulbosus, L. ♃. 5--7. In pascuis siccis!

§. 2. Echinella. *Dec.*

1703 Philonotis, Ehrh. ②. 5--7. In pascuis et agris humidis!

β. intermedius.

γ. parvulus.

1704 arvensis, L! ①. 5--7. In messibus!

1705 muricatus, L! ①. 5--7. In Bataviâ (Meese. Colitzi) d. c.

1706 parviflorus, L! ②. 5--7. In umbrosis humidis (Desm! Tin!)

§. 3. Ranunculotypus. — Ranunculastrum. *Dec.*

1707 chærophyllos, L. ♃. 5. In siccis Flandriæ fide Hoorebeke!

FICARIA. *Dill.*

1708 ranunculoïdes, Mœnch. ♃. 3--5. In humidiusculis argillosis!

Digitized by Google

Trib. 5. HELLEBOREÆ. *Dec.*

CALTHA. *Lin.*

1709 palustris, L. ♃. 5, 6. In pratis humidis!
β. minor.

TROLLIUS. *Lin.*

1710 europæus, L. ♃. 5. In pratis montosis (Lej!)

ERANTHIS. *Salisb.*

1711 hyemalis, Salisb. ♃. 2, 3. In umbrosis (Decl!)

HELLEBORUS. *Adans.*

§. 1. Helleborotypus. — Calix rotatus.

1712 niger, L. ♃. 1, 2. In sylvaticis (Kx! March!)
1713 viridis, L. ♃. 3—5. In sylvaticis!

§. 2. Aphodilla. — Calix campanulatus.

1714 fetidus, L. ♃. 2—5. In pascuis glareosis!

ISOPYRUM. *Lin.*

1715 fumarioides, L. ①. 6, 7. In Flandriâ fide Hoorebeke! d. c.

NIGELLA. *Lin.*

§. 1. Nigellotypus. — Nigellaria. *Dec.*

1716 arvensis, L. ①. 7—9. In arvis (Tin!)
1717 agrestis, Presl. ①. 7—9. In arvis (Hec!)
1718 sativa, L. ①. 6—8. In arvis Luxemburgii (Tin!)

§. 2. Erobatos. *Dec.*

1719 damascena, L. ①. 7, 8. In agris interdum aufuga!

AQUILEGIA. *Lin.*

1720 vulgaris, L. ♃. 5, 6. In frutetis calcareis!

DELPHINIUM. *Lin.*

1721 ajacis, L. ①. 7. In incultis (Tin! Lej.)
1722 Consolida, L. ①. 6, 7. In messibus, solo argilloso-calcareo!

ACONITUM. *Tourn.*

§. 1. Lycoctonum. *Dec.*

1723 Lycoctonum, L. ♃. 6—8. In sylvis montosis calcareis!

§. 2. Aconitotypus. — Galea convexa. Sepala decidua.

1724 intermedium, Dec. ♃. 6—8. In paludibus. (Tin! Lej!)

Digitized by Google

1725 strictum, Bernh. ♃. 7, 8. In umbrosis humidis Efliæ frequens!
β. bulbiferum.
γ. latilobum.
1726 Napellus, L. ♃. 7, 8. In sylvis subalpinis (Lej!)

Fam. 91. PAPAVERACEÆ. *Dec.*

Trib. 1. HYPECOEÆ.

Stamina determinata. Siliquaster articulatus.

HYPECOUM. *Tourn.*

1727 procumbens, L. ①. 6, 7. In agris sabulosis Flandriæ (Hoor!) d. c.

Trib. 2. CHELIDONIEÆ.

Stamina indeterminata. Fructus siliquosus.

CHELIDONIUM. *Gærtn.*

1728 majus, Mill. ♃. 4—10. Ad sepes umbrosas!
1729 laciniatum, Mill. ♃. 4—10. Ad sepes rarius!

GLAUCIUM. *Gærtn.*

1730 luteum, Scop. 4—8. In maritimis Flandriæ!

Trib. 3. PAPAVEREÆ.

Stamina indeterminata. Fructus capsularis.

PAPAVER. *Tourn.*

§. 1. RHOEAGRIA. — Capsulæ echinatæ.

1731 hybridum, L. ①. 6—8. In arvis!
1732 Argemone, L. ①. 6—8. In agris!

§. 2. RHOEAS. — Capsulæ glabræ.

1733 dubium, L. ①. 6—8. In arvis!
1734 Rhoeas, L. ①. 6—9. In agris frequens!
α. ovale.
β. globosum.
1735 somniferum, L. ①. 6, 7. In agris interdùm spontaneum!
1736 indehiscens: capsulis glaberrimis globosis, per maturitatem indehiscentibus. ①. 6, 7. In agris colitur.

Digitized by Google

Subclassis 2.ª DECORTICALIA, s. VAGIFIBRIA.

Divisio 1.a BITEGMIA.

Ordo 9. THALAMIFLORIA.

Fam. 92. NYMPHÆACEÆ. *Salisb.*

NUPHAR. *Sm.*

1737 lutea, Sm. ♃. 6, 7. In stagnis frequens!
1738 minor : petiolo ancipiti; calice pentasepalo; petalis sub 12; antherarum apiculo truncato; stigmate orbiculari integro 12 radiato. ♃. In Mosâ (Dreiss!)

NYMPHÆA. *Sm.*

1739 alba, Lin. 2. 6—8. In fossis et fluminibus!
β. minor.

Fam. 93. PARIDEÆ. — Melanojæ. *Batsch.*

PARIS. *Lin.*

1740 quadrifolia, L. ♃. 4, 5. In umbrosis, solo argilloso!

Ordo 10. FRUCTIFLORIA.

Fam. 94. ORCHIDEÆ. *Lin.*

SERIES 1.a ELATOSORCHÆ.

Antheræ elasticæ.

Trib. 1. OPHRYDEÆ. *Lindl.*

SERAPIAS. *Sw.*

1741 lingua, L. ♃. 5, 6. In Flandriâ fide Hoor!

Digitized by Google

LOROGLOSSUM. *Rich.*

§. 1. ACERAS. *R. Br.*

1742 antropophorum, Rich. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!

§. 2. LOROGLOSSOTYPUS. — Petalum scrotiforme.

1743 hircinum, Rich. ♃. 5—7. In sylvis montosis (March!)

ANACAMPTIS. *Rich.*

1744 pyramidalis, Rich. ♃. 5—7. In umbrosis calcareis!

ORCHIS *Rich.*

§. 1. SALEPIA. — Calcar descendens.

1745 globosa, L. ♃. 6, 7. In pratis Brabantiæ (Kickx.)
1746 variegata, Jacq. ♃. 4, 5. In agro Leodiensi (Doss. Closs.)
1747 militaris, L. ♃. 5, 6. In sylvaticis montosis (Dumoul!)
β? nervata, March.
1748 fusca, Jacq. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!
1749 galeata, Lam. ♃. 5, 6. In Flandriâ (Hoor!)
1750 Simia, Lam. ♃. 5, 6. In sylvis (Dek. Hoor!)
1751 ustulata, L. ♃. 5, 6. In pascuis siccis!
1752 coriophora, L. ♃. 5, 6. In pratis humidis!

§. 2. MORIO. — Calcar adscendens.

1753 pallens, L. ♃, 5, 6. In sylvis montosis (Hoor! Tin.)
1754 laxiflora, Lam. ♃. 4, 5. In pratis humidis (Hoor! Hocq.)
1755 palustris, Jacq. ♃. 4, 5. In palustribus (M. et W.)
1756 mascula, L. ♃. 4—6. In umbrosis!
1757 Morio, L. ♃. 4—6. In pratis humidiusculis!
β? athensis.

§. 3. HURAGRIA. — Radices palmati.

1758 sambucina, L. ♃. 5, 6. In Luxemburgio (March.)
1759 incarnata, L. ♃. 5, 6. In sylvis montosis (March! Tin!)
1760 latifolia, L. ♃. 5—7. In pratis humidis!
β. angustifolia.
γ. hocquartiana = Satyrium maculatum, Hocq.
1761 maculata, L. ♃. 6—8. In pratis et sylvaticis.

OPHRYS. *R. Br.*

1762 myoides, Jacq. ♃. 5, 6. In sylvaticis calcareis!
1763 insectifera, L. ♃. 5, 6. In sylvis montosis calcareis
α. apifera.
β. apiculata.
γ. aranifera.
δ. arachnites.

Digitized by Google

GYMNADENIA. *R. Br.*

1764 conopsea, R. Br. ♃. 5—7. In sylvis et paludibus!
α. albicans.
β. montana.
γ. paludosa.
1765 odoratissima, Rich. ♃. 4. In pascuis montosis (Olis! Hoor!)

PLATANTHERA. *Rich.*

1766 bifolia, Rich. ♃. 5—7. In sylvaticis!
β. montana.
γ. virens.

CHAMORCHIS. — C. et Gymnadeniæ § 2. *Rich.*

1767 albida = Satyrium, L. ♃. 5, 6. In pratis montosis (Lej. Dreiss!)
1768 viridis = Satyrium, L. ♃. 6, 7. In pratis humidis!

HERMINIUM. *R. Br.*

1769 monorchis, R. Br. ♃. 6, 7. In graminosis!

Trib. 2. GASTRODIEÆ.

Anthera bilocularis loculis sessilibus muticis.

EPIPOGUM. *Gmel.*

1770 gmelini, Rich. ♃. 7, 8. In faginetis vallis Rhenanæ (M. et W.)

GOODYERA. *R. Br.*

1771 repens, R. Br. ♃. 7, 8. In sylvis et pinetis muscosis fide Nyst. d. c.

Series 2.ª CHONDROSORCHÆ.

Pollen granulosum.

Trib. 3. NEOTTIEÆ. *Lindl.*

NEOTTIA. *Dod.*

1772 nidus avis, Rich. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!

LISTERA. *R. Br.*

1773 ovata, R. Br. ♃. 5, 6. In sylvaticis argillaceis!

Digitized by Google

1774 cordata, R. Br. ♃. 6, 7. In umbrosis montosis (Desm! Hoor!)

GYROSTACHYS. *Pers.*

1775 æstivalis = Ophrys, Lam. ♃. 7, 8. In pratis humidis Campiniæ (Lej.)
1776 autumnalis = Ophrys, Balb. ♃. 8, 9. In pascuis siccis (Hoor!) Dijon!)

Trib. 4. ARETUSEÆ. *Lindl.*

LIMODORUM. *Tourn.*

1777 abortivum, Sw. ♃. 6, 7. In umbrosis montosis (Tin!)

CEPHALANTHERA. *Rich.*

1778 ensifolia, Rich. ♃. 6, 7. In umbosis montosis!
1779 lancifolia = Serapias, Murr. ♃. 6, 7. In umbrosis montosis!
1780 rubra, Rich. ♃. 6, 7. In umbrosis montosis (March!)

EPIPACTIS. *Rich.*

1781 Latifolia, Sw. ♃. 6, 7. In sylvaticis!
1782 microphylla, Sw. ♃. 7, 8. In faginetis!
1783 palustris, Sw. ♃. 6, 7. In pascuis uliginosis!

Trib. 5. CYPRIPEDIEÆ. *Lindl.*

CYPRIPEDIUM. *R. Br.*

1784 Calceolus, L. ♃. 5, 6. In sylvis Luxemburgii (Tin!)

Series. 3. CEROSORCHÆ.

Orchia cereacea.

Trib. 6. MALAXIDEÆ. *Lindl.*

MALAXIS. *Sw.*

1785 paludosa, Sw. ♃. 7, 8. In turfosis Arduennæ (D.ª Libert!)

PALIRIS. = Liparis. *Rich.*

1786 loeselii = Liparis Rich. ♃. 7, 8. In paludibus turfosis!
α. pentagona.
β. trigona.

Digitized by Google

Ordo. 11. CALICIFLORIA.

Fam. 95. HYDROCHARIDEÆ. *Dec.*

Trib. 1. STRATIOTEÆ.

Fructus sexlocularis.

STRATIOTES. *Lin.*

1787 aloides, L. ♃. 6—8. In fossis arenoso-lutosis!
β. multiflora.

HYDROCHARIS. *Lin.*

1788 morsus ranæ, L. ♃, 7, 8. In fossis frequens!

Trib. 2. VALLISNERIEÆ.

Fructus unilocularis.

VALLISNERIA. *Lin.*

1789 spiralis, L. ♃. 7, 8. In Hollandiâ (Lin.) Dub. civ.

Fam. 96. ALISMACEÆ. *Vent.*

Trib. 1. SAGITTARIEÆ.

Flores monoici. Stamina indefinita.

SAGITTARIA. *Lin.*

1790 sagittifolia, L. ♃. 6, 7. In fossis paludosis!
β. minor, Lob.

Trib. 2. ALISMEÆ.

Flores hermaphroditi. Stamina definita.

ALISMA. *Juss.*

1791 Plantago, L. ♃. 6—8. In fossis et paludosis!
β. lanceolatum.
γ. gramineum, Hocq.
δ. fluitans.

Digitized by Google

1792 natans, L. ♃. 6—8. In rivulis!
α. homophyllum.
β. heterophyllum.
1793 ranunculoides, L. ♃. 6—8. In paludosis turfosis!

DAMASONIUM. *Juss.*

stellatum, Pers. ♃. 5—8. In fossis Flandriæ (Hoor!)

Trib. 3. BUTOMEÆ. *Rich.*

BUTOMUS. *Tourn.*

1794 umbellatus, L. ♃. 6—8. In fossis limosis!

Divisio. 2.ª SOLITEGMIA.

Ordo. 12. FRUCTAULIA.

Fam. 97. NARCISSEÆ. *Batsch.*

NARCISSUS. *Lin.*

§. 1. Narcissotypus. — Narcissus. *Salisb.*
1795 poeticus, L. ♃. 4, 5. In pratis et pomariis (Lej. Belv!)
§. 2. Ajax. *Salisb.*
1796 pseudonarcissus, L. ♃. 4, 5. In sylvis calcareis!

Fam. 98. LEUCOIDEÆ. *Batsch.*

GALANTHUS. *Lin.*

1797 nivalis, L. ♃. 3, 4. In pratis montosis!

LEUCOIUM. *Lin.*

1798 vernum, L. ♃. 3, 4. In pascuis montosis!
1799 æstivum, L. ♃. 5. In sylvis paludosis Hollandiæ!

Digitized by Google

Trib. 1. MARICEÆ.

Corolla inæqualis, laciniis alternis minoribus.

IRIS. *Lin.*

§. 1. Pogoniris. — Petala inf. barbata.

1800 pumila, L. ♃. 4, 5. In rupibus et muris!
1801 pallida, Lam. ♃. 5. In muris antiquis!
1802 germanica, L. ♃. 5, 6. In rupibus et muris!
1803 sambucina, L. ♃. 5, 6. In rupibus schistosis (Lej.)
1804 variegata, Lin. ♃. 5, 6. In muris antiquis propè Huy (Dijon!)

§. 2. Iridotypus. — Petala inf. glabra.

1805 pseudacorus, L. ♃. 5. In fossis et ad ripas frequens!
1806 sibirica, L. ♃. 5—6. In pratis et sylvis Arduennæ (Lej.)
1807 graminea, L. ♃. 5, 6. In pratis Arduennæ.
1808 foetidissima, L. ♃. 5, 6. In nemorosis!

Trib. 2. GLADIOLEÆ.

Corolla ringens.

GLADIOLUS.

1809 segetalis, Ker. ♃. 5, 6. In agris inter segetes!

Trib. 3. IXIEÆ.

Corolla regularis æqualis.

CROCUS. *Tourn.*

1810 vernus, All. ♃. 3, 4. In pratis propè Leodium (Girard!)
β? flore albo. Propè Breda (Kuyper.)

Fam. 100. DIOSCORIDEÆ. — Dioscoreæ. *R. Br.*

TAMUS. *Lin.*

1811 communis L. ♃. 5, 6. In sylvaticis!

Digitized by Google

Ordo. 13. THALAMAULIA.

Subordo. 1. Lilifloria.

Fam. 79. ASPARAGINEÆ. *Juss.*

Trib. 1. ASPARAGEÆ.

Perigonium partitum.

MAYANTHEMUM. *Wigg.*

1812 bifolium, Dec. ♃. 5, 6. In sylvis umbrosis!

RUSCUS. *Tourn.*

1813 aculeatus, L. ♃. 3, 4. In sylvis (Rouc! Hocq.)

ASPARAGUS. *Tourn.*

1814 officinalis, L. ♃. 6—8. In arenosis maritimis!
1815 prostratus : caule herbaceo geniculato arctè humifuso; foliis fasciculatis linearibus; pedunculis geminatis divergentibus apice articulatis, corollâ longioribus. ♃. 6—8. In maritimis Flandriæ et Hollandiæ!

Trib. 2. CONVALLARIEÆ.

Perigonium dentatum.

POLYGONATUM. *Tourn.*

1816 verticillatum, Mœnch. ♃. 5, 6. In umbrosis alpestribus!
1817 multiflorum, Mœnch. ♃. 5, 6. In umbrosis!
1818 intermedium : caule anguloso solido; pedunculis paucifloris; filamentis decurrentibus glabris. ♃. 5, 6. In sylvis!
1819 anceps, Mœnch. ♃. 4, 5. In umbrosis et arenosis!
β. odoratum.

CONVALLARIA. *Tourn.*

1820 maialis, L. ♃. 4, 5. In umbrosis!
β. ensifolia.

Digitized by Google

HEMEROCALLIS. *Lin.*

1821 fulva, L. ♃. 6—8. Ad ripas Fl. Alsette (March.)

Fam. 103. LILIACEÆ. *Juss.*

LILIUM. *Tourn.*

1822 croceum, Desf. ♃. 6. Inter segetes propè Orcq!
1823 bulbiferum, L. ♃. 6. In monte Trinitatis fide Desmaz.

FRITILLARIA. *Lin.*

1824 Meleagris, L. ♃. 3, 4. In pascuis (Kx! Lech! Vh!)
β. albiflos.

TULIPA. *Tourn.*

1825 sylvestris, L. ♃. 4, 5. in agris et pratis!
β. diantha.
1826 gessneriana, L. ♃. 5. In agris Tornaci!

Fam. 104. ASPHODELEÆ. *Juss.*

Trib. 1. ALLIEÆ.

Perigonium partitum.

PHALANGIUM. *Tourn.*

1827 Liliago, Schreb. 6, 7. In nemorosis montosis!
1826 ramosum, Lam. ♃, 5, 6. In montosis apricis!

ORNITHOGALUM. *Salisb.*

§. 1. ORNITHOGALOTYPUS. Stamina æqualia.

1829 pyrenaicum, L! ♃. 6, 7. In pratis Arduennæ!
1830 umbellatum, L! ♃. 5, 6. In agris et pratis!

§. 2. RAPHELINGIA. Stamina alternè dilatata.

1831 nutans, L! ♃. 5. In pratis (Hoor! Dreiss!)

GAGEA. *Salisb.*

1832 belgica = Ornithogalum, Lej! ♃. 4, 5. In sylvis Hannoniæ (Floris!)

Digitized by Google

1833 pratensis = Ornithogalum, Pers. ♃. 4. In agris sabulosis (Gort. ex Vh.)
1834 lutea, Ker. ♃. 3, 4. In sylvis!
1835 arvensis = Ornithogalum, Pers. ♃. 4. In agris arenosis!
β. acaulis.
γ. bulbifera.
1836 minima = Ornithogalum, L. ♃. 4. In agris (Dek.)

ALLIUM. *Lin.*

§. 1. Alliotypus. — Filamenta alternè furcata.

a. Scorodoprasum — Foliis planis.

1837 Porrum, L. ♃. 6, 7. In agris olitoriis colitur!
1838 sativum, L. ♃. 6, 7. In olitoriis colitur!
1839 Scorodoprasum, L. ♃. 7, 6. In pratis montosis!
1848 rotundum, L. ♃. 6, 7. In vineis ad ripas Mosellæ!

b. Cepa — Foliis fistulosis.

1841 sphærocephalum, L. ♃. 6—8. In rupibus calcareis!
1842 vineale, L. ♃. 6, 7. Inter segetes!
β. compactum.
1843 ascalonitum, L. ♃. 6—8. In olitoriis colitur!
1844 Cepa, L. ♃. 6—8. In olitoriis colitur!

§. 2. Schœnoprasum. Fil. simplicia.

a. Euschoenoprasum. Foliis fistulosis.

1845 Schœnoprasum, L. ♃. 6, 7. In rupestribus vallis Mosellæ!
β. foliosum.
1846 oleraceum, L. ♃. 7, 8. In graminosis siccis.
1847 flavum, L. ♃. 7, 8. In umbrosis (Rouc. Edw. Hoor)

b. Moly. Foliis planis.

1848 carinatum, L. ♃. 6—8. In versuris et agris!
1849 Moly, L. ♃. 6. In umbrosis (Héc!)
1850 ursinum, L. ♃. 5, 6. In umbrosis calcareis!

SCILLA. *Lin.*

1851 autumnalis, L. ♃. 9, 10. In Flandriâ (Hoor!)
1852 bifolia, L. ♃. 3, 4. In Luxemburgio (March! Tin! Cromb!)

ENDYMION. — Perigonium sexpartitum campanulatum, segmentis conniventibus. Rel. Scillæ.

1853 nutans = Scilla, Sm. ♃. 5, In umbrosis copiosè!
1854 cernuus = Hyacinthus, L. ♃. 5. In sylvis (Hoor.)
1855 patulus = Hyacinthus, Desf. ♃. 5. In umbrosis!

Digitized by Google

Trib. 2. HYACINTHEÆ.

Perigonium dentatum.

MUSCARI. *Tourn.*

1856 racemosum, Mill. ♃. 4, 5. In agris (Desm!)
1857 botryoides, Mill. ♃. 4, 5. In agris (Decl! Hoor!)
1858 ambrosiaceum, Mœnch. ♃. In Flandriâ fide Hoor.
1859 comosum, Mill ♃. 5, 6. In agris inter segetes!
1860 monstruosum, ♃. 5, 6. In Flandriâ fide Hoor!

Fam. 105. COLCHICEÆ. *Batsch.*

COLCHICUM. *Tourn.*

1861 autumnale, L. ♃. 9, 10. In pratis et montosis!
β. vernum.
1862 montanum, L. ♃. 9, 10. Propè Malmundarium (D.ª Libert.)

Fam. 106. MELANTHIDEÆ. — Melanthia. *Bastch.*

VERATRUM. *Tourn.*

1863 album, L. ♃. 6. In Arduennâ (Wolf. Lej!) Eifliâ. (M. et W.)

Fam. 107. TRIGLOCHINEÆ. — Juncagineæ. *Rich.*

SCHEUCHZERIA. *Lin.*

1864 palustris, L. ♃. 5, 6. Paludosis turfosis Gelriæ (Broers. Beyer!)

TRIGLOCHIN *Lin.*

§. 1. TRIGLOCHOTYPUS. — Glandarium 3 partibile.
1865 palustre, L. ♃. 6—8. In uliginosis!
β. robustum.

§. 2. HEXAGLOCHIN. — Glandarium 6 partibile.
1866 maritimum, L. ♃. 6—8. In uliginosis maritimis!

Digitized by Google

ABAMA. *Adans.*

1867 ossifraga, Dec. ♃. 7, 8. In ericetis turfosis!

LUZULA. *Dec.*

1868 albida, Dec. ♃. 6, 7. In sylvis montosis!
1869 maxima, Dec. ♃. 5, 6. In sylvis montosis!
1870 vernalis, Dec. ♃. 3, 4. In sylvaticis!
1871 campestris, Dec. ♃. 5, 6. In pascuis arenosis!
1872 congesta, Lej! ♃. 6—8. In sylvaticis montosis!
1873 sudetica, Dec. ♃. 6, 7. In pascuis humidis subalpinis!
1874 multiflora, Lej! ♃. 6—8. In sylvis turfosis!

JUNCUS. *Mich.*

§. 1. Ozophyllum. Capsula semitrilocularis. dissepimenta valvis breviora.

1875 obtusiflorus, Ehrh! ♃. 6, 7. In fossis Belgii littoralis!
1876 sylvaticus, Roth. ♃. 6—8. In sylvaticis humidis!
1877 acutiflorus, Ehrh. ♃. 6—8. In paludosis Luxemburgii. (Tin!)
1878 lampocarpus, Ehrh! ♃. 6—8. In pratis argillosis!
1879 fusco ater, Schreb. ♃. 6, 7. In maritimis!
1880 uliginosus, Roth. ♃. 7—9. In uliginosis turfosis!
β. supinus.
γ. stoloniferus.
δ. fluitans.

§ 2. Tenageia. Capsula semitrilocularis. dissepimenta valvarum longitudine.

1881 ericetorum, Poll. ①. 6, 7. In ericetis humidis (Mich! Geuns! Tin!)
1882 pigmeus, Thuil. ①. 6—8. In uliginosis (Hoor! Hocq.)
1883 Tenageia, Ehrh! ①. 6—8. In ericetis turfosis!
1884 bufonius, L. ①. 6—8. In arvis et pascuis humidis!
β. rosulatus.
1885 tenuis, Willd. ♃. 5, 6. In umbrosis Campiniæ occident!
1886 gramineus = bulbosus, L! ♃. 6, 7. In pratis et pascuis!
α. compressus.
β. cœnosus.
1887 squarrosus, L! ♃. 6—8. In ericetis turfosis!

§. 3. Marsippospermum. *Desv.*

1888 maritimus, Lam. ♃. 7, 8. In pratis maritimis!

§. 4. Juncotypus. — Capsula omninò trilocularis.

1889 effusus, L! ♃. 6, 7. In pratis et sylvaticis!
β. compactus.
1890 conglomeratus, L. ♃. 6, 7. In pratis et sylvaticis!
1891 filiformis, L! ♃. In pascuis uliginosis subalpinis!

Digitized by Google

1892 glaucus, Ehrh! ♃. 6, 7. In pascuis argillosis!
1893 helodes, Link. ♃. 7, 8. In maritimis!

Subordo. 2. Glumacia.

Fam. 109. CYPERINEÆ.-Cyperoideæ *Juss.*

Trib. 1. SCIRPEÆ. *Lest.*

CLAVULA — Scirpi sp. — Spica terminalis unica, centralis, ebracteata.

§. 1. Dichostylis. Paleolulæ o. Stigmata 2. Achænium epileatum.

1894 fluitans = Scirpus, L! ♃. In lacubus arenosis!
β. terrestris.

§. 2. Bœotryon. Paleolulæ 3—6. Stigmata 3. Achænium epileatum.

1895 cœspitosa = Scirpus, L! ♃. 5, 6. In ericetis apricis!
β. nemorosa.
1896 Bœotryon = Scirpus, L. ♃. 6. In uliginosis!
β. campestris.

§. 3. Helodium. Paleolulæ o. Stigmata 3. Achænium tuberculiferum.

1897 acicularis = Scirpus, L! ①. 6, 7. In innundatis (Mich! Tin!)
1898 comosa = Scirpus, nob. in Mich agr. — rhizomate repente, vaginis aphyllis, culmis capillaribus quadrangulis; spicâ pauciflorâ. ♃. 5—9. Ad ripas stagnorum!
β. longicaulis.

§. 4. Limnochloa. *Beauv.*

1899 multiculmis = Scirpus Sm! ♃—6. In paludibus turfosis!
β. vivipara.
γ? virgata.

§. 5. Heleocharis. *Beauv.*

1900 ovata = Scirpus, Roth. ①. 6—8. In lutosis (Hoor!) (Boen.)
β. turgida.
1901 uniglumis = Scirpus, Lk. ♃. 5—8. In paludibus turfosis!
1902 palustris = Scirpus, L. ♃. 6—8. In fossis et palustribus frequens!
β. major.
γ. reptans.

SCIRPUS — Locustæ laterales.

§. 1. Isolepis. Glumellula o. Stigmata 3. Achænium tuberculatum.

1903 setaceus, L. ♃. 6—8. In pascuis sylvaticis humidis!
β. major.

Digitized by Google

1904 supinus, L. ♃. ①. 7—8. In arenosis humidis. dub. civ.
1905 holoschœnus, ♃. 6, 7. In Flandriâ fide Hoor!
β. romanus.

§. 2. Heleogiton. Glumellula setosa. Stigmata 2. Achænium epileatum.

1906 triqueter, L. ♃. 7, 8. Ad ripas fl. Mosæ et Scaldis!
α. monostachys.
β. conglomeratus.
γ. effusus.
1907 rothii, Hoppe ♃. 6, 7. Ad ripas Belgii littoralis!
α. monocephalus.
β. polycephalus.
1908 carinatus, Sm. ♃. Secus ripas Scaldis et Mosæ inf!

§. 3. Scirpotypus. Glumellula setosa. Stigmata 3. Achænium epileatum.

a. aphylli.
1909 lacustris, L. ♃. 6, 7. In piscinis et stagnis!
1910 glaucus, Sm. ♃. 6, 7. In palustribus uliginosis!
b. foliosi.
1911 maritimus, L. ♃. In fossis præsertim littoralibus!
β. monostachys.
γ. compactus.
δ. macrostachys.
1912 sylvaticus, L. ♃. 6, 7. In fossis et pratis udis!
1913 radicans, Schk. ♃. 7—9. In pratis humidis Lugdb. (Stek.) d. c.

ERIOPHORUM. *Lin.*

§. 1. Eriophorotypus. Spicæ plures.

1914 latifolium, Hoppe. ♃. 4, 5. In pratis udis!
1915 vaillantii, Poit. et Turp. ♃. 4, 5. In paludosis!
1916 angustifolium, Roth. ♃. 4, 5. In turfosis et uliginosis!
β. intermedium.
1917 gracile, Roth. ♃. 5, 6. In paludosis.

§. 2. Eriocoma. Spica unica.

1918 vaginatum, L. 4. 5. In turfosis!
1919 capitatum, Schrad. 4, 5. In turfosis Arduennæ (M. et W.)

Trib. 2. CYPEREÆ. *Kunth.*

CYPERUS.

§. 1. Cyperotypus.-Cyperus. *Lest.*

1920 longus, L. ♃. 7, 8. In paludosis (Rouc. Hoor!)

Digitized by Google

1921 thermalis : umbellæ compositæ ramis secundariis locustâ brevioribus vel nullis; bracteis involucri subternis foliaceis longissimis, involucelli scariosis; rhizomate repente. ♃. 6—8. Ad thermas Grani!

α. congestus.

β. depauperatus.

1922 fuscus, L. ①. 6—8. In paludosis!

β. virescens.

§. 2. Pycreus. *Lest.*

1923 flavescens, ①. 6—8. In pratis uliginosis!

Trib. 3. SCHOENEÆ.

Fl. hermaphr. paleolis bi-tri-fariam imbricatis.

CLADIUM. *R. Br.*

1924 Mariscus, R. Br. ♃. 6—8. In paludibus turfosis profund!

SCHOENUS. *Lin.*

§. 1. Schoenotypus.

1925 nigricans, L. ♃. 5—7. In turfosis!

§. 2. Rhynchospora.

1926 albus, L. ♃. 6, 7. In ericetis humidis!

1927 fuscus, L. ♃. 6, 7. In ericetis humidis!

§. 3. Nomochloa.

1928 compresus, L. 6—8. In pascuis humidis!

1929 rufus, Smith. ♃. 6, 7. In uliginosis nudis!

Trib. 4. CARICEÆ.

Flores unisexuales.

SCHELHAMMERIA. *Moench.*

1930 cyperoides = Carex, L! ♃. 8, 9. In pratis spongiosis (Hocq.)

CAREX *Lin.*

Subgenus 1. Caricotypus. — Spicæ androgynæ — Carex. *Micheli.*

† Rachis simplex, urceolifera.

§. 1. Physoglochin. *Neck.* — Stigm. 2.

1931 dioica, L! ♃. 4—6. In pratis paludosis montanis!

1932 davalliana, Sm. ♃. 4—6. In pratis turfosis Ardennæ. (Lej!)

1933 pulicaris, L! ♃. 5, 6. In pratis paludosis!

Digitized by Google

§. 2. Leucoglochin. — Stigmata 3.

1934 pauciflora, Lightf. ♃. 5—7. In graminosis alpinis Ard. (L! M!)

†† Rachis spiculifera.

§. 3. Ammoglochin. — Stigm. 2. Spiculæ androgynæ et unisexuales.

1935 arenaria, L! ♃. 4, 5. In arenosis præsertim maritimis!
1936 intermedia, Good. ♃. 4, 5. In paludosis!

§. 4. Argyroglochin. — Stigm. 2. Spiculæ androg. omnes, non squarrosæ.

1937 ovalis, Good. ♃. 4, 5. In pratis sylvaticis!
1938 divisa, Huds. ♃. 4, 5. In palustribus Hollandiæ (Rainv.)
1939 curta, Good. ♃. 5, 6. In paludosis turfosis!
1940 schreberi, Will. ♃. 4, 5. In gramin sicc. aren. (Beyer!)
1941 brizoides, L. ♃. 4, 5. In umbrosis sylvat.

§. 5. Phæstoglochin. — Stigm. 2. Spiculæ androgynæ squarrosæ.

a. Spiculæ terminales.

1942 stellulata, Good. ♃. 4, 5. In pratis humid. demissis!
1943 hydrophila: cæspitosa, culmis lævissimis erectis trigonis, spiculis subquaternis; urceolis ovato-acuminatis bidentatis stellatim divergentibus ♃. 5, 6. Ad ripas rivulorum in Campiniâ!
1944 vulpina, L. ♃. 5, 6. In pratis humidis et ad ripas!

β. nemorosa.

1945 muricata L! ♃. 4, 5. In montosis et ad sepes!
1946 divulsa, Good. ♃. 4, 5. In Campiniâ (Mich!)

b. Spiculæ axillares.

1947 virens, Lam. ♃. 4, 6. In umbrosis et paludibus (Desm! Mich!)

β. gracilior.

1948 remota, L! ♃. 5, 6. In umbrosis humidis!

§. 6. Heleoglochin. — Stigm. 2. Stylus articulatus.

1949 teretiuscula, Good. ♃. 5—6. In paludosis turfosis (March! Tin!)
1950 elongata, L! ♃. 5—6. In sylvaticis humidis!
1951 paradoxa, Willd. ♃. 4, 5. In turfosis agri Leodiensis (Lej. Doss.)
1952 Heleonastes, Ehrh. ♃. 6, 7. In paludosis Campiniæ (Mich!)
1953 paniculata, L! ♃. 5, 6. In paludosis!

Subgenus 2. Dichostachys. — Spicæ unisexuales.

† Stigmata duo.

§. 7. Phacocystis. — Urceolus muticus lenticularis.

a. Urceolus villosus.

1954 saxatilis, L. ♃. 6—8. In dunis Hollandiæ (Vh.)

Digitized by Google

b. Urceolus glaber.

1955 cespitosa, L. ♃. 5, 6. In paludosis turfosis demissis!
1956 trinervis, Degl. ♃. 5, 6. In sabuletis uliginosis.
1957 stricta, Good. ♃. 4, 5. In paludosis. (Mich)
1958 acuta, Sm. ♃. 4, 5. In aquosis!
1959 aquatilis, Wahlenb. ♃. 4, 5. In aquosis Hollandiæ (Vh.)
1960 cerina: rhizomate longè repente; culmis solitariis lævissimis; bracteis setaceo-foliaceis foliisque angustis margine scabris; spicis sessilibus, femineis ovatis, masculâ cylindricâ; squamis fuscis costâ pallidâ; urceolis lentiformibus utrinquè nervosis ore integerrimo. ♃. 6, 7. In paludibus dunarum Hollandiæ!

†† Stigmata tria.

§. 8. Porocystis. Urceolus muticus perforatus glaber.

1961 glauca, Scop. ♃. 4—6. In pratis et pascuis!
β. micheliana.
1962 panicea, L! ♃. 4, 5. In pratis humidis!
1963 pallescens, L! ♃. 4—6. In pratis nemorosis humidis!
1964 limosa, L! ♃. 5, 6. In turfosis spongiosis (Mich!)

§. 9. Acrocystis. — Urceolus mucronatus hirtus.

a. Bracteæ foliaceæ.

1965 pilulifera, L? ♃. 5, 6. In pratis et ericetis!
1966 umbrosa, Host. ♃. 5, 6. In sylvis umbrosis Verviæ!
1967 præcox, Jacq. ♃. 3, 4. In pascuis apricis!

b. Bracteæ scariosæ.

1968 clandestina, Good. ♃. 3, 4. In rupibus Luxemburg!
1969 digitata, L! ♃. 4, 5. In umbrosis calcareis!
β. ornithopoda.
1970 montana, L! ♃. 4, 5. In sylvaticis subalpinis!
1971 ericetorum, Poll. ♃. 4, 5. In ericetis Hannoniæ (Desm!)

§. 10. Cheilocystis. — Urceolus emarginatus hirtus.

1972 tomentosa, L. ♃. 4, 5. In pratis montosis Luxemb (March!)

§. 11. Aulocystis. — Urceolus unilabiatus glaber.

1973 firma, Host. ♃. 6—7. In Flandriâ fide Hoor.
1974 depauperata, Good. ♃. 5, 6. In sylvis Flandriæ (Hoor!)
1975 strigosa, Good. ♃. 4, 5. In Luxemburgio fide Cromback.

§. 12. Rhynchocystis. — Urceolus ortiolatus glaber.

1976 maxima, Scop! ♃. 4, 5. In sylvaticis udis montosis!

§. 13. Ceratocystis. — Urceolus bifidus glaber.

a. Spica mascula 1; femineæ sessiles.

1977 flava, L! ♃. 5, 6. In paludosis et pratis sylvaticis!
β. patula.

Digitized by Google

1978 oederi, Roth. ♃. 5, 6. In pascuis humidis!

b. Spica masc. 1; femineæ pedunculatæ.

1979 fulva, Good. ♃. 5—7. In pascuis humidis apricis!

β? caudata.

1980 versicolor: rhizomate repente; spicis 2—3 inclusè pedunculatis, distantibus, oblongis; urceolis trigonis bidentatis squamisque acutis incumbentibus; squamis spicæ masculæ unicæ obtusis. ♃. 5, 6. In pratis humidis Arduennæ!

α. scabriculmis.

β. læviculmis.

1981 distans, L! ♃. 4, 5. In paludosis littoralibus!

1982 biligularis, Dec. ♃. 5, 6. In pratis umbros. Leod. (Lej! Mich!)

1983 binervis, Sm. ♃. 4, 5. In paludosis subalpinis!

1984 Drymeja, L. F. ♃. 5, 6. In sylvaticis humidis!

1985 pseudocyperus, L! ♃. 4, 5. In paludosis!

c. Spicæ masculæ plures.

1986 vesicaria, L! ♃. 4, 5. In pratis sylvaticis spongios!

α. virescens.

β. flavescens.

1987 ampullacea, Good. ♃. 4, 5. In paludosis!

1988 hordeiformis, Thuil. ♃. 4, 5. In uliginosis Flandriæ (Hoor!)

1989 riparia, Good. ♃. 4, 5. In fossis et ad ripas!

1990 paludosa, Good. ♃. 5, 6. In paludosis!

1991 kochiana, Dec. ♃. 4, 5. In paludosis (D.ª Libert! Mich!)

§. 14. Lasiocystis. — Urceolus bifidus hirtus.

1992 hirta, L! ♃. 4—6. In aggeribus sabulosis!

β. hirtæformis.

1993 filiformis, L! ♃. 4, 5. In paludibus profundioribus!

Fam. 110. GRAMINEÆ. *Lin.*

Series. 1.ª Calliflorae. *Dmrt. agrost. Belg.*

Gluma callifera. Flosculi centraliter callo glumarum inserti.

Trib. 1. MAYDEÆ. *Agrost. Belg.*

MAYS. *Tourn.*

1994 Zea, Gærtn. ①. 6, 7. passim culta!

Digitized by Google

Trib. 2. SACCHARINEÆ. *Agrost. Belg.*

IMPERATA. *Cyrill.*

1995 cylindrica, Beauv. 7, 8. In Holl. (Boerh) dub. civ.

Trib. 3. ANDROPOGINEÆ. *Agrost. Belg.*

ANDROPOGON. *Beauv.*

1996 angustifolius, Sm. ♃. 7, 8. In apricis agri Limb. (Mich!)

Trib. 4. CYNODONEÆ. *Agrost. Belg.*

CYNODON. *Rich.*

1997 dactylum, Rich. ♃. 7—9. In arvis et aggeribus arenosis!

Trib. 5. LEPIUREÆ. *Agrost. Belg.*

LEPIURUS. *Agrost. Belg.*

1998 incurvatus, Dmrt. ①. 6—8. In maritimis!
1999 strigosus, Dmrt. ①. 6—8. In maritimis!

NARDUS. *Beauv.*

2000 stricta, L. ♃. 6, 7. In ericetis apricis!

Trib. 6. PANICEÆ. *Agrost. Belg.*

Subtrib. 1. CENCHREÆ. *Agrost. Belg.*

TRAGUS. *Hall.*

2001 racemosus, Desf. ①. 6. In Flandriâ (Hoor!) Limb. (Nyst!)

Subtrib. 2. SETARIEÆ. *Agrost. Belg.*

SETARIA. *Beauv.*

a. Racemus simplex.

2002 humifusa, Dmrt. ①. 7, 8. In arvis, inter segetes!
2003 glauca Beauv. ①. 7, 8. In arvis fide auct.
2004 rubicunda, Dmrt. ①. 7, 8. In arvis!

Digitized by Google

2005 viridis, Beauv. ①. 7, 8. In arvis præsertim arenosis!
β. nana.

b. Racemus spiculatus.

2006 verticillata, Beauv. ①. 7, 8. In cultis et agris!
2007 verticilliformis : racemo cylindrico verticillato; setis involucri extrorsum scabris. ①. 7, 8. In cultis Luxemburgii (Tin!)
2008 multiseta, Dmrt. ①. 7, 8. In agro Leod. quasi spontè!
2009 italica, Beauv. ①. 7, 8. In agris colitur!
2010 germanica, Beauv. ①. 7, 8. Inter segetes occurit!]

OPLISMENUS. *Agrost. Belg.*

2011 crusgalli, Dmrt. ①. 7, 8. In agris et cultis sabulosis!
α. muticus.
β. mixtus.
γ. armatus.

Subtrib. 3. MILIACEÆ. *Agrost. Belg.*

MIBORA. *Adans.*

2012 minima, Dmrt. ①. 3, 4. In arenosis Flandriæ (Rouc!)

DIGITARIA. *Koel.*

2013 sanguinalis, Scop. ①. 6—8 In agris arenosis!
2014 glabra, Beauv. ①. 7, 8. In arvis arenosis frequens!
2015 ciliaris, Koel. ①. 7, 8. In arvis arenosis Tornaci!

PANICUM. *Beauv.*

2016 miliaceum, L. ①. 7, 8. In agris colitur!
2017 capillare, L. ①. 7, 8. In agro Leod. spontè (Mich!)

MILIUM. *Beauv.*

2018 effusum, L. ♃. 5, 6. In nemorosis umbrosis!
2019 scabrum, Merl. ①. In arenosis muscosis Holl!

Trib. 7. ORYZEÆ. *Kunth.*

ASPRELLA. *Schreb.*

2020 oryzoides, Lam. ♃. 8, 9. Ad ripas fossarum!
α. lævigata.
β. scabra.

Digitized by Google

Trib. 8. STIPACEÆ, *Kunth.*

STREPTACHNE. *R. Br.*

2021 calamagrostis, Dmrt. ♃. 7, 8. In siccis.

STIPA. *Lin.*

§. 1. Leiostipa. *Dmrt.*

2022 capillata, L. ♃. 6, 7. In Flandriâ fide Hoor!

§. 2. Eriostipa. *Dmrt.*

2023 pennata, L. ♃. 5, 6. In collibus sic cis!

Trib. 9. PHLEACEÆ. *Agrost. Belg.*

LAGURUS. *Lin.*

2024 ovatus, L. ①. 6, 7. In agro Limb. (Dreiss.!)

POLYPOGON. *Desf.*

2025 paniceus, Dmrt. ①. 7, 8. In maritimis udis (Hoor! Gort. Desm!)
β. monspeliensis.
2026 littorale, Sm. ♃. 7, 8. In insulis Frisiæ orient. (M. et K.)

ALOPECURUS. *Lin.*

§. 1. Alopecurium. *Dmrt.*

2027 fulvus, Sm! ♃. 6—8. In fossis aquosis!
2028 geniculatus, L! ♃. 6—8. In pratis humidis et fossis!
2029 bulbosus, L. ♃. 6, 7. In maritimis Hollandiæ (Vh!)

§. 2. Alopecurotypus. = Alopecuros. *Agrost.*

2030 pratensis, L! ♃. 5, 9. In pratis succulentis!
β. aquaticus.
γ? pallidus.
2031 tonsus, Dmrt. ♃. 5. In pratis Flandriæ. (Hoor!)

§. 3. Tozzetia. *Savi.*

2032 agrestis, L! ①. 6, 7. In agris argillosis!
β. segetalis.
2033 urticulatus. Pers. ①. 5, 6. Secus vias in Luxemb!

PHLEUM. *Gaud.*

§. 1. Phleotypus.

2034 pratense, L. ♃. 5—10. In pratis et pascuis!
β? nodosum, L.

Digitized by Google

§. 2. Chilochloa. *Beauv.*

2035 læve, Bieb. ♃. 6, 7. In collibus calcareis!
2036 hirsutum, Sut. ♃. 6, 7. In collibus agri Luxemb. (Tin!)
2037 arenarium, Lin. ①. 5—6. In arenosis maritimis!

PHALARIS. *Gærtn.*

§. 1. Phalarotypus. — Locustæ conformes.

2038 canariensis, L. ①. 7, 8. passim spontè.
2039 aquatica, L. ①. 7, 8. In agro Leod spontè (Mich!)

§. 2. Heteraehne. — Locustæ dissimiles.

2040 paradoxa, L. ①. 7, 8. In agro Leod. spontè (Mich!)

BALDINGERA. *Fl. Wett.*

2041 arundinacea. Dmrt. ♃. 6, 7. Ad ripas fluviorum!

Trib. 10. AGROSTIDEÆ. *Agrost. Belg.*

AMMOPHILA. *Host.*

2042 arundinacea, Host. ♃. 7, 8. In arenosis maritimis!
2043 baltica = Arundo, Flugg. ♃. 7, 8. Ins. Rothum (Vh. in litt.)

ANTHOXANTHUM. *Beauv.*

2044 odoratum, L. 5, 6. In pascuis et sylvaticis!
β? villosum.

AGROSTIS = Agrostis excl. Aperâ. *Agrost. Belg.*

§. 1. Trichodium. *Rich.*

2045 pusilla, Dmrt. ♃. 6. In Gelriâ (Vh!)
2046 canina, L. ♃. 7, 8. In graminosis humidis!
2047 hybrida, Gaud? ♃. 7, 8. In arenosis Gelriæ (Bergsma!)

§. 1. Vilfa. *Adans.*

2048 mexicana, L. ♃ 6—9. In pratis agri Leod. culta (Mich!)
2049 alba, L. ♃. 7, 8. In pratis!
β. diffusa.
2050 stolonifera, L. ♃. 7, 8. In pascuis!
2051 vulgaris, With. ♃. 7, 8. In pascuis et sylvaticis!
2052 bryoides: rhizomate repente; culmis minimis basi ramosis; ligulis elongatis; racemo simplissimo ovato; paleis sub æqualibus; paleolis muticis. ♃. 7, 8. In arenosis maritimis!

APERA. *Adans.*

2053 interrupta, Beauv. ①. 6. 7. In agris sabulosis!

Digitized by Google

2054 spica venti, Beauv. ⓘ. 6, 7. In agris frequens!

CALAMAGROSTIS. *Agrost. Belg.*

§. 1. Calamagris. *Agrost. Belg.*

2055 lanceolata, Roth. ♃. 6, 7. In ericetis paludosis!
2056 littorea, Dec. ♃. 6, 7. In maritimis Hollandiæ (Kuhl.)
2057 subulata, Dmrt. ♃. 6, 7. In collibus propè Verviam (Lej!)
2058 halleriana, Dec. ♃. 7. Ad lacum Harlemicum. (De Haan. Beyer!)
2059 epigeois, Roth. ♃. 7, 8. In frutetis apricis!

§. 2. Deyeuxia. *Agrost. Belg.*

2060 montana, Host. ♃. 6, 7. In Hannoniâ fide Hocq.
2061 sylvatica, Dec. ♃. 6, 7. In sylvis montosis Arduennæ!
β. contracta.

Series. 2.a Scobifloreæ. *Agrost. Belg.*

Gluma scobifera; flosculi lateraliter alternatim scobinâ inserti.

Trib. 11. ARUNDINACEÆ. — Gram. bromea arundinacea. *Kunth.*

ARUNDO. *Beauv.*

2062 Phragmites, L. ♃. 7, 8. In stagnis et pratis humidis!
β. nigricans.
γ. fulva.

Trib. 12. AVENACEÆ. — Gram. bromea avenacea. *Kunth.*

HIEROCHLOE. *Gmel.*

2063 australis, Dmrt. ♃. 5, 6. In pratis Gallobelgii (Desm!)
2064 borealis, Trin. ♃. 4, 5. In pratis Hollandiæ (Vin!)

HOLCUS. *Pers.*

2065 lanatus, L. ♃. 6—9. In pascuis et nemoribus!
2066 mollis, L. ♃. 6—9. In arvis et sylvaticis!

ARRHENATHERUM. *Beauv.*

2067 avenaceum, Beauv. ♃. 5—8. In pratis siccis!
β. rupestre.
2068 bulbosum, Dmrt. ♃. 5, 6. In sylvis succulentis!

Digitized by Google

AVENA. *Agrost. Belg.*

§. 1. Avenotypus. — Paleola exterior calce nuda, apice bifida.

2069 orientalis, Schreb. ①. In agris culta!
2070 nuda, L. ①. 7, 8. Inter segetes (Mich!)
2071 sativa, L. ①. 7, 8. In agris culta!
β. abbreviata = brevis Lej!
2072 brevis, Roth. ①. 7, 8. In agris Arduennæ (Mich! March!)

§. 2. Avenastrum. — Paleola exterior calce nuda, apice biseta.

2073 strigosa, Schreb. ①. 7, 8. In agris inter segetes!

§. 3. Avronastrum. — Paleola exterior calce hirta, apice biseta.

2074 hirsuta, Roth. ①. 6—9. In agris inter segetes!

§. 4. Avronia. — Paleola exterior calce hirta, apice bifida.

2075 fatua, L. ①. 7, 8. In agris inter segetes!
2076 sterilis, L. ①. 7, 8. In agro Antverpiensi. (Dek.) dub. civ.

TRISETUM *Agrost Belg.*

§. 1. Avenula. *Agrost Belg.*

2077 pratense, Dmrt. ♃. 6—8. In pratis siccis rarum!
2078 pubescens, Pers. ♃. 5—7. In pascuis siccis!

§. 2. Trisetaria. *Agrost. Belg.*

2079 flavescens, Beauv. ♃. 7—9. In pascuis siccis!
2080 neglectum. R. et S. ①. 7. In arenosis Campiniæ (Dreissen!)

§ 3. Discolops. *Agrost. Belg.*

2081 præcox, Dmrt. ①. 4—6. In sabulosis apricis!

CORYNEPHORUS. *Beauv.*

2082 canescens, Beauv. ♃. 6—8. In arenosis apricis!

AIRA. *Beauv.*

§. 1. Airotypus. — Airella. *Agrost. Belg.*

2083 caryophyllea, Lin. ①. 5—7. In arenosis sterilibus!
β. multiculmis, Dmrt. ①. 5—7. Ad oras sylvarum!

§. 2. Bostrycha. *Agrost Belg.*

2084 flexuosa, L. ♃. 6, 7. In sylvaticis siccis!
β. collina.
2085 discolor, Thuil! ♃. 8, 9. In ericetis uliginosis!

DESCHAMPSIA. *Beauv.*

2086 cæspitosa, Beauv. 6. ♃. In sylvaticis udis!
β. parviflora.

Digitized by Google

Trib. 13. BROMACEÆ. *Agrost. Belg.*

MICHELARIA. *Dmrt.*

2087 bromoidea, Dmrt. ①. 6, 7. In agris Arduennæ!
β. uniseta.

BROMUS *Hall.*

§. 1. Bromotypus. — Bromium. *Agrost.*

a. Paleolæ inæquales, exterior major.

2088 squarrosus, L! ①. 6. In messibus arenosis!
2089 mollis, L. ①. 5, 6. In ruderatis!
β. affinis.
2090 racemosus, L. ①. 5, 6. In pratis succulentis!
β. compositus.
γ. pubescens.
2091 nitidus, Dmrt. ①. 6, 7. In messibus Arduennæ!

b. Paleolis æquilongis.

2092 diffusus (mendosè Agrarius in Agrost. Belg.) ①. 5, 6. In ruderatis Belgii littoralis!
β? agrarius (mendosè diffusus l. c.)
2093 elongatus, Gaud. ①. 7, 8. In agris inter segetes!
2094 brevisetus: paniculâ subsimplici; locustis ovatis compressis; flosculis demùm distinctis teretiusculis; paleolis æquilongis; setâ brevissimâ subnullâ ①. 6, 7. In messibus! B. secalinus Host. gr. 1 t. 12.
2095 secalinus, L. ①. 6, 7. In messibus!
β. pubescens.
2096 grossus, Dec. ①. 7, 8. In messibus!
2097 patulus, M. et K. ①. 5, 6. In messibus!
2098 arvensis, L. ①. 7, 8. In messibus apricis!

§. 2. Pnigma. *Agrost. Belg.*

2099 inermis, L. ♃. 6, 7. In pascuis siccis!
2100 erectus, Huds. ♃. 6, 7. In collibus et pascuis!
α. glaber.
β. scaber.
γ. pubescens.

§. 3. Bromopsis. *Agrost. Belg.*

2101 asper, L. ♃. 6, 7. In sylvis et dumetis!

§. 4. Genea. *Agrost. Belg.*

2102 rigidus, Roth. ①. 5, 6. In Luxemburgio fide Cromback!
2103 rigens, Lin. ①. 5, 6. In dunis Hollandiæ (V. marum.) d. c.
2104 tectorum, L. ①. 5, 6. In collibus apricis præsertim arenosis!

Digitized by Google

2105 sterilis, L. ①. 6—9. In dumetis et ruderat's!

DACTYLIS. *Pers.*

2106 glomerata, L. ♃. 6—8. In pratis frequens!
β. pendula.

KOELERIA. *Pers.*

2107 cristata, Pers. ♃. 6—7. In collibus siccis!
β. gracilis.
γ. arenaria.
δ. pyramidata.
ε. breviseta.
2108 glauca, Dec. ♃. 6, 7. In pratis siccis arenosis Luxemb. (Tin!)

Trib. 14. CYNOSUREÆ. *Agrost. Belg.*

SESLERIA. *Scop.*

2109 cærulea, Scop. ♃. 3, 4. In collibus calcareis!

CYNOSURUS. *Adans.*

2110 cristatus, L. ♃. 6, 7. In pratis et graminosis!

PHALONA. *Agrost. Belg.*

2111 echinata, Dmrt. ①. 5, 6. In pratis rara!

Trib. 15. POACEÆ. *Agrost. Belg.*

POA. *Agrost. Belg.*

§. HOMALOPOA. — *Agrost. Belg.*

2112 sudetica, Haenke ♃. 6, 7. In sylvis montosis Arduennæ!
β. rubens.
2113 compressa, L. 6—8. In muris et pratis siccis!

§. 2. STENOPOA. *Agrost. Belg.*

2114 cæsia, Sm! ♃. 5, 6. In rupibus propè Spa (Mich!)
2115 nemoralis, L! ♃. 7—9. In umbrosis et pratis!
α. vulgaris.
β. firmula.
γ. coarctata.
δ. rigidula.
2116 glauca, Vahl. ♃. 7—9. In apricis!
2117 fertilis, Host. ♃. 6—9. In pratis humidis!
β. exigua.

Digitized by Google

§. 3. Spizopoa. *Agrost. Belg.*

2118 pratensis, L! ♃. 5—7, In pratis et graminosis!
β. lejeunii.
γ. anceps.
δ. angustifolia.
ε. strigosa.

2119 trivialis, L! ♃. 6—8. In pratis subhumidis!
β. Koeleri, Dec.

2120 annua, L. ①. 3—11. In cultis, plateis et hortis!
β. flavicans.

2121 bulbosa, Lin. ♃. 4, 5. In graminosis apricis!
β? crispa.

2122 alpina, L. ♃. 6. β. In arenosis Flandriæ fide Hoor!
β. brevifolia.

§. 4. Megastachya.

2123 megastachya, Koel. ①. 5, 6. In arenosis (Hoor! Dreiss! Hocq.)

2124 pilosa, L. ①. 6, 7. Ad ripas Mosæ (Lej! Mich!)

BRIZA. *Gærtn.*

2125 maxima, L. ①. 6. In Flandriâ fide Hoor! et Muss!

2126 media, L. ♃. 5, 6. In pratis siccis!
β. serotina.
γ? lutescens, Desv.

2127 minor, L. ①. 5, 6. In agris circà Bruxellas (Kx.)

TRIODIA. *R. Br.*

2128 decumbens, Beauv. ♃, 6, 7. In ericetis et sylvis apricis!

MELICA. *Lin.*

§. 1. Melicium. *Agrost. Belg.*

2129 uniflora, Retz. ♃. 5, 6. In nemorosis!

2130 nutans, L. ♃. 5, 6. In nemoribus Condrusiæ!

§. 2. Dalycum. *Agrost. Belg.*

2131 ciliata, L. ♃. 5, 6. In glareosis et ruderatis!

ENODIUM. *Pers.*

2132 cæruleum, Gaud. ♃. 8. In ericetis et sylvis apricis!
β. atrovirens.
γ. divaricatum.

GLYCERIA. *R. Br.*

§. 1. Sclerochloa.

2133 rigida, Sm. ①. 5, 6. In apricis calcareis!
β. loliacea.

Digitized by Google

2134 procumbens, Dmrt. ♃. 6, 7. In maritimis Hollandiæ (Vh!)

§. 1. Catabrosa. *Beauv.*

2135 aquatica, Presl. ♃. 6, 7. In fossis limosis!
β. ochroleuca.

§. 2. Glyceriotypus.

2136 distans, Wahlemb. ♃. 5—8. In maritimis!
2137 maritima, M. et K. ♃. 5—8. In æstuariis!
α. paniculata.
β. spiciformis.
2138 fluitans, R. Br. ♃. 6—9. In fossis et rivulis!
α. denticulata.
β. integra.

§. 3. Hydropoa. *Agrost. Belg.*

2139 arundinacea = Poa aquatica, L. ♃. 6—8. In paludibus!

Trib. 16. FESTUCEÆ. *Agrost. Belg.*

FESTUCA. *Agrost. Belg.*

α. Folia setacea.

2140 ovina, L! ♃. 5, 6. In pascuis siccis!
β. tenuifolia.
γ. maritima.
2141 capillata, Lam. ♃. 5, 6. In pascuis siccis!

b. Folia juncea fissa.

2142 stricta, Gaud. ♃. 5, 6. In collibus siccis!
2143 prasina, Dmrt. ♃. 5, 6. In collibus siccis.
2144 valesiaca, Gaud. ♃. 5, 6. In pascuis siccis!
2145 glauca, Lam. ♃. 5, 6. In rupestibus!
2146 arduensis, Dmrt. ♃. 5, 6. In fissuris rupium!
2147 pallens, Hort. ♃. 5, 6. In fissuris rupium!
2148 duriuscula, Lin. ♃. 5—7. In pascuis siccis!
2149 unifaria, Dmrt. ♃. 5, 6. In arenosis siccis!

c. Folia involuta vel plana. Rhizoma cæspitosum.

2150 nigrescens, Lam. ♃. In ericetis montosis (Olis!)
2151 heterophylla, Lam. ♃. 7, 8. In umbrosis!

d. Folia involuta vel plana. Rhizoma repens.

2152 rubra, Lin. ♃. 6—8. In pascuis et sylvaticis!
β. denudata.
γ. geniculata.
δ. oraria.
ε. ammophila.

Digitized by Google

e. Lingula exserta.

2153 diffusa, Dmrt. ♃. 6. In sylvis (Tin!)
2154 calamaria, Smith. ♃. 6, 7. In sylvis Arduennæ et Eifliæ!

VULPIA. *Agrost. Belg.*

§. 1. Mygalurus. — *Agrost. Belg.*

2155 Nardus = Tritic. Dec. ①. 5, 6. In ruderatis apricis!
β. pubescens.
2156 bromoides, Dmrt. ①. 5, 6. In pascuis arenosis!
β. sciuroides.
2157 Myuros, Gmel. ①. 5, 6. In pascuis arenosis!

§. 2. Monachne. *Agrost. Belg.*

2158 uniglumis, Dmrt. ①. 5, 6. In arenosis Hannoniæ!

SCHEDONORUS. *Beauv.*

§. 1. Plantynia. — Seta elongata.

2159 giganteus = Bromus, L. ♃. 6—8. In nemorosis humidis!

§. 2. Schedonorotypus. — Seta brevissima vel nulla.

2160 arundinaceus, Dmrt. ♃. 6, 7. In pratis humidis!
2161 pratensis, Beauv (*). ♃ 6, 7. in pratis.
β. radicans.
γ. mixtus.
δ. loliaceus.

Trib. 17. TRITICEÆ. *Agrost. Belg.*

Subtrib. 1. Loliaceæ. *Agrost. Belg.*

LOLIUM. *Lin.*

§. 1. Ctenium. *Agrost. Belg.*

2162 perenne, L! ♃. 6—8. In pratis et graminosis!
β. tenue. L!
γ. cristatum.
δ. ramosum.
ε. viviparum.

§. 2. Dolathera. *Agrost. Belg.*

2163 arvense, Smith! ①. 6, 7. In arvis præsertim post Linum!
α. geniculatum.
β. Hostii.
γ. liniforme.

(*) Schedonorum pratensem nil esse nisi Lolii perennis varietatem et unam eamdemque speciem sistere, cum amico Heegman suspicor.

Digitized by Google

2164 decipiens, Dmrt. ①. 6, 7. In agris Arduennæ!
2165 lucidum, Dmrt. ①. 6, 7. In agris arenosis Flandriæ!

§. 3. Crepalia. *Schrank.*

2166 temulentum, L. ①. 6, 7. In agris!
β? gracile.
2167 multiflorum, Lam. ①. 6, 7. In agris Hannoniæ (Hocq.)

BRACHYPODIUM. *Beauv.*

§. 1. Distachys. *Agrost. Belg.*

2168 maritimum, R. et S. ①. 5, 6. In maritimis (Desm.)
2169 distachyon, Beauv. ①. 5, 6. In rupibus agri Leod. (Mich!)

§. 2. Dryopyron. *Agrost. Belg.*

2170 sylvaticum, Beauv. ♃. 7, 8. In umbrosis!
β. gracile.
2171 pinnatum, Beauv. ♃. 6, 7. In collibus apricis!
β. condensatum.
2172 corniculatum, Dmrt. ♃. 6, 7. In nemoribus siccis!
β. abbreviatum.

AGROPYRON. *Gaertn.*

a. Rhizomate repente.

2173 junceum, Beauv. ♃. 6, 7. In arenosis maritimis!
2174 littorale, Dmrt. ♃. 6, 7. In arenosis maritimis!
α. obtusiflorum.
β. acutiflorum.
γ. heterophyllum.
δ. littoreum.
ε. nodosum.
2175 glaucum, R. et S. ♃. 6, 7. In maritimis Gallo belgii (Desm!)
2176 pungens, R. et S. ♃. 6, 7. In arenosis marit. Flandriæ!
α. acutum.
β. candicans.
γ. aculeatum.
δ. setigerum.
ε. barbatum.
2177 repens, Beauv. ♃. 6, 7. In arvis et ruderatis!
β. barbatum.
γ. glaucescens.

b. Rhizoma cæspitosum.

2178 caninum, Beauv. ♃. 6, 7. In sylvis et dumetis.
2179 rigidum, Beauv. ♃. 6, 7. In collibus aridis Verviæ (Lej!)

Digitized by Google

Subtrib. 2. FRUMENTACEÆ. *Agrost. Belg.*

ÆGILOPS. *Lin.*

2180 ovata, L! ①. 6, 7. In arenosis Flandriæ (Lest. Hoor)
2181 triuncialis, L! ①. 6, 7. In apricis (Lest. Hoor.)

TRITICUM. *Tourn.*

§. 1. MONOCOCCON. *Agrost. Belg.*

2182 Monococcon, L. ①. 6, 7. In Luxemburgio cultum!

§. 1. SPELTA. *Agrost Belg.*

2183 Spelta, L. ①. 6, 7. In reg. montosis cultum!
β. muticum.
2184 dicoccum, Schrank. ①. 6. In agris Condrusiæ (Mich!)
β. atratum.

§. 3. FRUMENTUM. *Agrost Belg.*

2185 hybernum, L. ②. 6. In agris cultum!
β. velutinum.
2186 æstivum, L. ①. 6. In agris cultum!
2187 compositum, L. ①. 6, 7. In agris cultum!
2188 turgidum, L. ①. 6, 7. In agris cultum!

§. 4. PYRACHNE. *Agrost. Belg.*

2189 polonicum, L. 7. In Arduennâ cultum (Mich!)

SECALE. *Tourn.*

2190 cereale, L. ②. 5. In agris cultum!
β. triflorum.

Subtrib. 3. HORDEACEÆ. *Agrost. Belg.*

HORDEUM. *Lin.*

§. 1. HORDEOTYPUS. = Hordeum. *Agrost. Belg.*

2191 hexastichon, L! ①. 6, 7. In agris colitur!
2192 vulgare, L! ①. 6, 7. In agris colitur!

§. 2. ZEOCRITON. *Agrost. Belg.*

2193 distichum, L. 6, 7. In agris reperitur!
2194 Zeocriton, L! 7. In agris rarò cultum!

§. 3. TRICHOSTACHYS. *Agrost. Belg.*

2195 nodosum Lin! ♃. 6, 7. In pratis et pascuis!
α. pratense.
β. secalinum.

Digitized by Google

2196 murinum, L. ①. 6—8. In ruderatis et ad vias!
2197 maritimum, With. ①. 6, 7. In maritimis!

ELYMUS. *Agrost. Belg.*

§. 1. LEPTOTRIX. *Agrost. Belg.*

2198 europæus, L. ♃. 6, 7. In sylvaticis Arduennæ!

§. 2. ELYMOTYPUS. = Elymium. *Agrost. Belg.*

2199 arenarius, L. ♃. 6, 7. In arenosis maritimis!
2200 geniculatus, Curt. ♃. 7. In maritimis Hollandiæ (Zynen.)

GYMNOSTICHUM. *Schreb.*

2201 hystrix, Schreb. ♃. 7. In Flandriâ fide Hoorl dub. civ.

Fam. 111. TYPHACEÆ. *Juss.*

TYPHA. *Tourn.*

2202 latifolia, L. ♃. 6, 7. In paludibus!
β. elatior.
2203 angustifolia, L. ♃. 6, 7. In lacubus paludosis!
2204 media, Schl. ♃. 6. In paludosis Gallobelgii (Desm!)

SPARGANIUM. *Tourn.*

2205 natans, L. ♃. 6. In stagnis solo turfoso (Hec! Dreiss!)
2206 erectum, Smith. ♃. 6—8. In fossis!
2207 ramosum, Smith. ♃. 6—8. In stagnis!

Fam. 112. ARIDEÆ. — Aroïdeæ. *Juss.*

Trib. 1. ORONTIACEÆ. *R. Br.*

ACORUS. *Lin.*

2208 europæus = A. Calamus a, L. ♃. 6, 7. In aquosis limosis!

Trib. 2. ARISAREÆ.

Perigonium nullum.

ARUM. *Lin.*

2209 vulgare, Lam. 5, 6. In umbrosis argillosis!

Digitized by Google

α. maculatum.
d. immaculatum.
2210 italicum, Mill. ♃. 5. In umbrosis!

CALLA. *Lin.*

2211 palustris, L. ♃. 6—8. In paludosis Campiniæ!

Fam. 113. POTAMOGETONEÆ.

Trib. 1. ZOSTEREÆ.

Stigmata capillaria.

ZOSTERA. *Dec.*

2212 marina, L. ♃. 8, 9. In oceano!

CAVOLINIA. *Dec.*

2213 oceanica, Dec. ♃. 8. In oceano (Gort. Rouc.)

Trib. 2. POTAMOGETEÆ.

Stigmata sessilia.

POTAMOGETON. *Tourn.*

α. Jolia diformia. — Nymphæogeton.
2214 natans, L! ♃. 6—8. In aquosis et palustribus!
β. angustatus.
γ. minor.
2215 heterophyllus, Schreb. ♃. 6—8. In stagnis (Desm! Reinw!)
2216 spatulatus, Koch et Ziz. ♃. 7, 8. In aquosis Campiniæ. (Mich.)
β. Jolia uniformia dilatata. — Potamogetotypus.
2217 rufescens, Schard. ♃. 6—8. In fossis et fluviis!
2218 helodes: foliis omnibus immersis, petiolatis, ovatis, oppositis; pedunculis alternis folio longioribus; drupeolis dorso obtusis. ♃. 7, 8. In fossis paludosis!
2219 lucens, L! ♃. 7, 8. In aquosis limosis!
β. longifolius.
2220 prælongus, Wulf. ♃. 7, 8. In aquosis Ultrajecti!
2221 perfoliatus, L! ♃. 6—8. In fluviis!
β. oblongifolius.
2222 crispus, L! ♃. 6—8. In fossis et fluviis!
β. humilis.

Digitized by Google

c. Folia uniformia, omnia opposita.—Naiadogeton.

2223 densus, L! ①. 6— In fossis et rivulis!
β. lancifoilus.

d. Jolia uniformia graminea—Sirenogeton.

2224 zosterophyllus = zosteræfolius Schum. ♃. 7, 8. In fossis ultrajecti!
2225 acutifolius, ♃. Lk. 6—8. In fossis limosis!
2226 obtusifolius, M. et K. ♃. 7, 8. In fossis limosis!
2227 compressus, L! ♃. 7, 8. In fossis limosis!
2228 pectinatus, L! ♃. 7, 8. In aquosis !
β. marinus, L !
2229 pusillus, Lin! ♃. 6—8. In fossis limosis!

RUPPIA. *Lin.*

2230 maritima L! = rostellata, Rchb. ♃. 6—8. In fossis aquâ marinâ repletis!
2231 spiralis, L! = maritima Rchb. ♃. 6—8. In fossis aquâ marinâ repletis!

Trib. 3. ZANNICHELLIEÆ.

Stigmata cristata.

ZANNICHELLIA. *Mich.*

2232 palustris, L. ①. 7. In fossis stagnantibus!
β. lacustris.
γ. fluviatilis.
2233 repens, Boen. ①. 8—10. In fossis salmancidis!

Fam. 111. NAYADEÆ.

Trib. 1. NAYEÆ.

Flores masculi monandri.

NAYAS. *Lin.*

§. 1. Hyas.—Caulinia Willd.
2234 minor, Roth. ①. In fluminibus (Hoor.)
§. 2. Nayadotypus.—Nayas. Willd.
2235 monosperma, Willd. ①. In fluminibus (Tin! Hoor!)
α. lævis.
β. muricata.

Digitized by Google

Trib. 2. CERATOPHYLLEÆ.

Flores masculi polyandri.

CERATOPHYLLUM, *Lin.*

2236 tricorne (demersum.) ♃. 7—9. In fossis limosis!
2237 tricuspidatum : stylo elongato recto; fructibus tricuspidatis, aculeis rectis ♃. 7—9. In fossis limosis!
2238 unicorne : stylo elongato falcato; fructibus apice unicornibus, basi bituberculatis. ♃. 7—9. In fossis limosis!
2239 inerme (submersum) ♃. 7—9. In fossis limosis.

Fam. 115. EQUISETACEÆ. *Dec.*

EQUISETUM. *Lin.*

2240 arvense, L. ♃. 3, 4. In arvis!
2241 fluviatile, L. ♃. 3, 4. In fossis limosis!
2242 sylvaticum, L. ♃. 4, 5. In sylvis uliginosis!
β. minus Lej.
2243 palustre, L. ♃. 6, 7. In paludibus!
α. simplex.
β. depauperatum.
γ. fasciculatum.
δ. polystachyon.
2244 limosum, L. ♃. 5, 6. In aquosis!
α. simplex.
β. depauperatum.
γ. fasciculatum.
δ. polystachyon.
2245 hyemale, L. ♃. 7, 8. In sylvis et dumetis humidis!
α. simplex.
β. ramosum.
2246 variegatum, Sm. ♃. 7, 8. In vallibus dunarum!

Fam. 116. LEMANCEÆ. *Dmrt. comm. bot.*

LEMNA. *Lin.*

α. frons elongata — Hydrophylla.
2247 trisulca, L. ①. 6, 7. In stagnis et fossis!

Digitized by Google

b. frons lenticularis — Hydrophace.

2248 polyrhiza, L. ⊙. 6, 7. In stagnis et fossis!
2249 gibba, L. ⊙. 6, 7. In stagnis et fossis!
2250 minor, L. ⊙. 6, 7. In stagnis et fossis!
2251 arhiza, L. ⊙. 5. In stagnis (Hoor! Lej.)

ADDENDA.

p. 14 post N. 63; Inseratur:
64 fragilis, Lin! ♄. 4, 5. In palustribus et sepibus!
p. 58 post N. 638, Inseratur:
639 Trachelium, L. ♃. 6—8. In nemorosis calcareis!
p. 79 loco N. 935, Lege:
935 glaucum, L. ♃. 7, 8. Iu Flandriâ (Hoor!)
936 montanum. L. ♃. 7, 7, 8. In collibus apricis (Lej! Hoor!)
β. prasinum = glaucum, Merat. Lej!

Digitized by Google

INDEX

FAMILIARUM ET GENERUM.

A.

Abama, 142
Abies, 10
Acer, 113
ACERINEÆ, 113
Achillea, 69
Aconitum, 129
Acorus, 162
Actea, 126
Adonis, 127
Adoxa, 84
Aegilops, 161
Aesculus, 113
Aethusa, 80
Agrimonia, 97
Agropyron, 160
Agrostemum, 108
Agrostis, 152
Aira, 42
Ajuga 154
Alchemilla, 26
Alectorolophus, 33
Alisma, 135
ALISMACEÆ, 135
Alliaria, 124
Allium, 140
Alnus, 11
Alopecurus, 151
Alsine, 109
Althæa, 114
Alyssum, 119
AMARANTHACEÆ, 19
Amaranthus, 19
Ambrosia, 71
AMENTACEÆ, 10
Ammi, 77
Ammophila, 152
Amygdalus, 91
Anacamptis, 132
Anacyclus, 70
Anagallis, 29
Anarrhinum, 34
Anchusa, 41
Andromeda, 53
Andropogon, 149
Androsace, 30
Anemone, 127
Anethum, 83
Angelica, 82
Anserina, 21
Antennaria, 69
Anthemis, 70
Anthoxanthum, 152
Anthriscus, 80
Anthyllis, 99
Antirrhinum, 34
Apera, 152
Apium, 78
APOCYNEÆ, 52
Aquilegia, 129
Arabis, 125
Archangelica, 82
Arenaria, 109
ARIDEÆ, 162
Aristolochia, 16
Arnica, 66
Arnoseris, 63
Aronia, 92
Arrhenatherum, 153
Arthemisia, 71
Arum, 162
Arundo, 153
ASARINEÆ, 16
Asarum, Ibid.
Asclepias, 52
ASPARAGINEÆ, 138
Asparagus, Ibid.
Asperugo, 39
Asperula, 56
ASPHODELEÆ, 139
Asprella, 150
Aster, 67
Asterolinum, 29
Astragalus, 102
Astrantia, 76
Astrocephalus, 75
ATRIPLICEÆ, 20
Atriplex, Ibid.
Atropa, 39
Avena, 153

B.

Baldingera, 152
Ballota, 46
BALSAMINEÆ, 112
Balsamita, 71
Barbarea, 123
Barkhausia, 60
Batrachium, 127
Bellidiaster, 66
Bellis, Ibid.
BERBERIDEÆ, 125
Berberis, 126
Berteroa, 119
Beta, 21
Betonica, 44
Betula, 11
Bilderdykia, 18
Bidens, 71
Biscutella, 118
Blitum, 21
BORAGINEÆ, 39
Borago, 41
Brachypodium, 160
Brassica, 124
Briza, 157
Bromus, 155

Digitized by Google

Bryonia, 54
Bubon, 79
Buda, 110
Bulliarda, 85
Bunias, 121
Buplevrum, 76
Butomus, 136
Buxus, 88

C.

Cakile, 121
Calamagrostis, 153
Calcitrapa, 73
Calendula, 72
Calepina, 121
Calla, 163
Callitriche, 90
Callinus, 50
Caltha, 129
Calystegia, 50
Camelina, 120
CAMPANULA, 58
CAMPANULACEÆ, *Ib.*
Cannabis, 24
Capnites, 117
CAPRIFOLIACEÆ, 55
Capsella, 119
Cardamine, 125
Carduus, 74
Carex, 145
Carlina, 72
Carpesium, 67
Carpinus, 15
Carum, 78
Caucalis, 81
Cavolinia, 163
CELASTRINEÆ, 105
Celtis, 25
Centaurea, 72
Centranthus, 57
Centrophyllum, 73
Centunculus, 29
Cephalanthera 134
Cerastium, 108
Ceratophyllum, 165
Chærophyllum, 80
Chamæmelum, 70
Chamæpitys, 42
Chamorchis, 133
Cheirantus, 123
Cheirinia, 123
Chelidonium, 130
Chenopodium, 21
Chlora, 51
Chondrilla, 60
Chrysanthemum, 70
Chrysocoma, 67
Chrysosplenium, 84
Cicendia, 51
Cicorium, 64.
Cicuta, 77
Cinara, 73
Cineraria, 65
Circæa, 88
Cirsium, 74
CISTINEÆ, 115
Cladium, 145
Clavula, 143
Clematis, 126
Clinopodium, 47
Cochlearia, 120
COLCHICEÆ, 141
Colchicum, *Ibid.*
Colutea, 102
Commarum, 97
CONIFERÆ, 9
Conium, 77
Conringia, 123
Convallaria, 138
CONVOLVULACEÆ 50
Convolvulus, 50
Conyza, 68
Coriandrum, 80
Corispermum, 23
Cornus, 83
Coronilla, 102
Corrigiola, 86
Corydalis, 117
Corylus, 14
Corynephorus, 154
Cotoneaster, 92
Cotula, 71
Crambe, 121
CRASSULACEÆ, 85
Cratægus, 92
Crepis, 61
Crithmum, 79
Crocus, 137
Crucianella, 56
CRUCIFERÆ, 118
Cucubalus, 107
Cucumis, 54
CUCURBITACEÆ, 54
CUPULIFERÆ, 14
Cuscuta, 50
Cyclamen, 30
Cydonia, 92
Cynanchum, 52
Cynodon, 149
Cynoglossum, 40
Cynosurus, 156
CYPERIDEÆ, 143
Cyperus, 144
Cypripedium, 134
Cytisus, 98

D.

Dactylis, 156
Damasonium, 136
Daphne, 26
Datura, 38
Daucus, 81
Delia, 110
Delphinium, 133
Dentaria, 125
Deschampsia, 154
Dianthus, 106
Diatropa, 76
Digitalis; 36
Digitaria, 150
DIOSCORINEÆ, 137
Diplotaxis, 123
DIPSACEÆ, 75
Dipsacus, *Ibid.*
Doronicum, 66
Draba, 120
Drepania, 63
Drosera, 115
DROSERACEÆ, *Ibid.*

E.

Ecballium, 54
Echinops, 74
Echium, 42
ELÆAGNEÆ, 26
Elatine, 111
ELATINEÆ, *Ibid.*
Elychrysum, 69
Elymus, 162
EMPETRACEÆ, 106
Empetrum, 106

Digitized by Google

Endymion, 140
Enodium, 157
Ephedra, 9
EPHEDRACEÆ, *Ibid.*
Epilobium, 89
Epimedium, 125
Epipactis, 134
Epipogum, 133
EQUISETACEÆ, 165
Eranthis, 129
ERICINEÆ, 53
Erica, *Ibid.*
Erigeron, 67
Eriophorum, 14
Erodium, 112
Erophila, 120
Ervilia, 103
Ervum, *Ibid.*
ERYNGIACEÆ, 75
Eryngium, *Ibid.*
Erysimum, 124
Erythræa, 51
Eupatorium, 64
Euphorbia, 87
EUPHORBIACEÆ, 87
Euphrasia, 32
Evonymus, 105
Exacum, 51

F.

Faba, 102
Fagopyron, 18
Fagus, 15
Festuca, 158
Ficaria, 128
Ficus, 24
Filago, 69
Fragaria, 96
Fraxinus, 119
Fritillaria, 139
Fumaria, 117
FUMARIACEÆ *Ibid.*

G.

Gagea,, 139
Galanthus, 136
Gale, 10
Galega, 101
Galeopdolon, 45
Galeopsis, *Ibid.*
Galinzoga, 72
Galium, 55
Gatyonia, 60
Genista, 98
Gentiana, 51
GENTIANEÆ, 50
GERANIDEÆ, 112
Geranium, *Ibid.*
Geum. 97
Gifola, 68
Gladiolus, 137
Glaucium. 130
Glaux, 28
Glechoma, 47
Globularia, 27
GLOBULARINEÆ, 27
Glyceria, 157
Glycyrrhiza, 101
Graphalium; 69
Goodyera, 183
GRAMINEÆ, 148
Gratiola, 36
GROSSULACEÆ, 88
Gymnadenia, 133
Gymnostichum, 162
Gypsophila, 107
Gyrostachys, 134

H.

Halimus, 20
HALORAGEÆ, 90
Hedera, 83
HEDERACEÆ, *Ibid.*
Helianthemum, 115
Helianthus, 72
Heliotropium, 39
Helleborus, 129
Helminthia, 61
Helodium, 77
HEMEROCALLIDEÆ, 139
Hemerocallis, 139
Hepatica, 127
Heracleum, 83
Herminium, 133
Herniaria, 86
Hesiodia, 44
Hesperis, 124
Hieracium, 62
Hierochloë, 153
Hippocrepis, 102
Hippophaë, 26
HIPPURIDEÆ, 16
Hippuris, *Ibid.*
Holcus, 153
Holosteum, 108
Honkenya, 86
Hordeum, 161
Hottonia, 38
Humulus, 24
Hutchinsia, 118
HYDROCHARIDEÆ, 135
Hydrocharis, *Ibid.*
Hydrocotyle, 76
Hyosciamus, 38
Hyoseris, 63
Hypecoum, 130
HYPERICINEÆ, 113
Hypericum, 114
Hypocheris, 63
Hyssopus, 47

I.

Iberis, 118
Ilex, 104
ILICINEÆ, *Ibid.*
ILLECEBREÆ, 86
Illecebrum, *Ibid.*
Impatiens, 112
Imperata, 149
Imperatoria, 82
Inula, 68
IRIDEÆ, 137
Iris, *Ibid.*
Isatis, 121
Isnardia, 90
Isopyrum, 129

J.

Jasione, 59
JASMINEÆ, 52
Juglans, 15
JUNCINEÆ, 142
Juncus, *Ibid.*
Juniperus, 6

Digitized by Google

K.

Kickxia, 35
Kochia, 22
Koeleria, 156

L.

LABIATEÆ, 42
Lactuca, 60
Lagurus, 151
Lamium, 45
Lappa, 73
Lappula, 40
Lapsana, 60
Larbrea, 109
Laserpitium, 82
Lathræa, 33
Lathyrus, 103
Ledum, 53
LUGUMINOSÆ, 98
Lemna, 165
LEMNACEÆ, *Ibid.*
LENTIBULARIEÆ, 31
Leontodon, 63
Leonorus, 46
Lepidium, 118
Lepiurus, 149
LEUCOIDEÆ, 136
Leucoium, 136
Levisticum, 82
Ligusticum, 79
Ligustrum, 52
Lilac, *Ibid.*
LILIACEÆ, 139
Lilium, *Ibid.*
Limbarda, 68
Limnanthemum, 52
Limodorum, 134
Limonium, 27
Limosella, 38
Linaria, 34
Linnea, 55
LINIDEÆ, 111
Linum, *Ibid.*
Listera, 133
Lithospermum, 41
Littorella, 28
Lobelia, 59
LOBELIACEÆ, *Ibid.*
Logfia, 68
Lolium, 159
LORANTHEÆ, 16
Loroglossum, 132
Lotus, 101
Lunaria, 119
Luzula, 142
Lychnis, 108
Lycium, 39
Lycopus, 49
Lysimachia, 29
LYTHRARIEÆ, 90
Lythrum, 91

M.

Maianthemum, 138
Malaxis, 134
Malcomia, 124
Malva, 114
MALVACEÆ, 114
Marrubium, 46
Maruta, 69
Mathiola, 124
Matricaria, 70
Mays, 148
Medicago, 99
Melampyrum, 33
Melandrium, 108
MELANTHIDEÆ, 141
Melica, 157
Melilotus, 100
Melissa, 47
Melittis, 44
Mentha, 48
Menyanthes, 52
Mercurialis, 87
Mertensia, 40
Mespilus, 92
Meum, 79
Mibora, 150
Michelaria, 155
Micropus, 68
Milium, 150
Moenchia, 109
Monotropa, 105
MONOTROPEÆ, *Ibid.*
Montia, 86
Moricandia, 123
Morus, 24
Muscari, 141
Myagrum, 121
Myceli, 60
Myosanthus, 109
Myosotis, 40
Myosurus, 127
Myrica, 10
Myriophyllum, 90
Myrrhis, 80
MYRTACEÆ, 88

N.

NAIADEÆ, 164
Naias, 164
NARCISSEÆ, 136
Narcissus, *Ibid.*
Nardosmia, 65
Nardus, 149
Nasturtium, 124
Neottia, 133
Nepeta, 47
Neslia, 121
Nicotiana, 38
Nigella, 129
NUCULACEÆ, 15
Nuphar, 131
Nymphæa, *Ibid.*
NYMPHÆACEÆ, 131

O.

Odontites, 32
Oenanthe, 79
OEnothera, 89
Oglifa, 68
Omphalodes, 40
ONAGRIDEÆ, 88
Onobrychis, 102
Ononis, 99
Onopordon, 73
Ophrys, 132
Oplismenus, 150
ORCHIDEÆ, 131
Orchis, 132
Origanum, 48
Orlaya, 81
Ormenis, 69
Ornithogalum, 139
Ornithopus, 102
Ornus, 11

Digitized by Google

Orobanche, 33
Orobus, 114
OXALIDEÆ, 111
Oxalis, *Ibid.*
Oxycoccus, 53
Oxytropis, 102

P.

Paliris, 134
Panicum, 150
Papaver, 130
PAPAVERACEÆ, 130
Parietaria, 24
PARIDEÆ, 131
Paris, *Ibid.*
Parnassia, 115
Passerina, 26
Pastinaca, 83
Pedicularis, 32
Peplis, 90
Petasites, 64
Peucedanum, 83
Phalacroloma, 67
Phalangium, 139
Phalaris, 152
Phaloe, 110
Phalona, 156
Phaseolus, 104
Philadelphus, 88
Phleum, 151
Phlomis, 46
Physalis, 38
Phyteuma, 59
Picris, 61
Pimpinella, 78
Pinguicula, 31
Pinus, 9
Pisum, 103
PLANTAGINEÆ, 27
Plantago, *Ibid.*
Platanus, 10
Platanthera, 133
PLUMBAGINEÆ, 27
Poa, 156
Podospermum, 64
POLEMONACEÆ, 50
Polemonium, *Ibid.*
Polycarpon, 86
Polycnemum, 23
Polygala, 31
POLYGALEÆ, 31.
Polygonatum, 138
POLYGONEÆ, 17
Polygonum, 18
Polypogon, 151
Portulaca, 86
PORTULACEÆ, *Ibid.*
Populus, 14
Potamogeton, 163
POTAMOGETONEÆ, *Ibid.*
Potentilla, 96
Poterium, 26
Prenanthes, 62
Primula, 30
PRIMULACEÆ, 28
Prismatocarpus, 58
Prionitis, 77
Prunella, 43
Prunus, 91
Pulicaria, 67
Pulmonaria, 41
Pyrethrum, 70
Pyrola, 105
PYROLACEÆ, *Ibid.*
Pyrus, 92

Q.

Quercus, 15

R.

Radiola, 111
RANUNCULACEÆ 126
Ranunculus, 128
Raphanus, 122
Rapistrum, 121
Reseda, 116
RESEDACEÆ; *Ibid.*
RHAMNACEÆ, 104
Rhamnus, *Ibid.*
RHINANTHIDEÆ, 32
Ribes, 88
Robinia, 101
Rosa, 93
ROSACEÆ, 91
Roucela, 58
Rubia, 55
RUBIACEÆ, 55
Rubus, 94
Rumex, 17
Ruppia, 164
Ruscus, 138
Ruta, 105
RUTACEÆ, *Ibid.*

S.

Sagina, 110
Sagittaria, 135
Salicornia, 23
Salix, 11
Salsola, 22
Salvia, 43
Sambucus. 54
SAMOLINEÆ, 55
Samolus, *Ibid.*
Sanguisorba, 27
SANGUISORBEÆ, 26
Sanicula, 76
SANTALACEÆ, 16
Saponaria, 107
Satureia, 47
Saxifraga, 84
SAXIFRAGEÆ, *Ibid.*
Scabiosa, 75
Scandix, 80
Schedonorus, 159
Schelhammeria, 145
Scheuchzeria, 141
Schoenus, 145
Scilla, 140
Scirpus, 143
Sclarea, 43
SCLERANTHEÆ, 23
Scleranthus, *Ibid.*
Scorodonia, 42
Scorzonera, 64
Scrophularia, 37
Scutellaria, 43
Secale, 161
Sedum, 85
Selinum, 82
Sempervivum, 85
Senebiera, 118
Senecio, 65
Serapias, 132
Serratula, 73
Seseli, 70
Sesleria, 156

Digitized by Google

Setaria, 149
Sherardia, 57
Sideritis, 44
Silene, 107
Silybum, 73
Sinapis, 122
Sison, 78
Sisymbrium, 124
Sium, 77
Smyrnium, *Ibid.*
SOLANEÆ, 38
Solanum, 39
Solidago, 67
Sonchus, 59
Sorbus, 93
Sparganium, 162
Spergula, 110
Spinacia, 21
Spiræa, 98
Stachys, 44
Staphylea, 105
Statice, 27
Stellaria, 109
STELLARIACEÆ, 106
Stellera, 26
Stipa, 151
Stratiotes, 135
Streptachne, 151
Suæda, 22
Subularia, 120
Succisa, 75
Swertia, 50
Symphytum, 41
SYNANTHEREÆ, 59

T.

TAMARISCINEÆ, 91
Tamarix, *Ibid.*
Tamus, 137
Tanacetum, 70
TAXINEÆ, 10
Taxus, *Ibid.*
Teesdalia, 118
Tetragonolobus, 101
Teucium, 42
Thalictrum, 126
Thesium, 16
Thlaspi, 119
THYMELEÆ, 26
Thymus, 47
Tilia, 114
TILIACEÆ, *Ibid.*
Tillæa, 85
Tordylium, 82
Torilis, 81
Tragopogon, 64
Tragus, 149
Trapa, 90
Trientalis, 30
Trifolium, 100
Triglochin, 141
TRIGLOCHINEÆ, *Ib.*
Trigonella, 100
Trimorphæa, 67
Trinia, 78
Triodia, 157
Trisetum, 154
Triticum, 161
Trixago, 44
Trollius, 129
Tulipa, 139
Turgenia, 81
Turritis, 125
Tussilago, 65
Typha, 162
TYPHACEÆ, 162

U.

Ulex, 98
ULMACEÆ, 25
Ulmus, *Ibid.*
UMBELLATÆ, 76
Urtica, 24
URTICINEÆ, *Ibid.*
Utricularia, 31

V.

VACCINIEÆ, 53
Vaccinium, *Ibid.*
Valeriana, 57
VALERIANACEÆ, *Ib.*
Valerianella, *Ib.*
Vallisneria, 135
Veratrum, 241
VERBASCINEÆ, 37
Verbascum, *Ibid.*
Verbena, 49
VERBENACEÆ, *Ib.*
Veronica, 35
VIBURNACEÆ, 54
Viburnum, *Ibid.*
Vicia, 103
Vinca, 52
Viola, 116
VIOLACEÆ, *Ibid.*
Viscum, 16
Visnaga, 79
VITIDEÆ, 113
Vitis, *Ibid*
Vulpia, 159

X.

Xanthium, 71
Xylosteum, 55

Z.

Zannichellia, 164
Zostera, 163

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google